

2024 广西壮族自治区扶绥县《执业药师之西药学专业二》考试含答案（A 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 延长动作电位时程的广谱抗心律失常药物是()

- A: 奎尼丁
- B: 美西律
- C: 维拉帕米
- D: 胺碘酮

答案：D

2. 以下关于复方托吡卡胺的描述，正确的是

- A: 可诱发未经诊断的闭角型青光眼
- B: 可用于术后防止粘连
- C: 妊娠期妇女慎用
- D: 高血压、动脉硬化、冠状动脉供血不足者慎用

答案：D

3. 用药过程中需要监护迟发性腹泻的是()

- A: 长春碱类
- B: 多柔比星
- C: 伊立替康
- D: 紫杉醇

答案：C

4. 止吐方案：每日化疗前，联合应用 5-HT

- A: 中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- B: 微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- C: 重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- D: 低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

答案：C

5. 用维生素 B

- A: 钾
- B: 钙
- C: 锂
- D: 钠

答案：A

6. 属于血小板糖蛋白 GP IIb / IIIa 受体阻断剂的是

- A: 替格瑞洛
- B: 双嘧达莫
- C: 替罗非班
- D: 阿司匹林

答案：C

7. 巨幼细胞贫血可选用

- A: 维生素 K1
- B: 维生素 B12
- C: 香豆素类
- D: 肝素

答案：B

8. (2016 年真题) 属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药是

- A: 索他洛尔
- B: 硝酸甘油
- C: 利多卡因
- D: 美托洛尔

答案：C

9. 金刚烷胺与阿托品合用

- A: 增加锥体外系不良反应的风险
- B: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)
- C: 可增加抗胆碱不良反应的危险
- D: 增加肾毒性

答案：C

10. 30 岁，农民，头昏乏力，粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L。诊断：钩虫感染，缺铁性贫血。

- A: 对胃酸缺乏者，宜与稀盐酸并用，有利于铁剂的解离
- B: 选择适宜的病期、疗程和监测
- C: 尽量选择三价铁
- D: 注意预防铁负荷过重

答案：C

11. 患者，男，19 岁，既往有癫痫病史 2 年，长期服用苯妥英钠控制良好。1 周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4 次/日。

- A: 停药后复发率高
- B: 餐后服用比餐前效果佳

C: 餐前服用比餐后效果佳

D: 具有抗雄激素样作用，剂量过大可出现男性乳房女性化、女性泌乳等

答案：C

12. 属于碳酸酐酶抑制剂的药物是

A: 阿托品

B: 乙酰唑胺

C: 奥布卡因

D: 拉坦前列素

答案：B

13. 噻嗪类利尿药可用于治疗肾性尿崩症及加压素无效的垂体性尿崩症，是因为其可以抑制

A: 远曲小管近端

B: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子

C: 磷酸二酯酶

D: Na^+-Cl^- 共转运子

答案：C

14. 需要迅速抗血小板作用时，不宜选择的药物是

A: 噻氯匹定

B: 普萘洛尔

C: 阿替普酶

D: 硝酸甘油

答案：A

15. 嵌入 DNA 干扰转录 RNA 的抗恶性肿瘤药是

- A: 多柔比星
- B: 环磷酰胺
- C: 5-氟尿嘧啶
- D: 吉非替尼

答案：A

16. 基于甲状旁腺激素研发出的促进骨形成的药是

- A: 依普黄酮
- B: 雷洛昔芬
- C: 特立帕肽
- D: 唑来膦酸

答案：C

17. （2016 年真题）与胰岛素合用治疗高钾血症的药物是

- A: 三磷酸腺苷
- B: 二磷酸果糖
- C: 葡萄糖
- D: 碳酸钙

答案：C

18. 阿糖胞苷属于

- A: DNA 多聚酶抑制剂
- B: 胸苷酸合成酶抑制剂
- C: 二氢叶酸还原酶抑制剂
- D: 核苷酸还原酶抑制剂

答案：A

19. 链霉素属于

- A: 酰胺醇类
- B: β -内酰胺类
- C: 氨基糖苷类
- D: 四环素类

答案：C

20. (2017 年真题) 眼底散瞳检查宜选用 ()

- A: 托吡卡胺滴眼剂
- B: 碘苷滴眼剂
- C: 拉坦前列素滴眼剂
- D: 氯霉素滴眼剂

答案：A

21. 氨基糖苷类抗菌药无效的是 ()

- A: 厌氧菌和肠球菌
- B: 结核杆菌
- C: 需氧革兰阴性菌
- D: 铜绿假单胞菌

答案：A

22. 出现流感样症候群，寒战、发热的药物是

- A: 对氨基水杨酸
- B: 利福平
- C: 链霉素
- D: 异烟肼

答案：B

23. 外科皮肤伤口或肢体溃疡的局部治疗宜选用

- A: 环磷酰胺
- B: 阿霉素
- C: 聚甲酚磺醛
- D: 地屈孕酮

答案：C

24. 患儿。女，14 岁。因出现尿频、尿急、尿痛症状 2 天就诊，诊断为急性膀胱炎，患儿既往有癫痫病史，宜选用的治疗药物是（）。

- A: 环丙沙星
- B: 青霉素 G
- C: 阿奇霉素
- D: 呋喃妥因

答案：D

25. 属于丙烯胺类的是

- A: 卡泊芬净
- B: 制霉菌素
- C: 特比萘芬
- D: 氟胞嘧啶

答案：C

26. 应用阿托品治疗肠痉挛引起口干、心悸、排尿困难是药物的

- A: 变态反应
- B: 继发反应
- C: 副作用
- D: 毒性反应

答案：C

27. 在痛风急性期，应禁用的抗痛风药

- A: 秋水仙碱
- B: 布洛芬
- C: 别嘌醇
- D: 舒林酸

答案：C

28. (2018 年真题) 对 β -内酰胺类抗菌药物过敏的患者，I 类切口围术期预防应用抗菌药物时，可选用 ()

- A: 氨曲南
- B: 万古霉素
- C: 青霉素 G
- D: 头孢唑林

答案：A

29. 患者。男，42 岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

- A: 多巴胺受体阻断剂
- B: 神经激肽 (NK-1) 受体阻断剂
- C: H₂ 受体阻断剂
- D: 5-HT₃ 受体阻断剂

答案：D

30. 下列关于抗酸剂的描述，正确的是 ()

- A: 抗酸剂可直接中和胃酸，升高胃内容物 pH
- B: 常用抗酸剂缓解非甾体抗炎药相关症状及预防溃疡发生
- C: 碳酸氢钠是非吸收性抗酸剂
- D: 氢氧化铝能直接中和胃酸，并被胃肠道吸收

答案：A

31. 对铜绿假单胞菌无效的氟喹诺酮类药是

- A: 呋喃唑酮
- B: 磺胺嘧啶
- C: 甲氧苄啶
- D: 氧氟沙星

答案：D

32. 具有杀灭痤疮丙酸杆菌作用，用于治疗痤疮的药品是

- A: 异维 A 酸
- B: 维 A 酸
- C: 阿达帕林
- D: 过氧苯甲酰

答案：D

33. 与避孕药同时服用，不会导致避孕失败的药物是

- A: 四环素
- B: 环孢素
- C: 苯巴比妥
- D: 利福平

答案：B

34. 长期大量使用可导致肝功能异常

- A: 四环素可的松
- B: 利巴韦林
- C: 更昔洛韦
- D: 氯霉素

答案：B

35. 属于二氢叶酸还原酶抑制剂的是

- A: 巯嘌呤
- B: 甲氨蝶呤
- C: 长春瑞滨
- D: 吉西他滨

答案：B

36. 下列属于重组人促红素的禁忌证的是()

- A: 难以控制的高血压
- B: 心律失常
- C: 低血压
- D: 中性粒细胞减少

答案：A

37. 属于胃动力药的是

- A: 山莨菪碱
- B: 多潘立酮
- C: 胶体果胶铋
- D: 熊去氧胆酸

答案：B

38. 骨髓抑制较严重的是

- A: 奥沙利铂
- B: 卡铂
- C: 顺铂
- D: 亚叶酸钙

答案：B

39. 关于糖皮质激素抗炎作用特点的描述，不正确的是

- A: 抑制白细胞和吞噬细胞移行血管外，减轻炎症浸润
- B: 促进肉芽组织生成，加速组织修复
- C: 稳定溶酶体膜，抑制致炎物的释放
- D: 直接收缩血管，减少渗出和水肿

答案：B

40. 稳定型和不稳定型心绞痛都可选用

- A: 维拉帕米
- B: 普萘洛尔
- C: 地尔硫
- D: 硝苯地平

答案：A

41. 可引起肺间质纤维化的抗心律失常药物是()

- A: 美托洛尔
- B: 维拉帕米
- C: 地尔硫
- D: 胺碘酮

答案：D

42. (2015 年真题) 利尿作用较弱，具有排钠留钾作用，可用于慢性心力衰竭治疗的利尿剂的是()。

- A: 乙酰唑胺
- B: 氢氯噻嗪
- C: 螺内酯

D: 呋塞米

答案：C

43. (2018 年真题) 不易发生“双硫仑样”反应的药物是 ()

A: 头孢哌酮

B: 头孢曲松

C: 头孢他啶

D: 头孢替安

答案：C

44. (2018 年真题) 适应症仅应用于治疗失眠的药物是 ()

A: 佐匹克隆

B: 氟西汀

C: 苯巴比妥

D: 地西泮

答案：A

45. 注射用二磷酸果糖 5~10g 稀释于 5%~10% 葡萄糖注射液 100ml 中，滴速应控制在

A: 10~40mg / min

B: 60~100mg / min

C: 100~300mg / min

D: 400~1000mg / min

答案：D

46. 氨基酸的主要作用不包括

A: 合成蛋白质

B: 维持氮平衡

C: 调节体内酸碱平衡

D: 转变为糖或脂肪

答案：C

47. 呋塞米的利尿作用部位在()

A: 肾小球

B: 集合管

C: 远曲小管初段

D: 髓袢升支粗段

答案：D

48. 预防脑卒中作用最强的降压药是

A: 沙拉新

B: 氢氯噻嗪

C: 缬沙坦

D: 硝苯地平

答案：D

49. 甲氧苄啶联用华法林使

A: 白细胞减少风险增加

B: 半衰期缩短

C: 抗凝作用增强

D: 肾毒性增加

答案：C

50. 铁剂的适应证为()

A: 再生障碍性贫血

B: 恶性贫血

C: 缺铁性贫血

D: 巨幼红细胞性贫血

答案：C

51. (2017 年真题) 关于镇咳药作用强度的比较, 正确的是 ()

A: 苯丙哌林>喷托维林>可待因

B: 苯丙哌林>可待因>喷托维林

C: 可待因>苯丙哌林>喷托维林

D: 喷托维林>苯丙哌林>可待因

答案：B

52. 奥美拉唑抑制胃酸分泌的机制是 ()

A: 阻断 H

B: 抑制胃壁细胞 H

C: 阻断 M 受体

D: 阻断促胃液素受体

答案：B

53. 用于过敏性休克的是 ()

A: 阿托品

B: 肾上腺素

C: 甲氧氯普胺

D: 熊去氧胆酸

答案：B

54. 属于环氧酶抑制剂的是

A: 替格瑞洛

B: 双嘧达莫

C: 阿司匹林

D: 乙酰唑胺

答案: C

55. 下列对铜绿假单胞菌作用最强的抗菌药物是

A: 头孢噻肟

B: 头孢曲松

C: 头孢哌酮

D: 头孢甲肟

答案: C

56. 对呼吸无抑制的外周性镇咳药是

A: 苯丙哌林

B: N-乙酰半胱氨酸

C: 右美沙芬

D: 可待因

答案: A

57. 属于长效 β

A: 沙丁胺醇

B: 布地奈德

C: 沙美特罗

D: 多索茶碱

答案: C

58. 患者男性，56 岁。有糖尿病史 15 年，近日并发肺炎，呼吸 35 次/分，心率 105 次/分，血压 160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖 500mg/dl，诊断为糖尿病酮症酸中毒。

- A: 皮下
- B: 静脉
- C: 口服
- D: 舌下含服

答案：B

59. (2018 年真题) 属于肾上腺受体激动剂的降眼压药是 ()

- A: 毛果芸香碱
- B: 地匹福林
- C: 拉坦前列素
- D: 噻吗洛尔

答案：B

60. 留钾利尿药若每日服用 1 次，最宜的服用时间是

- A: 早餐前 1 小时
- B: 午餐前 1 小时
- C: 午餐时
- D: 早餐时

答案：D

61. 维生素 B12 主要用于治疗的疾病是

- A: 慢性失血性贫血
- B: 缺铁性贫血
- C: 再生障碍性贫血
- D: 巨幼细胞性贫血

答案：D

62. 通过与寄生虫肠细胞微管蛋白特异性结合而干扰其细胞微管形成，可使寄生虫肠道超微结构退化，从而破坏寄生虫对葡萄糖的吸收及消化功能，最终导致寄生虫死亡的药物是

- A: 甲苯咪唑
- B: 哌嗪
- C: 左旋咪唑
- D: 阿苯达唑

答案：A

63. 适用于合并有肾功能损害的高血压患者的药物是

- A: 卡维地洛
- B: 维拉帕米
- C: 氯沙坦
- D: 多巴酚丁胺

答案：C

64. （2016 年真题）抗病毒药阿昔洛韦在静脉滴注时滴速必须缓慢，否则可能引起的不良反应（）

- A: 肺部纹理加重
- B: 急性肾衰竭
- C: 急性肝衰竭
- D: 胰腺坏死

答案：B

65. 制成脂质体以降低药物肾毒性的抗真菌药是

- A: 卡泊芬净
- B: 两性霉素
- C: 氟胞嘧啶

D: 阿糖胞苷

答案: B

66. 茶碱类主要用于

A: 气管炎

B: 支气管扩张

C: 支气管哮喘

D: 肺不张

答案: C

67. 与多柔比星合用或配伍与多柔比星合用或配伍

A: β 受体阻断剂

B: 甲氨蝶呤

C: 利福平

D: 阿糖胞苷

答案: D

68. 下列不属于肽类抗生素的是

A: 去甲万古霉素

B: 万古霉素

C: 利奈唑胺

D: 多黏菌素 B

答案: C

69. 使用螺内酯的心力衰竭患者，不宜选用的药品是

A: 氯化钙

B: 硫酸镁

C: 果糖

D: 氯化钾

答案：D

70. 患者女，55 岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院，查体：138 / 90mmHg，心率 120 次 / 分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

A: 4 周

B: 1 周

C: 2 周

D: 3 周

答案：C

71. 异烟肼的作用特点是

A: 对细胞内外的结核杆菌均有效

B: 对大多数革兰阴性菌有效

C: 只对细胞外的结核杆菌有效

D: 结核杆菌不易产生耐药性

答案：A

72. 下列硝酸酯药物相互作用中，可以合用的是

A: 与硝普钠合用

B: 与他汀类药物合用

C: 与西地那非合用

D: 与麻黄碱合用

答案：B

73. 长期大量服用维生素 A 会出现

A: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

B: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

C: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

D: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

答案：B

74. 可使人体对维生素 B

A: 糖皮质激素

B: 异烟肼

C: 丙磺舒

D: 雌激素

答案：C

75. 缺铁性贫血患者最宜选用的治疗药物是

A: 叶酸

B: 维生素 B12

C: 铁剂

D: 维生素 C

答案：C

76. 克拉霉素与阿呋唑嗪合用，阿呋唑嗪的血药浓度水平显著升高，这是因为克拉霉素抑制

A: CYP3A4

B: 血浆蛋白

C: UGT287

D: p-糖蛋白

答案：A

77. 患者，男，56 岁，有高血压病史 4 年，体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。

- A: 水肿
- B: 低血糖
- C: 光过敏
- D: 干咳

答案：D

78. 下列哪项是避免奥沙利铂的剂量依赖性神经系统毒性，避免出现咽喉痉挛等严重后果的措施

- A: 禁食冷饮冷水、接触凉物
- B: 用生理盐水做溶剂
- C: 禁止接触塑料制品
- D: 禁食热饮热水

答案：A

79. （2018 年真题）可用于急、慢性肾功能不全患者的肠外营养支持的氨基酸是（）

- A: 复方氨基酸注射液(3AA)
- B: 复方氨基酸注射液(9AA)
- C: 精氨酸注射液
- D: 复方氨基酸注射液(18AA)

答案：B

80. 属于抗纤维蛋白溶解药的是

- A: 甲萘氢醌
- B: 鱼精蛋白
- C: 酚磺乙胺

D: 氨甲环酸

答案: D

81. 硫脲类抗甲状腺药的主要药理作用是()

A: 影响碘的摄取

B: 促进甲状腺素的释放

C: 抑制甲状腺素的合成

D: 干扰甲状腺素的作用

答案: C

82. 主要结构与雄激素颇为相似，但雄性化作用甚弱，蛋白同化作用很强，临床上可作为升白药物使用的是

A: 小檗胺

B: 丙酸诺龙

C: 鲨肝醇

D: 维生素 B₄

答案: B

83. 可用于治疗老年骨质疏松，属于维生素 D 代谢产物的是

A: 葡萄糖酸钙

B: 瑞格列奈

C: 利拉鲁肽

D: 骨化三醇

答案: D

84. (2018 年真题) 属于 M 胆碱受体阻断剂的平喘药是 ()

A: 茶碱

B: 噻托溴铵

C: 孟鲁司特

D: 沙美特罗

答案: B

85. 他昔莫芬为前药，主要在肝脏经肝药酶代谢，该肝药酶是

A: CYP2C19

B: CYP3A4

C: CYP2D6

D: CYP286

答案: C

86. 长期使用可引起维生素 K 缺乏的药物是

A: 阿司匹林

B: 头孢哌酮

C: 华法林

D: 二甲双胍

答案: B

87. 阿司匹林抗血栓形成的机制是

A: 激活抗凝血酶

B: 环氧酶失活，减少 TXA₂ 生成，产生抗血栓形成作用

C: 直接对抗血小板聚集

D: 降低凝血酶活性

答案: B

88. 在肠内吸收水分后膨胀形成胶体，使肠内容物变软，体积增大，反射性增加肠蠕动而刺激排便的是

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 聚乙二醇 4000

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/707011103050010024>