

2023 年吉林省吉林市医疗三严三基理论考试试题及答案

医院科室：_____ 姓名：_____ 考场：_____ 考号：_____

一、选择题

1. 有关风湿热的预后下述哪项有错误

- A、舞蹈病的预后一般良好
- B、首次发作累及心脏者,预后较差
- C、反复发作累及心脏者预后不良
- D、并发心功能不全者预后不良
- E、伴发心包炎者预后良好

答案：

E

2. 对 DIC 发病机制的描述下列哪项是不正确的()

- A、血管内皮细胞损伤,激活凝血因子XI
- B、组织严重破坏。大量组织因子进入血液
- C、血细胞大量破坏,释放促凝血物质
- D、羊水进入血液,激活内源性凝血系统

E、癌细胞进入血液,激活内源性凝血系统

答案:

A

3. 接种 BCG 的作用是()

A、增强机体非特异性免疫能力

B、增强人体细胞免疫能力

C、增强人体体液免疫能力

D、增强机体免疫稳定功能

E、使人体对结核分枝杆菌产生免疫力

答案:

E

4. 成人颅内压增高最常见的 X 线征象是()

A、头颅扩大

B、囟门增宽

C、颅缝分离

D、脑回压迹增多

E、鞍背疏松脱钙

答案：

E

5. 高压氧治疗一氧化碳中毒的主要机制是()

A、血液中物理溶解氧量增加

B、血液中结合氧量增加

C、血液中血红蛋白增加

D、氧和血红蛋白的亲合力增加

E、机体的摄氧能力增强

答案：

A

6. 维生素的生理功能不包括()

A、保护视力

B、影响生殖功能

C、提供热能

D、参与骨代谢

E、维持正常免疫功能

答案：

C

7. 酮症酸中毒不发生于以下哪种情况()

A、糖尿病

B、严重饥饿

C、酒精中毒

D、高脂饮食

E、以上均不是

答案：

B

8. 佝偻病活动及其临床表现主要是()

A、生长中的骨骼改变、肌肉松弛和神经兴奋性改变

B、神经症状、骨骼改变

C、易激惹、烦躁、多汗、枕部秃发

D、颅骨软化、鸡胸、X形腿

E、骨缝、前囟、后囟闭合及出牙延迟

答案：

A

9. 杀灭细菌芽胞最有效的方法是()

A、煮沸法

B、巴氏消毒法

C、高压蒸汽灭菌法

D、紫外线照射

E、90% 乙醇消毒

答案：

C

10. 核素诊断肝海绵血管瘤的最恰当的方法是()

A、肝胶体显像

B、肝阳性显像

C、肝血池显像

D、肝胶体和肝血池联合显像

E、肝胆显像

答案：

D

11. 处理开放性颅脑损伤最主要的治疗原则是()

- A、及时包扎伤口、彻底止血
- B、注射抗生素和 TAT
- C、应用脱水利尿药
- D、应用镇静药和脑保护药
- E、及时彻底清创 ,缝合修补硬脑膜

答案:

E

12. 患者,男性,56 岁,爬山后急起右侧肢体活动不能伴意识不清 3 小时入院。既往有心肌梗塞史。检查:浅昏迷,右鼻唇沟浅,右侧肢体活动差于左侧。当即检颅脑 CT 为阴性。首先考虑为()

- A、脑血栓形成
- B、脑栓塞
- C、蛛网膜下腔出血
- D、脑出血
- E、脑肿瘤伴出血

答案:

B

13. 保存温度对血小板活性影响很大,适宜温度为()

A、4℃~6℃

B、8℃~10℃

C、室温

D、18℃~22℃

E、20℃~24℃

答案:

E

14. 慢性弥漫性阻塞性肺气肿最主要的症状是()

A、咳嗽

B、咳痰

C、逐渐加重的呼吸困难

D、心悸

E、咯血

答案:

C

15. 控制性降压最易发生的并发症是()

- A、器官缺血
- B、心跳骤停
- C、苏醒延迟
- D、呼吸衰竭
- E、反应性出血

答案：

A

16. 42 岁男性,农民。表现生活懒散,不爱清洁,不愿出门,话少,已经 5 年余,家庭经济困难,要求门诊治疗。最适宜的方案是

- A、阿立哌唑
- B、奎硫平
- C、电抽搐治疗
- D、舒必利
- E、奥氮平

答案：

D

17. 有关过期妊娠的定义,准确的叙述是()

- A、妊娠达到 42 周
- B、妊娠超过 42 周
- C、妊娠达到或超过 40 周
- D、妊娠达到或超过 43 周
- E、妊娠达到或超过 42 周

答案：

E

18. 关于弯曲菌病,下列哪项错误

- A、空肠弯曲菌和结肠弯曲菌主要引起急性肠炎
- B、弯曲菌病主要致病菌有空肠弯曲菌、结肠弯曲菌和胎儿弯曲菌
- C、结肠弯曲菌可引起败血症
- D、胎儿弯曲菌多为机会性感染,可引起败血症等全身性感染
- E、弯曲菌感染主要引起腹泻、肠道外器官的局灶感染和菌血症

答案：

C

19. 营养不良的早期临床表现是()

- A、面色苍白

、精神萎靡

C、发育迟缓

D、食欲减退

E、体重不增或减轻

E

20. 流行病学研究中的偏倚一般分为三类,它们为

A、测量偏倚、报告偏倚、无应答偏倚

B、信息偏倚、无应答偏倚、报告偏倚

C、选择偏倚、信息偏倚、混杂偏倚

D、选择偏倚、无应答偏倚、混杂偏倚

E、混杂偏倚、报告偏倚、测量偏倚

答案:

C

21. 为预防血液透析后发生上行尿路感染,告诉病人养成定时排尿的习惯,具体时间为()

A、每4~6 小时 1 次

B、每2~3 小时 1 次

、每 6~8 小时 1 次

D、每 2 小时 1 次

E、每 8~12 小时 1 次

A

22. 婴幼儿的辐射敏感性()

A、与成年人相同

B、高于胚胎儿

C、低于成年人

D、低于老年人

E、高于成年人

答案:

E

23. 对染色体端粒进行的显带称为()

A、C 显带

B、D 显带

C、G 显带

、Q 显带

E、T 显带

E

24. 局部浸润麻醉选用普鲁卡因时,其常用浓度为()

A、0.5%

B、1%

C、1.5%

D、2%

E、2.5%

答案:

A

25. 人耳能感觉到的声波频率范围为()

A、20~1000Hz

B、20~2000Hz

C、20~4000Hz

D、20~8000Hz

、20~20000Hz

E

26. 纠正 DIC 最有效的治疗方法是：

A、去除病因,积极治疗原发病

B、肝素的应用

C、补充凝血因子

D、抗纤溶药物的应用

E、输注血小板

答案：

A

27. 死亡细胞变为嗜酸性,细胞核的细微结构消失,但细胞和组织结构的轮廓仍存在,这种改变称为()

A、坏疽性坏死

B、液化性坏死

C、干酪性坏死

D、脂肪坏死

、凝固性坏死

E

28. 风湿热时最常受侵犯的瓣膜是()

A、主动脉瓣

B、肺动脉瓣

C、二尖瓣

D、三尖瓣

E、主动脉瓣和二尖瓣

答案：

C

29. 尿毒症性高钾血症最有效的治疗方法是()

A、静脉滴注碳酸氢钠

B、静脉滴注葡萄糖酸钙

C、静脉滴注高渗葡萄糖和胰岛素

D、血液透析

E、口服钠型阳离子交换树脂

D

30. 下列哪种疾病属性传播疾病(STD)()

A、阴茎珍珠状丘疹

B、生殖器鲍温样丘疹病

C、女阴假性湿疣

D、扁平湿疣

E、生殖器鳞状细胞癌

答案：

D

31. 均称体型正常人肝叩诊相对浊音界,哪项是错误的()

A、右锁骨中线第5肋间

B、右锁骨中线上下径为9~11 cm

C、右腋中线第8肋间

D、右肩胛线第10肋骨水平

E、肝绝对浊音界比相对浊音界低1~2肋间

答案：

C

32. 属于低水平消毒剂的是()

A、戊二醛

B、过氧乙酸

C、碘伏

D、氯己定

E、异丙醇

答案：

D

33. 循环血液中的凝血块,随血流运行至相应大小的血管,引起管腔阻塞的过程叫做:()

A、血栓

B、血栓形成

C、血栓栓塞

D、梗塞

E、血栓栓子

答案：

D

34. 除了哪一项外,下列均为胃溃疡的肉眼病变特点()

- A、溃疡通常只有一个
- B、溃疡呈圆形或椭圆形
- C、溃疡直径一般大于 2cm
- D、溃疡底部干净、光滑、边缘整齐
- E、溃疡深达肌层或浆膜层

答案:

C

35. 在 DNA 复制中 RNA 引物的功能(作用)是

- A、使 DNA 聚合酶活化并使 DNA 双链解开
- B、提供 5' 末端作为合成新 DNA 链的起点
- C、提供 5' 末端作为合成新 RNA 链的起点
- D、提供 3'-OH 末端作为合成新 DNA 链的起点
- E、提供 3'-OH 末端作为合成新 RNA 链的起点

答案:

D

36. 鼻咽癌转移引起颈上深淋巴结群肿大,下述哪组脑神经易受压迫()

A、 I 、 II

B、 III、 IV

C、 V、 VI

D、 VII、 VIII

E、 IX、 X、 XI、 XII

答案：

E

37． 吗啡的呼吸抑制作用是因为（ ）

A、 激动丘脑内侧的阿片受体

B、 降低呼吸中枢对血液二氧化碳张力的敏感性

C、 激动中枢盖前核的阿片受体

D、 激动脑干的阿片受体

E、 激动蓝斑核的阿片受体

答案：

B

38． 普鲁卡因青霉素之所以能长效,是因为（ ）

A、 改变了青霉素的化学结构

- B、抑制排泄
- C、减慢了吸收
- D、延缓分解
- E、加进了增效剂

答案：

C

39．区别腹部肿块来自腹腔或腹壁最简易的检查方法是()

- A、超声检查
- B、胃肠钡餐检查
- C、腹部体格检查
- D、腹部 X 线平片
- E、放射性核素显像

答案：

C

40．预防乙型病毒性肝炎最有效的措施是()

- A、隔离病人
- B、管理带病毒者

C、管理血源

D、注射疫苗

E、注射免疫球蛋白

答案：

D

41．周围血管征应除外()

A、水冲脉

B、点头运动

C、毛细血管搏动

D、脉搏短绌

E、射枪音

答案：

D

42．硫喷妥钠静脉麻醉适用于以下何种病人()

A、婴幼儿

B、孕妇

C、休克病人

D、肝肾功能不全者

E、颅脑手术病人

答案：

E

43. 危害行为发生率最高的精神疾病是()

A、精神分裂症

B、躁狂症

C、抑郁症

D、反应性精神病

E、偏执性精神病

答案：

A

44. 一侧瞳孔直接对光反应消失,间接光反应存在,病变在()

A、同侧动眼神经

B、对侧动眼神经

C、同侧视神经

D、对侧视神经

E、视交叉

答案：

C

45. 要对一个正在发生的疾病现状进行调查,应使用哪种调查方法()

A、前瞻性调查

B、横断面调查

C、追踪调查

D、回顾性调查

E、以上都不是

答案：

B

46. 为了减轻甲氨蝶呤的毒性反应,可用下列哪种药物作救缓剂?()

A、叶酸

B、甲酰四氢叶酸钙

C、维生素 B

D、制霉菌素

E、氟康唑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/707062053052006155>