

甘肃省武山县历年《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题王牌题库含答案【夺分金卷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 收录 5500 余种药物专论、4 万多篇参考文献的是

- A: 《马丁代尔药物大典》
- B: 《中国国家处方集》
- C: 《药物事实与比较》
- D: 《美国药典药物信息》

答案：A

2. 可以杀伤结核分枝杆菌，最大限度地降低传染性的早期杀菌活性药是

- A: 乙胺丁醇
- B: 氨苄西林
- C: 莫西沙星
- D: 氧氟沙星

答案：A

3. （2015 年真题）下列关于脑梗死急性期药物治疗的说法，正确的是（）。

- A: 血小板计数 $<100 \times 10^9/L$ 时应禁用溶栓药
- B: 应在使用溶栓药的同时联合使用阿司匹林
- C: 急性脑梗死的溶栓治疗时间窗是 48 小时内
- D: 甘油果糖脱水作用较甘露醇强且快

答案：A

4. 连续使用可以引起便秘，宜在清晨空腹服用，并大量饮水，以加速导泻并防止脱水的药物是

- A: 乳果糖
- B: 聚乙二醇 4000
- C: 比沙可啶
- D: 硫酸镁

答案：D

5. 可与眼球表面和坏死组织及分泌物中的蛋白质形成极薄的蛋白膜起保护作用，高浓度时则有杀菌和凝固作用的是

- A: 酞丁安滴眼液
- B: 磺胺醋酰钠滴眼液
- C: 可的松滴眼液
- D: 硫酸锌滴眼液

答案：D

6. 后记

- A: 主要实验室数据
- B: 医师签名、药品金额
- C: 临床诊断、费别
- D: 对药物治疗的建设性意见与结果评价

答案：B

7. 习惯性便秘

- A: 羧甲基纤维素钠
- B: 乳果糖

C: 开塞露

D: 比沙可啶

答案：D

8. 作为多重用药的管理策略，“用药列表”的作用最可能见效的是

A: 有助于指出需特别监测、必要时应停服的药物

B: 可判断治疗疾病的主要药物、辅助治疗药物，甚至是不必要的药物

C: 有助于指出不适合患者服用的、相互作用存在潜在危险性的药物

D: 减少联合用药的药物种类

答案：D

9. 高血压合并肾脏疾病，首选

A: 利尿药

B: α 受体阻滞药

C: 血管紧张素转化酶抑制药

D: β 受体阻滞药

答案：C

10. 药物相互作用包括发生在体内的药动学、药效学方面的作用；以及发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

A: 红霉素

B: 异烟肼

C: 伊曲康唑

D: 利福平

答案：D

11. 以下所列物质中，一旦误服中毒，忌用硫酸镁导泻的是

- A: 香豆素类灭鼠药
- B: 有机氮类杀虫药
- C: 磷化锌等灭鼠药
- D: 拟除虫菊酯类杀虫药

答案：C

12. 铁剂联用维生素 C

- A: 延缓或降低抗药性
- B: 作用不同的靶点
- C: 协同作用
- D: 促进机体的利用

答案：D

13. 药师审核后判定为合理处方，应该

- A: 调配处方并发药
- B: 拒绝调配处方，联系处方医师并进行干预
- C: 拒绝调配处方，并依照有关规定报告
- D: 拒绝调配处方

答案：A

14. 患者，女，35 岁，临床诊断为高甘油三酯血症，用非诺贝特微粒型胶囊调节血脂治疗，下列给药正确的用法与用量为

- A: 0.2gqd
- B: 0.1gtid
- C: 0.5gqd
- D: 0.5gtid

答案：A

15. 按照药品不良反应程度分级标准评判,轻微的反应或疾病,症状不发展,一般无需治疗,应评判为

- A: 中度
- B: 轻度
- C: 重度
- D: 弱轻度

答案: B

16. 用于胆石症的非手术治疗,属于钙通道阻滞剂,不可掰开嚼碎,避免卧位服用的药物是()

- A: 熊去氧胆酸片
- B: 匹维溴铵片
- C: 鹅去氧胆酸片
- D: 山莨菪碱片

答案: B

17. 根据药物对胎儿的危害,美国 FDA 将妊娠用药毒性分为 A、B、C、D、X 五个级别,正常剂量维生素 D 的妊娠毒性分级是()

- A: X 级
- B: A 级
- C: C 级
- D: D 级

答案: B

18. 某女孩,6 岁,2 个月来反复突发突止的意识障碍,表现为突然动作中断,呆立凝视,呼之不应,手中物体掉落,但从不跌倒,持续数秒钟缓解。

- A: 苯妥英钠

B: 丙戊酸钠

C: 卡马西平

D: 地西泮

答案：B

19. 治疗发热成人服对乙酰氨基酚，每隔 4~6 小时重复用药 1 次；1 日用量不得超过

A: 4.5g

B: 2.0g

C: 2.5g

D: 3.0g

答案：B

20. 氨氯地平片的适宜服用时间是

A: 餐前

B: 早晨

C: 餐中

D: 餐后

答案：B

21. 以健康受试者进行初步的临床药理学及人体安全性评价是指

A: II 期临床试验

B: III 期临床试验

C: I 期临床试验

D: 临床预试验

答案：C

22. 关于血清天门冬氨酸氨基转移酶的叙述正确的是

- A: 在慢性肝炎尤其是肝硬化时，AST 升高的幅度不如 ALT
- B: 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）与谷丙转氨酶（GPT）是同一概念
- C: 天门冬氨酸氨基转移酶主要存在于心肌、肝肾、骨骼肌、胰腺等组织细胞中，同时也存在于正常人的血浆、胆汁、脑脊液及唾液中
- D: 天门冬氨酸氨基转移酶的测定值只反映肝脏的功能

答案：C

23. 评估房颤患者血栓栓塞风险的方法是

- A: CTP 分级
- B: FEV1 占预计值%
- C: CHA₂DS₂-VASc 评分
- D: HAS-BLED 评分

答案：C

24. 以下有关高血压的药物治疗方案的叙述中，不正确的是

- A: 可采用两种或两种以上药物联合用药
- B: 药物治疗高血压时要考虑患者的合并症
- C: 首先选用血管扩张剂和中枢性抗高血压药
- D: 采用最小有效剂量，根据需要可考虑逐渐增加

答案：C

25. 男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 华法林
- B: 利伐沙班
- C: 肝素
- D: 氯吡格雷

答案：D

26. 以下治疗咳嗽的药物中，白天工作的驾驶员可选用止咳的非处方药是

- A: 苯丙哌林
- B: 可待因
- C: 氨溴索
- D: 羧甲司坦

答案：A

27. 给予(透析患者)非甾体类抗炎药的依据是

- A: 肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素 D
- B: 腹膜透析容易丢失水溶性维生素
- C: 透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛
- D: 有助于机体合成红细胞

答案：C

28. 可提示肝内或肝后胆管梗阻者的是

- A: 血清碱性磷酸酶升高
- B: 丙氨酸氨基转移酶升幅很高
- C: γ -谷氨酰转移酶升高
- D: A/G 值低于 1

答案：C

29. 误服药物、服药过量以及滥用药物均可引起药物中毒。常见的致中毒药物包括西药、中药和农药。随着化学制药工业的不断发展，如果管理和解救措施跟不上，药物中毒的危害即将越来越严重。

- A: 维生素 K1
- B: 阿托品

C: 维生素 C

D: 氯磷定

答案：A

30. 特布他林平喘的主要机制是

A: 阻断腺苷受体

B: 抑制白三烯受体

C: 拮抗 M 胆碱受体

D: 激动肾上腺素 β_2 受体

答案：D

31. 在葡萄糖注射液中极易裂解的是

A: 苯妥英钠

B: 氯化钾

C: 红霉素

D: 青霉素

答案：D

32. 能刺激骨骼、肌肉和组织生长发育的是

A: 麻醉药品

B: 蛋白同化激素

C: 利尿剂

D: 肽类激素

答案：D

33. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mg tidpo，阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 停用瑞格列奈片
- B: 停用阿托伐他汀钙片
- C: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片
- D: 停用二甲双胍肠溶片

答案：B

34. 告知"坦洛主要用于良性前列腺增生症，不能作为抗高血压药"属于

- A: 药物相互作用
- B: 新药信息
- C: 药品不良反应
- D: 禁忌证

答案：D

35. 治疗缺铁性贫血给予元素铁

- A: 日服 180mg
- B: 日服 0.05mg
- C: 日服 80mg
- D: 日服 30~40mg

答案：A

36. (2018 年真题) 患者,男,46 岁,拟行肠道手术,术前 1 天使用导泻药的方法是 ()

- A: 5%氯化钙注射液静脉滴注
- B: 50%葡萄糖注射液湿敷
- C: 25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射
- D: 50%硫酸镁溶液口服

答案：D

37. 过敏性结膜炎和春季卡他性结膜炎可选用 ()

- A: 氧氟沙星滴眼液
- B: 玻璃酸钠滴眼液
- C: 七叶洋地黄双苷滴眼液
- D: 色甘酸钠滴眼液

答案：D

38. “特异体质的患者及其家族成员可能发生过同样反应（如药物过敏）”提示诊断药源性疾病必须

- A: 流行病学的调查
- B: 排除药物以外的因素
- C: 致病药物的确定
- D: 询问用药过敏史和家族史

答案：D

39. 核苷酸类逆转录酶抑制剂

- A: 利托那韦
- B: 齐多夫定
- C: 利巴韦林
- D: 依非韦伦

答案：B

40. 布桂嗪属于

- A: 血管扩张药
- B: 镇痛药
- C: 抗组胺药
- D: 利尿剂

答案：B

41. 影响胎儿甲状腺功能，导致死胎的药物是

- A: 氯霉素
- B: 维生素 A
- C: 维生素 D
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：D

42. 患者，女，37 岁，因小腹胀痛 2 月余、加重 5 天就诊。主诉就诊前无明显诱因出现小腹胀痛，阴道不规则流液，流出物呈黄色脓状，量时多时少，下腹及腰骶部间歇性坠痛。间断性院外治疗（口服金刚藤胶囊、阿莫西林胶囊，具体用量不详）。5 天前月经来潮，下腹部坠痛与腰骶部胀痛难忍，遂来院就诊。8 超提示右侧卵巢囊肿、盆腔积液。妇科检查提示外阴发育正常，阴道黏膜充血，有黄色脓性鱼腥臭味白带，宫颈肥大充血并有举痛，子宫大小正常。门诊以“急性盆腔炎、卵巢囊肿、阴道炎”收治入院。

- A: 氧氟沙星
- B: 多西环素
- C: 阿奇霉素
- D: 克林霉素

答案：D

43. 影响药酶代谢、增强药物作用而危及安全用药的是

- A: 四环素+硫酸亚铁
- B: 西咪替丁+格列本脲
- C: 多潘立酮+维生素 C
- D: 青霉素+丙磺舒

答案：B

44. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔后可使用

- A: 3%酚甘油滴耳液
- B: 2%酚甘油滴耳液
- C: 3%过氧化氢溶液
- D: 2%过氧化氢溶液

答案：C

45. 老年（ ≥ 65 岁）帕金森患者，或伴认知障碍，首选

- A: 普拉克索？
- B: 苯海索？
- C: 复方左旋多巴？
- D: 金刚烷胺？

答案：C

46. 下列病原体中，可导致沙眼的是

- A: 豚解支原体
- B: 大肠埃希菌
- C: 变形杆菌
- D: 沙眼衣原体

答案：D

47. 患者男，65 岁，身高 170cm，体重 60kg，经血糖检测、糖耐量试验和肾功能检测（肌酐清除率 45ml/min），诊断为 2 型糖尿病、肾功能不全，该患者应首选的药物是

- A: 格列本脲
- B: 格列喹酮
- C: 格列吡嗪

D: 格列齐特

答案: B

48. 含右美沙芬制剂的禁用人群是

A: 银屑病患者

B: 孕妇

C: 青光眼患者

D: 呼吸衰竭患者

答案: B

49. 可引起驾驶员视物模糊的药物是

A: 东莨菪碱

B: 阿米洛利

C: 双嘧达莫

D: 抗过敏药

答案: A

50. 患者,男,56岁,体检发现血尿酸 $530\ \mu\text{mol/L}$ (参考值 $<420\ \mu\text{mol/L}$),患者向药师咨询维生素使用问题,药师应告知患者可引起尿酸升高的维生素是()

A: 维生素 B12

B: 维生素 B6

C: 维生素

D: 维生素 B2

答案: C

51. II 期临床试验很难发现"低于 1%发生频率"的不良反应,缘于

A: 管理漏洞

- B: 病例数目少
- C: 考察不全面
- D: 观察时间短

答案：B

52. 误服汞产生的急性汞中毒，最先表现的症状是

- A: 兴奋
- B: 口腔炎、胃肠炎
- C: 神经衰弱
- D: 头痛、头晕

答案：B

53. 消化不良性腹泻宜选用的药物是

- A: 山莨菪碱
- B: 胰酶
- C: 双歧三联活菌制剂
- D: 双八面体蒙脱石散

答案：B

54. (2019 年真题) 患者，女，29 岁，孕 25+6 周近日出现乏力、困倦食欲不振、恶心等症状，化验结果为 Hb71g/L，诊断为缺铁性贫血，予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是

- A: 先少量缓慢静滴，观察无过敏反应后，再继续静脉滴注余下剂量
- B: 口服每次 5ml，一日 3 次
- C: 先静脉注射负荷剂量，再静脉滴注余下剂量
- D: 快速静脉注射

答案：A

55. 双膦酸盐

- A: 促进骨矿化剂
- B: 骨形成刺激剂
- C: 骨吸收抑制剂
- D: 激素替代剂

答案：C

56. (消化性溃疡病的治疗)，除中和胃酸外，尚具有黏膜保护作用

- A: 硫糖铝
- B: 硫酸镁
- C: 溴丙胺太林
- D: 奥美拉唑

答案：A

57. 口服可治疗肝豆状核变性病的是

- A: 青霉胺
- B: 二巯丁二钠
- C: 二巯丙醇
- D: 依地酸钙钠

答案：A

58. 患者，男，43 岁，患有家族性痛风，既往有磺胺类药物过敏史患者近日因工作应酬较多，未能控制饮食，昨夜造成痛风急性发作，右足第一跖趾关节出现红、肿、热、痛，疼痛剧烈。因无法忍受，今日晨起后速来药店购药，药师应推荐的药物是

- A: 丙磺舒
- B: 别嘌醇
- C: 对乙酰氨基酚

D: 碳酸氢钠

答案：C

59. 患者，男，58 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 停用瑞格列奈片

B: 停用二甲双胍肠溶片

C: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片

D: 停用阿托伐他汀钙片

答案：B

60. 可引起儿童良性颅压增高、囟门隆起的药物是

A: 维生素 A

B: 苯妥英钠

C: 抗组胺药

D: 氯霉素

答案：A

61. 脂溶性最高，作用快而短的是

A: 苯巴比妥

B: 戊巴比妥

C: 硫喷妥

D: 巴比妥

答案：C

62. 欲了解更多的药品不良反应信息，可优先查阅的文献是

A: 《中华人民共和国药典》

- B: 《梅氏药物副作用》
- C: 《中国国家处方集》
- D: 《新编药理学》

答案: B

63. (2021 年真题) 患者, 男, 69 岁, BMI27. 8kg/mr, 既往有骨性关节炎病史。近期爬山后, 再次出现膝关节疼痛, 患者热敷后疼痛未缓解, 前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 双氯芬酸钠缓释片
- B: 加巴喷丁胶囊
- C: 吗啡控释片
- D: 颠茄片

答案: A

64. 患者正在使用的药物中, 可使血尿酸水平升高的是 ()

- A: 美托洛尔和赖诺普利
- B: 氢氯噻嗪和阿司匹林
- C: 氢氯噻嗪和辛伐他汀
- D: 美托洛尔和辛伐他汀

答案: B

65. 促进铁剂吸收的

- A: 胰酶
- B: 牛奶、蛋类
- C: 维生素 C
- D: 碳酸氢钠

答案: C

66. 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15KG，一天前发热(39℃)，咽喉痛，无咳嗽、吐血，家长主诉在家中应用退烧药治疗，发病左右出现腹泻，约 2~5 次大便，量少，黄色粘液便，呕吐一次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽微充血，出现轻脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃，实验室检查：WBC： 5×10

- A: 若症状不能改善，及时加用诺氟沙星
- B: 若患儿腹泻加重，可口服自制补液盐进行补液
- C: 应给予少量、多次、清淡饮食
- D: 每次腹泻后均要少量多次喂水，直至腹泻停止

答案：A

67. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速作出准确判断，及时采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

- A: 催吐、洗胃
- B: 静脉补液
- C: 吸氧
- D: 导泻与洗肠

答案：A

68. 医师咨询"培氟沙星合用糖皮质激素抗感染"，属于

- A: 新药信息
- B: 药物相互作用
- C: 给药途径
- D: 禁忌证

答案：B

69. 口服吐根糖浆催吐用于解救

- A: 巴比妥中毒
- B: 三唑仑中毒
- C: 丙咪嗪中毒
- D: 磷化锌中毒

答案: C

70. 已知 1%(g/mL) 枸橼酸钠溶液的冰点降低值为 0.185°C ，计算其等渗溶液的浓度是()。

- A: 2.61(%, g/mL)
- B: 3.11(%, g/mL)
- C: 2.91(%, g/mL)
- D: 2.81(%, g/mL)

答案: D

71. 属于非核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂的是

- A: 奈韦拉平
- B: 扎西他滨
- C: 恩夫韦替
- D: 沙奎那韦

答案: A

72. 反复性偏头痛，推荐应用的药物是

- A: 谷维素
- B: 罗通定
- C: 阿司匹林
- D: 地西泮

答案：B

73. (2017 年真题) 慢性阻塞性肺病稳定期患者 (FEV₁<50%) 宜选用的治疗方案是 ()

- A: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素
- B: 长效 β_2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素
- C: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药
- D: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂

答案：B

74. 药师发药时提示患者“用药期间禁止饮酒或含酒精饮料”，针对的药物是

- A: 钆制剂
- B: 氯苯那敏
- C: 氟西汀
- D: 卡托普利

答案：C

75. 冠状动脉粥样硬化性心脏病患者，如无用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为预防治疗，最佳剂量范围是

- A: 75~150mg / d
- B: 25~50mg / d
- C: 150~300mg / d
- D: 25~75mg / d

答案：A

76. 应用铁剂的影响因素正常人对铁剂的吸收率为

- A: 10%~30%

B: 0.3

C: 10%~20%

D: 0.4

答案: C

77. 沿静脉出现迂回线状色素沉着的是

A: 氟尿嘧啶

B: 柔红霉素

C: 白消安

D: 博来霉素

答案: A

78. 下列金属解毒剂中，对铅中毒疗效最好的是

A: 依地酸钙钠

B: 二巯丁二钠

C: 硫代硫酸钠

D: 二巯丙醇

答案: A

79. 可导致男性乳房发育的降压药是

A: 螺内酯

B: 硝苯地平

C: 利血平

D: 氯沙坦

答案: A

80. 关于抗抑郁药用药注意事项及患者教育的说法，错误的是

A: 氟西汀停药 5 周之后才能换用 MAOIs

B: 尽可能采用最小有效剂量

C: 联合用药效果好，应为首选

D: 多种抗抑郁药合并使用，可增加 5-HT 综合征的发生风险

答案：C

81. 欲用 95%乙醇和蒸馏水配置 70%乙醇 1000ml，所取 95%乙醇体积约为：

A: 500ml

B: 737ml

C: 665ml

D: 700ml

答案：B

82. 用药与反应发生时间关系密切，有文献资料佐证；但引发 ADR 的药品不止一种，或原患疾病病情进展因素不能除外；此 ADR 因果关系可评价为

A: 待评价

B: 可能

C: 很可能

D: 可能无关

答案：B

83. 用二甘醇替代丙二醇所致的假药事件是

A: 鱼腥草事件

B: 关木通事件

C: 亮菌甲素事件

D: 欣弗事件

答案：C

84. 真菌引起阴道炎（）

- A: 聚甲酚磺醛
- B: 咪康唑
- C: 庆大霉素
- D: 甲硝唑

答案：B

85. 雷尼替丁

- A: 可导致驾驶员多尿或多汗
- B: 可使驾驶员出现定向力障碍
- C: 可使驾驶员出现眩晕和幻觉
- D: 可使驾驶员视物模糊或辨色困难

答案：B

86. 处方用药须与临床诊断密切相符，医师开具的处方在病情与诊断栏中应明确记录对患者的临床诊断。药师应审查处方用药与临床诊断的相符性，以加强合理用药监控。

- A: 无正当理由超适应证用药
- B: 有禁忌证用药
- C: 无适应证用药
- D: 无正当理由过度治疗用药

答案：A

87. 关于微生态制剂，下列说法不正确的是

- A: 可制约致病菌的生长繁殖
- B: 维持肠道正常菌群的平衡

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 减少肠内毒素的生成

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/707113014000010026>