

2024 甘肃省金川区《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题通关秘籍题库（巩固）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 对甲氧西林耐药的葡萄球菌引起的感染有效的抗生素为

- A: 万古霉素
- B: 氨曲南
- C: 哌拉西林
- D: 阿莫西林

答案：A

2. 与柔红霉素合用，可能增加心脏毒性的是

- A: 氧烯洛尔
- B: 放线菌素
- C: 肝素
- D: 对乙酰氨基酚

答案：A

3. 属于 I c 类抗心律失常药的是

- A: 奎尼丁
- B: 利多卡因
- C: 普罗帕酮
- D: 胺碘酮

答案：C

4. 强阿片类药物注射剂连续应该 3-5 日易出现

- A: 认知障碍
- B: 便秘、恶心、镇静功能受损
- C: 身体和精神依耐性
- D: 尿频、尿急、尿潴留

答案：C

5. 阿司匹林的主要适应证不包括()

- A: 预防血栓形成
- B: 急性心肌梗死
- C: 不稳定型心绞痛
- D: 胃溃疡

答案：D

6. 糖尿病酮症酸中毒患者宜选用

- A: 格列喹酮
- B: 珠蛋白锌胰岛素
- C: 正规胰岛素
- D: 二甲双胍

答案：C

7. 下列关于林旦的描述中，错误的是

- A: 不应与碱性物质接触
- B: 不应与铁制品接触
- C: 涂药前勿用热水和肥皂洗澡
- D: 不应与铜制品接触

答案：D

8. 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

A: 口服补液盐使用方便、价格低廉，发生腹泻时如能口服，应尽早使用

B: 口服补液盐 II 是等渗性口服补液盐

C: 腹泻导致重度脱水时首选静脉补液，情况稳定后可更换为口服补液盐治疗

D: 口服补液盐是复方制剂，II、II 代表不同的配方

答案：B

9. 血管紧张素 I 转化酶抑制剂是

A: 依那普利

B: 米力农

C: 地高辛

D: 多巴酚丁胺

答案：A

10. 老年患者长期大剂量应用 PPIs 可能导致的典型不良反应是

A: 骨折

B: 心律不齐

C: 乳房发育

D: 消化不良

答案：A

11. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：二甲双胍片口服 500mg，bid；阿卡波糖片口服 50mg，tid。

A: 餐前 2 小时

- B: 餐前 1 分钟
- C: 餐后半小时
- D: 餐后 1 小时

答案：B

12. 外用的增色素药分为 4 类，不包括

- A: 重金属元素及其化合物
- B: 煤焦油类
- C: 补骨脂素及其衍生物
- D: 肾上腺皮质激素类

答案：B

13. (2018 年真题) 不易发生“双硫仑样”反应的药物是 ()

- A: 头孢替安
- B: 头孢哌酮
- C: 头孢曲松
- D: 头孢他啶

答案：D

14. 下列属于吗氯贝胺作用机制的表述是

- A: 抑制 A 型单胺氧化酶，减少 5-HT、去甲肾上腺素的降解
- B: 选择性抑制 5-HT 的再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度
- C: 抑制突触前膜 5-HT、去甲肾上腺素的再摄取
- D: 抑制突触前膜去甲肾上腺素的再摄取

答案：A

15. (2016 年真题) 对杆菌属类厌氧菌敏感，属于头霉素

- A: 头孢吡肟

B: 头孢美唑

C: 氨曲南

D: 亚胺培南

答案：B

16. (2018 年真题) 同时具有短效和长效 (双时相) 作用的胰岛素/胰岛素类似物是 ()

A: 普通胰岛素注射液

B: 精蛋白锌胰岛素注射液

C: 预混胰岛素注射液

D: 甘精胰岛素注射液

答案：C

17. (2021 年真题) 属于乙酰胆碱酯酶抑制剂，用于改善脑功能及抗记忆障碍的药物 ()

A: 多奈哌齐

B: 依达拉奉

C: 吡拉西坦

D: 尼莫地平

答案：A

18. 可调节表皮细胞有丝分裂和更新 ()

A: 过氧苯甲酰

B: 维 A 酸

C: 异维 A 酸

D: 阿达帕林

答案：B

19. 易致血糖异常的药物是

- A: 青霉素
- B: 加替沙星
- C: 红霉素
- D: 氯霉素

答案：B

20. 主要作用于有丝分裂 M 期，干扰微管蛋白合成的药物是

- A: 高三尖杉酯碱
- B: 顺铂
- C: 氟尿嘧啶
- D: 多柔比星

答案：A

21. 对 I 型和 II 型单纯疱疹病毒作用最强的是

- A: 干扰素
- B: 阿昔洛韦
- C: 阿糖腺苷
- D: 奥司他韦

答案：B

22. 服用华法林过量可用下列哪种药物对抗

- A: 维生素 K
- B: 维生素 A
- C: 鱼精蛋白
- D: 糜蛋白酶

答案：A

23. 不属于减鼻充血药的是()

- A: 伪麻黄碱
- B: 羟甲唑啉
- C: 麻黄碱
- D: 色甘酸钠

答案: D

24. 关于青光眼治疗的说法，正确的是（）

- A: 不能联合作用机制不同的降眼压药物治疗青光
- B: 治疗闭角型青光眼的主要方法是使用降眼压药物
- C: 推荐长期口服 β 受体阻断剂用于降低眼压
- D: 长期使用卡替洛尔滴眼液可引起近视化倾向

答案: D

25. 患者，女，46 岁。以"口角歪斜 3 天"之主诉入院。3 天前洗澡冲凉后次日晨起刷牙时发现右口角漏水，右侧闭眼不紧，口角歪斜，伴右眼流泪。查体：大致正常。诊断：面神经麻痹(右侧)。医嘱：

- A: 1 次/日，午后 14 时给药
- B: 1 次/日，上午 8 时给药
- C: 3 次/日
- D: 夜间给药

答案: B

26. 儿童使用强效激素制剂，连续不应超过

- A: 2 周
- B: 3~5 天
- C: 5~7 天
- D: 3 天

答案：A

27. (2017 年真题) 属于 GLP-1 受体激动剂的药物是 ()

- A: 利拉鲁肽
- B: 阿格列汀
- C: 伏格列波糖
- D: 那格列奈

答案：A

28. 氟西汀用于治疗神经性贪食症，成人每日用量为

- A: 20mg
- B: 60mg
- C: 50mg
- D: 100mg

答案：B

29. 可用维生素 B12 治疗的疾病是

- A: 神经炎
- B: 缺铁性贫血
- C: 再生障碍性贫血
- D: 慢性失血性贫血

答案：A

30. 下列硝酸酯类药物起效最快的是

- A: 戊四醇酯
- B: 单硝酸异山梨酯
- C: 硝酸甘油
- D: 硝酸异山梨酯

答案：C

31. 寻常痤疮、鱼鳞病及银屑病可选用()

- A: 阿达帕林
- B: 酮康唑
- C: 维 A 酸
- D: 林旦霜

答案：C

32. 临床最常用的强心苷类正性肌力药是

- A: 米力农
- B: 依那普利
- C: 多巴酚丁胺
- D: 地高辛

答案：D

33. 目前治疗开角型青光眼的一线用药是

- A: 拟胆碱能药
- B: 拟肾上腺素能药
- C: 前列腺素类药物
- D: 碳酸酐酶抑制剂

答案：C

34. 一日 1 次固定时间给药的是

- A: 甘精胰岛素
- B: 谷赖胰岛素
- C: 赖脯胰岛素
- D: 门冬胰岛素

答案：A

35. 治疗阴道滴虫病的首选药物是()

- A: 多黏菌素
- B: 克林霉素
- C: 呋喃妥因
- D: 甲硝唑

答案：D

36. 患者，男，66 岁。BMI24kg/m²，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体：血压 163/83mmHg，心率 80 次/分。临床诊断为：(1) 心绞痛急性发作；(2) 心功能不全、心功能 III 级；(3) 高血压病 3 级；(4) 高脂血症。

- A: 阿托伐他汀
- B: 氨氯地平
- C: 美托洛尔
- D: 呋塞米

答案：C

37. 肝素过量可选用的拮抗药是()

- A: 鱼精蛋白
- B: 葡萄糖酸钙
- C: 维生素 K
- D: 氨基己酸

答案：A

38. 刺激胰岛细胞分泌胰岛素的是()

- A: 胰岛素
- B: A 和 B 均无效
- C: 磺酰脲类
- D: 二甲双胍

答案：C

39. 甲氨蝶呤抗肿瘤作用机制是抑制

- A: 二氢叶酸还原酶
- B: 四氢叶酸还原酶
- C: 四氢叶酸合成酶
- D: 二氢叶酸合成酶

答案：A

40. 对红霉素的描述，下列不正确的是

- A: 属繁殖期杀菌剂
- B: 抗菌谱与青霉素相似但略广
- C: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效
- D: 具有肝脏毒性

答案：A

41. 为碱性染料，能抑制革兰阳性菌和少数革兰阴性菌繁殖，对人无害、无刺激的消毒防腐药是

- A: 过氧乙酸
- B: 聚维酮碘
- C: 依沙吖啶
- D: 氯己定

答案：C

42. 氨基糖苷类作用机制

A: 抑制细菌蛋白质合成

B: 干扰细菌核酸代谢

C: 抑制细菌糖代谢

D: 抑制细菌细胞壁合成

答案：A

43. 具有低毒，可用于对青霉素类、头孢菌素类过敏的患者的药物是()

A: 阿莫西林

B: 亚胺培南

C: 克拉维酸

D: 氨曲南

答案：D

44. (2021 年真题) 舌下给药吸收迅速、起效最快，作为心绞痛急性发作首选的治疗药物是 ()

A: 硝酸异山梨酯

B: 硝酸甘油

C: 美托洛尔

D: 单硝酸异山梨酯

答案：B

45. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊，塞来昔布胶囊，碳酸氢钠治疗。

A: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻滞尿酸的生成

- B: 促进尿酸分解，将尿酸转化为溶解性好的尿囊素
- C: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化，减轻炎症症状
- D: 抑制肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加

答案：C

46. 主要通过选择性抑制 5-HT 再摄取而引起抗抑郁作用的药物是（）

- A: 度洛西汀
- B: 帕罗西汀
- C: 吗氯贝胺
- D: 马普替林

答案：B

47. 骨折患者、低磷血症患者不宜服用

- A: 三硅酸镁
- B: 氢氧化铝
- C: 氢氧化镁
- D: 碳酸钙

答案：B

48. 可用于治疗非何杰金(非霍奇金)淋巴瘤的单克隆抗体是()

- A: 西妥昔单抗
- B: 贝伐单抗
- C: 利妥昔单抗
- D: 曲妥珠单抗

答案：C

49. 双炔失碳酯需服满的片数是

- A: 6 片

B: 7 片

C: 12 片

D: 14 片

答案：C

50. 磺酰脲类药物最常见的不良反应

A: 眩晕嗜睡

B: 低血糖

C: 腹痛、腹泻

D: 共济失调

答案：B

51. 用于防止排异反应、糖皮质激素不能长期缓解的多种自身免疫性疾病的是()

A: 环磷酰胺

B: 甲泼尼龙

C: 硫唑嘌呤

D: 环孢素

答案：A

52. 目前疗效最为肯定的一种保护肝细胞结构和功能的药物是

A: 复方甘草甜素

B: 硫普罗宁

C: 多烯磷脂酰胆碱

D: 联苯双酯

答案：C

53. 属于解毒类保肝药的是

- A: 异甘草酸镁
- B: 还原型谷胱甘肽
- C: 双环醇
- D: 多烯磷脂酰胆碱

答案：B

54. 主要用于控制疟疾症状的药物是

- A: 甲硝唑
- B: 吡喹酮
- C: 氯喹
- D: 乙胺嘧啶

答案：C

55. 急性化脓性中耳炎患者，鼓膜穿孔后停用 2%酚甘油滴耳，是因为酚甘油

- A: 油剂不易经穿孔进入中耳
- B: 没有抗生素水溶液效果佳
- C: 对鼓室黏膜及鼓膜有腐蚀作用
- D: 仅有止痛作用

答案：C

56. 属于贝丁酸类调节血脂药是（）。

- A: 依折麦布
- B: 阿托伐他汀
- C: 非诺贝特
- D: 阿昔莫司

答案：C

57. 对短动作电位时程的心房肌无效，仅用于室性心律失常的是()

- A: 利卡多因
- B: 普萘洛尔
- C: 维拉帕米
- D: 奎尼丁

答案：A

58. 伴有痛风的水肿患者，不宜选用下列哪种药物利尿()

- A: 乙酰唑胺
- B: 阿米洛利
- C: 氨苯蝶啶
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

59. 采用华法林钠治疗需短期缓解痛楚时，宜选用的药品是()

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 维生素 B1
- C: 维生素 B12
- D: 维生素 B2

答案：A

60. 患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

- A: 通过增强抗凝血酶川 (AT-III) 的活性，抑制凝血因子 IIa 和 Xa 发挥抗凝作用
- B: 体外试验具有直接的抗凝活性，可抑制体外凝血过程
- C: 能刺激脂蛋白脂肪酶的释放，加速血液循环中脂蛋白的清除

D: 能使凝血级联的丝氨酸蛋白酶失活

答案: A

61. 以下选项中，不属于沙美特罗的适应证的是()

A: 肺气肿伴气道痉挛的治疗

B: 缓解支气管痉挛的急性症状

C: 慢性支气管炎伴气道痉挛的治疗

D: 夜间哮喘的预防和维持治疗

答案: B

62. 不能用于隐球菌感染的抗真菌药是

A: 伊曲康唑

B: 氟康唑

C: 伏立康唑

D: 卡泊芬净

答案: D

63. 常在用药 1 周后出现刺激性干咳的是

A: 哌唑嗪

B: 地高辛

C: 卡托普利

D: 氨氯地平

答案: C

64. 不可用于降低眼压的药物是

A: 毛果芸香碱滴眼剂

B: 拉坦前列素滴眼剂

C: 卡替洛尔滴眼剂

D: 利福平滴眼剂

答案: D

65. 关于甲硝唑作用特点和用药注意事项的说法错误的是()

- A: 甲硝唑属于时间依赖型抗菌药物
- B: 甲硝唑有致突变和致畸作用
- C: 甲硝唑半衰期比奥硝唑短
- D: 甲硝唑代谢产物可能使尿液颜色加深

答案: A

66. (2019 年真题) 长期使用可引起听力减退、肾功能下降的抗结核药物是()

- A: 利福平
- B: 吡嗪酰胺
- C: 乙胺丁醇
- D: 链霉素

答案: D

67. 属于抗流感病毒药的是

- A: 恩替卡韦
- B: 奥司他韦
- C: 阿昔洛韦
- D: 司他夫定

答案: B

68. 治疗黏液性水肿的主要药物是()

- A: 小剂量碘剂
- B: 甲巯咪唑

C: 丙硫氧嘧啶

D: 甲状腺素

答案: D

69. 关于蒙脱石散的作用特点及临床使用的说法错误的是 ()

A: 直接服用或调成糊状、丸状服用

B: 不被胃肠道吸收对中枢神经及心血管系统无不良影响

C: 腹泻患者宜在两餐之间服用

D: 对伴有感染的腹泻患者应联合应用有效的抗菌药物治疗

答案: A

70. 治疗危重深部真菌感染的唯一有效药是 ()

A: 青霉素

B: 克林霉素

C: 两性霉素 B

D: 氟康唑

答案: C

71. 特比萘芬属于

A: 唑类

B: 抗生素类

C: 丙烯胺类

D: 吗啉类

答案: C

72. 氟喹诺酮类

A: 禁用于早产儿、新生儿

B: 禁用于 8 岁以下儿童

C: 禁用于胆道阻塞患者

D: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年

答案: D

73. 只对癌细胞起作用而对正常体细胞几乎没有伤害的是

A: 氟他胺

B: 阿那曲唑

C: 他莫昔芬

D: 曲妥珠单抗

答案: D

74. 癫痫小发作选用

A: 乙琥胺

B: 丙戊酸钠

C: 苯妥英钠

D: 苯巴比妥

答案: A

75. 抗血小板药西洛他唑属于

A: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂

B: 磷酸二酯酶抑制剂

C: 维生素 K 拮抗剂

D: 整合素受体阻断剂

答案: B

76. 属于胸苷酸合成酶抑制剂

A: 氟尿嘧啶

B: 放线菌素

C: 紫杉醇

D: 顺铂

答案: A

77. 患者男性，56 岁。有糖尿病史 15 年，近日并发肺炎，呼吸 35 次/分，心率 105 次/分，血压 160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖 500mg/dl，诊断为糖尿病酮症酸中毒。

A: 口服

B: 皮下

C: 舌下含服

D: 静脉

答案: D

78. 周某，男，31 岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

A: 硫酸亚铁

B: 四氢叶酸

C: 维生素 B12

D: 叶酸

答案: A

79. 易透过血脑屏障用于治疗普通型奈瑟球菌脑脊髓膜炎的药物是

A: 磺胺多辛

B: 甲氧苄啶

C: 磺胺嘧啶

D: 复方新诺明

答案: C

80. 异烟肼联用对乙酰氨基酚使

- A: 吸收减少
- B: 肝毒性增加
- C: 月经不规则
- D: 疗效减弱

答案：B

81. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊，塞来昔布胶囊，碳酸氢钠治疗。

- A: 选择注射给药
- B: 选择短期口服给药
- C: 选择注射与口服并用
- D: 选择长期口服给药

答案：B

82. 下述关于甘油的描述，错误的是

- A: 属于润滑性泻药
- B: 属于渗透性泻药
- C: 用于便秘的治疗
- D: 妊娠期妇女慎用

答案：B

83. 作用于细菌二氢叶酸还原酶而发挥作用的抗菌药物是

- A: 磺胺甲唑
- B: 甲氧苄啶
- C: 呋喃妥因
- D: 利奈唑胺

答案：B

84. 氟尿嘧啶的前体药物，对结肠和直肠癌疗效较高

- A: 卡莫氟
- B: 来曲唑
- C: 羟喜树碱
- D: 甲氨蝶呤

答案：A

85. 噻嗪类利尿药略增加 HCO_3^- 的排泄，是因为其可以抑制

- A: 碳酸酐酶
- B: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子
- C: 磷酸二酯酶
- D: Na^+-Cl^- 共转运子

答案：A

86. （2015 年真题）属于二磷酸腺苷 P_2Y_{12} 受体阻断剂的是（ ）。

- A: 奥扎格雷
- B: 替罗非班
- C: 阿司匹林
- D: 氯吡格雷

答案：D

87. 属于 Ic 类抗心律失常药的是（ ）

- A: 普鲁卡因胺
- B: 普罗帕酮
- C: 奎尼丁

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 胺碘酮

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/708053071042007022>