医院感染标准预防措施



contents

目录

- 医院感染概述
- 标准预防措施
- 针对不同患者的预防措施
- 培训与教育
- 监测与评估

01

CATALOGUE

医院感染概述

定义与分类

定义

医院感染是指在医院内获得的感染，包括在住院期间发生的感染和在医院内获得、出院后发生的感染。

分类

根据感染来源，医院感染可分为内源性感染和外源性感染。内源性感染是指自身携带的病原体引起的感染，如皮肤黏膜表面的细菌、真菌等；外源性感染是指外界病原体通过各种传播途径引起的感染，如呼吸道、消化道、血液等途径传播的病原体。

医院感染的传播途径



接触传播

通过接触被污染的物体表面、医疗器械、医护人员的手等传播。



飞沫传播

通过咳嗽、打喷嚏、谈话等产生的飞沫传播。



空气传播

通过空气中的病原体颗粒传播。



血液传播

通过血液接触传播，如针刺伤、手术操作等。

医院感染的危害

01



影响患者健康

医院感染可加重患者病情，延长住院时间，增加医疗费用，甚至危及患者生命。

02



影响医护人员健康

医护人员长期暴露于医院感染的环境中，容易感染各种病原体，影响其身体健康。

03



影响医院声誉

医院感染的发生可能导致医疗纠纷，影响医院声誉和形象。

02

CATALOGUE

标准预防措施

手卫生







洗手

医务人员在接触患者前后、进行无菌操作前后、接触患者体液或污染物品后，以及接触患者使用过的物品后，均应进行手卫生。

手消毒

在诊疗过程中，医务人员手部没有明显污染物时，可以使用速干手消毒剂进行手部消毒。

防护用品的使用

口罩

医务人员在进行诊疗活动时应佩戴医用口罩，特别是在接触呼吸道分泌物、处理大量体液和感染性物质时。

手套

在接触患者体液、血液、分泌物、排泄物等可能具有传染性的物质时，医务人员应佩戴一次性手套。



清洁与消毒



物体表面清洁与消毒

定期对医院内的床头柜、床架、诊疗台等物体表面进行清洁和消毒。

空气消毒

对医院内的空气进行定期消毒，以降低空气中的微生物含量。

隔离与防护

隔离措施

对疑似或确诊患有传染病的患者，应采取隔离措施，以防止疾病传播。



防护措施

医务人员在接触可能具有传染性的物质或患者时，应采取相应的防护措施，如穿隔离衣、戴护目镜等。

03

CATALOGUE

针对不同患者的预防措施

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/708107110065006044