

2011~12 学年第二学期全科医生转岗培训试题

一、单选题

- 全科医学的准确表达是 (A)
 - 集生物学、行为科学、社会科学于一体的综合性医学学科
 - 集中医、西医于一体的综合性医学学科
 - 集临床治疗、临床护理于一体的综合性医学学科
 - 集住院治疗、家庭治疗于一体的综合性医学学科
- 全科医生的服务对象是 (D)
 - 妇女、儿童、老人
 - 病人和亚健康人
 - 门诊患者、住院患者
 - 社区全体居民
- 世界家庭医生学会 (WONCA) 什么时间? 在什么地方成立? (C)
 - 1948 年在美国的芝加哥成立
 - 1965 年在加拿大多伦多成立
 - 1972 年在澳大利亚墨尔本成立
 - 2000 年在英国伦敦成立
- 全科医生与专科医生在服务理念上的最主要区别是 (A)
 - 全科医生以病人为中心, 专科医生以疾病为中心
 - 全科医生中西医结合, 专科医生以中医或西医为主
 - 全科医生以疾病诊断为目的, 专科医生以疾病治疗为目的
 - 全科医生以门诊服务为主要行医方式, 专科医生以住院服务为主要行医方式
- 由父母及其未婚子女 (或养子女) 组成的家庭, 被称之为 (A)
 - 核心家庭
 - 联合家庭
 - 扩展家庭
 - 主干家庭
- 在家庭生活周期中, 所有孩子离家至家长退休, 此阶段被称之为 (B)
 - 孩子离家创业期
 - 空巢期
 - 老龄期
 - 老龄进程期
- 在家庭生活周期中, 家庭夫妇患慢性非传染性疾病机会最高的阶段是 (C)
 - 有青少年期
 - 孩子离家创业期
 - 空巢期
 - 退休以后
- 下列哪一条表述不能充分体现全科医疗服务特色 (A)
 - 以诊疗为目的
 - 以个人为中心
 - 以家庭为单位
 - 以社区为范围
- 下列哪一条表述不能恰当体现全科医生行医准则 (D)
 - 了解病人的完整背景
 - 了解病人的就诊期望
 - 了解病人的发病经历
 - 了解病人的个人隐私
- 当家庭生活变化单位 (LCU) 超过 300 分时, 正确的表述是 (D)
 - 无有实际意义 (患病概率为 33%)
 - 轻度生活变故 (患病概率为 33%)
 - 中等生活变故 (患病概率为 50%)
 - 重大生活变故 (患病概率为 80%)
- 依据中国传统文化, 下列生活事件中, 哪一条 LCU 分值较大? (A)
 - 丧偶、丧子、丧父母
 - 离婚、复婚、婚外恋
 - 参军、入党、中大奖
 - 升迁、降级、受处分
- 对于各科常见病能熟悉发病机制、诊断鉴别及处理原则, 这种能力的准确表述应是 (D)
 - 擅长鉴别诊断
 - 擅长临床治疗
 - 基础理论扎实
 - 相对通科化能力
- 全科医生与病人之间的新型医患关系应该是 (C)
 - 主动被动型
 - 被动主动型
 - 良好合作型
 - 服从命令型
- “经医生诊断某个脏器确实有病”, 这种生物学异常被称之为 (A)
 - 患病体验
 - 疾患意识
 - 病患影响
 - 疾病意识
- 病人一般具有 5 种需要, 其中哪一种为最高层次的需要? (D)
 - 生理需要和安全需要
 - 归属和爱的需要
 - 自尊的需要
 - 自我实现的需要
- 请指出下列糖尿病综合防治措施中, 哪一条是最关键举措 (A)
 - 健康教育
 - 血糖自测
 - 规律服药
 - 控制饮食、适当运动
- “中老年低盐低脂膳食”以预防高血压! 该举措属于哪一级预防策略 (A)
 - 第一级预防
 - 第二级预防
 - 第三级预防
 - 为综合预防
- 对育龄妇女进行乳腺癌普查, 以便发现早期患者! 该举措属于哪一级预防策略 (B)
 - 第一级预防
 - 第二级预防
 - 第三级预防
 - 为综合预防
- 在居民健康档案工作中, 下列哪一条是目前存在的最主要问题 (B)
 - 建档数量不足
 - 档案数据不准
 - 缺少电子档案
 - 档案没有利用
- 全科医生转岗培训的主要目的是 (D)
 - 提高临床诊疗水平
 - 强化预防医学技能

- C. 优化健康教育方法 D. 掌握全科医学理念、内容、技巧
21. 深化医药卫生体制改革的总体目标是(D)
- A. 建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度
B. 为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务
C. 基本公共卫生服务均等化，人人享有基本医疗卫生服务
D. 建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务
22. 加大基层卫生人才培养，至 2015 年，要达到每万名居民配备 (B) 名合格的全科医师
- A. 1~2 B. 2~3 C. 3~4 D. 4~5
23. 建立科学合理的医疗服务价格体系，不包括 (D)
- A. 要保证医院在提供服务过程中消耗的资源，能通过收费得到合理补偿
B. 要确保患者接受医疗服务，向医院所支付的费用，应该高于医疗服务的成本，使医院经营略有结余，保持适度发展能力
C. 要使医疗服务的价格体系具有规范和引导医院行为的作用，保证公立医院的行为与社会总目标一致
D. 放眼世界，建立覆盖全民的完善的医疗卫生制度
24. 新医改方案的亮点，不包括 (A)
- A. 公立医院管理制度突出公共服务职能
B. 新医疗改革逐渐稳步推进
C. 新医改摒弃了市场化，强调公益性，增强了政府的责任
D. 从制度和体系中改革，新医改方向明晰，全民医保众望所归
25. 医药卫生体制改革坚持公共医疗卫生的公益性质，除外 (C)
- A. 预防为主 B. 以农村为重点 C. 公平性 D. 中西医并重
26. 中共中央发布《关于深化医药卫生体制改革的意见》的时间是在 (C)
- A. 2007 年 4 月 6 日 B. 2008 年 4 月 6 日 C. 2009 年 4 月 6 日 D. 2010 年 4 月 6 日
27. 2009 年全面推开城镇居民基本医疗保险制度，将在校大学生全部纳入 (B)
- A. 城镇职工基本医疗保险 B. 城镇居民基本医疗保险 C. 新型农村合作医疗制度 D. 医疗救助
28. 人均基本公共卫生服务经费标准，2011 年是 (C)
- A. 15 元 B. 20 元 C. 25 元 D. 30 元
29. 政府对新农合医保补助标准为 2012 年每人 (D)
- A. 120 元 B. 180 元 C. 200 元 D. 240 元
30. 政府举办的中心乡镇卫生院非目录药品年销售量不得超过整个药品年销售量的 (A)
- A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%
31. 新医改三年中，全国财政医疗卫生实际支出共计 (D)
- A. 4506 亿元 B. 8500 亿元 C. 11300 多亿元 D. 15100 多亿元
32. 2012 年 3 月由国务院发布的《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》，强调医改工作最大的难点是 (C)
- A. 基本药物制度的全覆盖 B. 药品价格虚高不下 C. 公立医院改革 D. 补偿问题
33. 到 (C)，我省所有的医疗机构也都要实现药品零差率销售，革除以药补医弊端。
- A. 2015 年底 B. 2020 年底 C. 2025 年底 D. 2020 年
34. 《国家基本公共卫生服务规范 (2011 年版)》中，健康档案管理的服务对象是 (D)
- A. 辖区内居民 B. 0~6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、重性精神疾病患者
C. 亚健康人群 D. 辖区内居住半年以上的户籍及非户籍居民
35. 居民健康档案编码，统一采用 (D)
- A. 11 位编码制 B. 12 位编码制 C. 15 位编码制 D. 17 位编码制
36. 居民健康档案编码，第三段为 3 位数字，表示 (D)
- A. 省级的行政区划 B. 市县级的行政区划 C. 乡镇的行政区划 D. 村民委员会
37. 60 度白酒 1 两，折合 (B)
- A. 干红 3 两 B. 啤酒 1 瓶 C. 黄酒 3 两 D. 果酒 3 两
38. 下列哪项不是个人健康档案的基本内容 (D)
- A. 健康问题目录 B. 健康问题描述 C. 病程流程图 D. 家庭功能评估资料
39. 以 SOAP 形式进行健康问题描述时不包括下列哪项 (C)
- A. 主观资料 B. 客观资料 C. 完整的流行病学调查资料 D. 健康问题的评价
40. 居民健康档案连续而全面，全科医生通过病史记录和病例回顾，可以： (A)
- A. 掌握病人的就医行踪，及时敏感地发现病人潜在的问题

- B. 积累医疗经验以及从事科学研究的良好素材和证据
 C. 为全科医生提供病人全面的基础资料
 D. 充分体现了全科医学的各项原则
41. 呼吸衰竭的患者临床上出现最早的症状是 (B)
 A. 胸部疼痛 B. 呼吸困难 C. 咯血 D. 精神错乱
42. 在现场抢救急性中毒病人首先应采取用排出毒物的方法是 (D)
 A. 漏斗洗胃 B. 电动洗胃机洗胃 C. 剖腹洗胃 D. 口服催吐
43. 关于肝破裂诊断下列哪项是错误的 (D)
 A. 右上腹外伤 B. 局部疼痛及压痛 C. 血红蛋白值逐渐下降 D. 必须等待腹腔穿刺抽出血液
44. 断肢的现场急救不包括 (D)
 A. 止血 B. 包扎 C. 断肢的保存 D. 彻底清创术
45. 急性有机磷农药中毒发生肺水肿时, 首要抢救措施是 (C)
 A. 彻底洗胃 B. 强心甙静注 C. 静注阿托品 D. 吗啡皮下注射
46. 急性有机磷农药最常见的中毒死因是 (C)
 A. 中毒性休克 B. 急性肾功能衰竭 C. 呼吸衰竭 D. 中毒性心肌炎
47. 有机磷杀虫药中毒, 在人体分布最多的器官为 (B)
 A. 肺 B. 肝 C. 肾 D. 脾
48. 有机磷杀虫药对人体的毒性主要是 (D)
 A. 增加乙酰胆碱酯酶活力 B. 增加乙酰胆碱的产生 C. 减少乙酰胆碱的产生 D. 抑制乙酰胆碱酯酶活力
49. 女, 25 岁, 服敌敌畏昏迷 2 小时。查体: 大汗, 双瞳孔针尖样大小, 双肺布满湿啰音, 心率 79 次/分律齐, 无杂音。最佳的抢救原则是 (A)
 A. 洗胃+静脉滴注解磷定+静脉注射阿托品 B. 洗胃+静脉注射阿托品
 C. 洗胃+静脉注射解磷定 D. 洗胃+给氧
50. 关于急性一氧化碳中毒的治疗, 下列哪项是错误的 (A)
 A. 应立即原地抢救 B. 鼻导管吸氧, 严重者应用高压氧舱
 C. 防止脑水肿 D. 可用冬眠疗法及补充脑细胞代谢需要的物质
51. 使用氧气时, 下列哪一项是错误的 (D)
 A. 不可在氧气筒的螺旋上涂油和用力摩擦、震动
 B. 至少距明火 5 米, 距暖气 1 米
 C. 使用氧气时先调节流量再使用, 停氧时先拔出鼻导管再关氧气
 D. 尽可能将氧气筒内的氧气用尽再更换, 减少浪费
52. 腹部闭合性损伤中, 较多见的实质性脏器损伤为 (C)
 A. 肝 B. 肾 C. 脾 D. 肾上腺 E. 胰
53. 当吸氧的浓度大于 60%, 吸氧时间大于 24 小时, 会出现 (A)
 A. 氧中毒 B. 缺氧症状明显
 C. 动脉血氧分压和二氧化碳分压有效纠正 D. 酸碱度在 7.35~7.45 之间
54. 张力性气胸产生休克, 急救措施首先是 (D)
 A. 输血 B. 用升压药 C. 抗休克同时开胸探查 D. 患侧胸腔排气减压
55. 诊断心跳骤停迅速可靠的指标是 (A)
 A. 大动脉搏动消失 B. 呼吸停止 C. 瞳孔散大 D. 血压测不到 E. 脉搏不清
56. 复苏处理要争分夺秒, 最主要的目的是 (A)
 A. 为迅速恢复脑的血液循环 B. 使心脏迅速恢复跳动 C. 使自主呼吸提早恢复 D. 为减轻酸中毒
57. 心脏骤停时最迅速的处理是 (C)
 A. 口对口的人工呼吸 B. 纯氧人工呼吸 C. 胸外心脏按压 D. 胸内心脏按压
58. 心脏性猝死的时间定义为 (A)
 A. 症状出现 1 小时内发生心脏骤停 B. 症状出现 6 小时内发生心脏骤停
 C. 症状出现 12 小时内发生心脏骤停 D. 症状出现 24 小时内发生心脏骤停
59. 溺水现场的急救措施不包括 (E)
 A. 清除口鼻异物 B. 控水处理 C. 人工呼吸 D. 胸外心脏按压
60. 现场救护的“生命链”中第二个环节是 (B)
 A. 尽早识别心脏停止与激活 EMS B. 尽早 CPR, 并强调先做胸部按压
 C. 早期快速心脏电除颤 D. 有效的高级生命支持
61. 2010 年成人心肺复苏指南中错误的一项是 (D)

- A. 潮气量为 500-600ml B. 心脏停搏时推荐的每次吹气时间不少于 1 秒
C. 人工呼吸的频率为 8-10 次/分 D. 颈动脉搏动的正确位置是环状软骨旁开两横指
62. 淡水淹溺者心脏骤停的主要原因是 (A)
A. 高钾血症 B. 胸部刺激 C. 肺水肿 D. 低蛋白血症
63. 成人海姆立克急救法下列错误的是 (E)
A. 抢救者站在病人背后，用两手臂环绕病人的腰部
B. 一手握拳，将拳头的拇指一侧放在病人胸廓上和脐上的腹部
C. 用另一手抓住拳头、快速向上重击压迫病人的腹部
D. 重复以上手法直到异物排出
64. 在院前急救过程，说法正确的是 (A)
A. 对大量的伤员首先应该进行分诊 B. 成批伤员抢救时，对所有伤员均应尽快送至最近的医院抢救
C. 对于一氧化碳中毒的病人应就地抢救，不可搬动 D. 在现场对于所有的伤员均应彻底体检
65. 男性，30 岁，右胸车祸伤 1 小时，呼吸困难，发绀，查体：脉搏 130 次/分，血压 76/50mmHg，右前胸可及皮下气肿，右胸叩鼓音，右肺呼吸音消失，最可能的诊断是 (B)
A. 张力性气胸 B. 闭合性气胸 C. 创伤性血胸 D. 创伤性休克
66. 关于止血带止血法，下列正确的是 (A)
A. 连续阻断血流时间一般不超过 1h B. 可用绳索、电线缚扎
C. 上臂止血带缚在中 1/3 处 D. 前臂用橡胶带缚扎
67. 不属于急救器械的物品是 (D)
A. 全自动吸痰机 B. 心电图机 C. 电动洗胃机 D. 雾化吸入器
68. 遇到下列情况，首先应抢救 (D)
A. 休克 B. 昏迷 C. 脾破裂 D. 开放性气胸
69. 重度哮喘是指严重哮喘发作至少持续时间在 (C)
A. 6 小时以上 B. 12 小时以上 C. 24 小时以上 D. 48 小时以上
70. 病人在烈日下进行体力活动 2 小时，大量出汗，口渴，并出现胸闷、心悸、恶心、呕吐等症，腋温 38℃，脉搏 105 次/分，血压 12.0/6.7kPa (90/50mmHg)。此时最佳抢救措施为？ (A)
A. 转移至通风、阴凉处 B. 口服大量清凉饮料 C. 冰水浸浴 D. 5%葡萄糖盐水 500ml 快速静脉滴入
71. 心理科学诞生的标志是： (C)
A. 希波克拉底提出气质体液说 B. 弗洛伊德提出精神分析理论
C. 冯特在莱比锡建立第一个心理实验室 D. 詹姆斯等人提出新心理学理论
72. 当前广泛提倡的新的医学模式是： (D)
A. 生物医学模式 B. 整体平衡模式 C. 心理社会模式 D. 生物-心理-社会医学模式
73. 不一定有诊断意义的听幻觉为： (D)
A. 争论性幻听 B. 评论性幻听 C. 命令性幻听 D. 原始性幻听
74. 精神心理疾病中自杀最多的疾病是： (B)
A. 神经衰弱 B. 抑郁症 C. 精神分裂症 D. 强迫症
75. 病人发病时，自觉头变大，腹部变短而小，见房子也变样了，书报上文字高出纸面。这种症状称为：
A. 幻觉 B. 错觉 C. 幻想 D. 感知综合障碍 (D)
76. 女性，44 岁，在强烈精神刺激后起病，立即出现面无表情，僵住不动，不语，外界刺激不能引起相应反应，几分钟后恢复正常，事后不能全部回忆，可考虑诊断为： (D)
A. 精神分裂症紧张型 B. 抑郁症 C. 急性短暂性精神障碍 D. 创伤后应激障碍
77. 患者，男性 35 岁，坚信有人在食物中放毒想将他毒死，这种想法虽然经他人再三解释，不能说服，他的症状是： (D)
A. 幻觉 B. 思维联想障碍 C. 强迫性思维 D. 被害妄想
78. 精神分裂症治疗缓解后最好的康复措施是： (B)
A. 继续长期服用大剂量抗精神药物 B. 及早参加社会活动，坚持抗精神病药物维持治疗
C. 继续住院巩固治疗 D. 参加多种工娱治疗
79. 精神分裂症发病年龄多在： (B)
A. 儿童期 B. 青壮年 C. 中年期 D. 老年期以后
80. 哪种幻觉对精神分裂症诊断有意义： (B)
A. 一般幻听 B. 评论性言语性幻听 C. 幻嗅 D. 幻触
81. 焦虑是一种具有恐惧、紧张的情感必然同时伴有： (C)
A. 肌肉紧张 B. 哭泣 C. 植物神经反应 D. 自杀观念

82. 每见尖物即感恐惧不安,心慌,手抖,面红出汗,拿开后慢慢恢复正常,自知没有必要,但不能控制,应属: (B)
A. 强迫症 B. 恐惧症 C. 焦虑症 D. 神经衰弱
83. 每次上街,不能控制地数电线杆,自感痛苦要求治疗,应属: (B)
A. 恐怖症 B. 强迫症 C. 神经衰弱 D. 抑郁症
84. 抑郁发作睡眠障碍的特点是: (C)
A. 入睡困难 B. 睡眠过多 C. 早醒 D. 多梦
85. 精神分裂症最常见的临床类型是: (D)
A. 单纯型 B. 青春型 C. 紧张型 D. 偏执型
86. 通过交谈或问卷的方法了解一些人对某一事件的感受、态度和行为,在医学心理学的研究方法中属于: (A)
A. 调查法 B. 临床观察法 C. 个案法 D. 实验法
87. 弗洛伊德认为正常人的心理活动大部分是在哪一层次运行: (C)
A. 意识活动 B. 前意识活动 C. 潜意识活动 D. 前意识与潜意识活动
88. 按照需要起源,可把需要分为哪两大类: (A)
A. 生理性需要和社会性需要 B. 生理性需要和心理性需要
C. 自然需要和精神需要 D. 物质需要和精神需要
89. 与肿瘤有密切关系的行为是: (C)
A. A 型 B. B 型 C. C 型 D. D 型
90. 《红楼梦》中的林黛玉,其动作稳定缓慢,观察事物细致入微,敏感多疑,孤独多虑,情感体验深刻且持久。林黛玉的气质类型属于: (D)
A. 多血质 B. 粘液质 C. 胆汁质 D. 抑郁质
91. 《中共中央国务院关于进一步加强农村卫生的决定》(中发【2002】13号)中明确提出,各级政府要积极组织引导农民建立以大病统筹为主的新型农村合作医疗制度,重点解决农民因患传染病、地方病等大病而出现的因病致贫、返贫问题。商丘市自2003年,下列哪个县被全省列为第一批新农合试点地区 (C)
A. 夏邑 B. 虞城 C. 夏邑 D. 宁陵
92. 2012年度,农民自筹资金为50元,新农合财政补助资金为 (D)
A. 220 B. 240 C. 200 D. 240
93. 为确保基金安全,要求新农合基金实行分账户管理,各县(市、区)财政局设立 (B)
A. 卫生局专户 B. 财政专户 C. 支出户 D. 医保户
94. 2012年全市继续实行统一的新农合补偿方案,继续实行下列哪种补偿方案。(D)
A. 家庭账户+住院补偿 B. 门诊统筹+大病统筹 C. 家庭账户+门诊统筹 D. 家庭账户+门诊统筹+大病统筹
95. 2012年5月份,河南省卫生厅调整了全省新农合补偿起付线,调整后的乡级起付线为 (A)
A. 200元 B. 100元 C. 200元 D. 100元
96. 2012年统筹补偿方案提高了对重大疾病的保障水平,一次性住院花费在10万元以上的,合理费用减相应级别起付线后,报销 (B)。
A. 80% B. 90% C. 75% D. 85%;
97. 2012年新农合个人住院封顶线为 (D)。
A. 年累计100000元 B. 年累计120000元 C. 年累计60000元 D. 年累计150000元
98. 2012年新农合实施方案规定,参合孕产妇计划内住院分娩,在乡镇卫生院住院的,定额收费550元,补助 (D)
A. 200元 B. 500元 C. 300元 D. 250元
99. 2012年商丘市新农合慢性病的报销比例和门诊统筹报销的比例分别为 (A)
A. 70%; 60% B. 60%, 70% C. 60%, 75% D. 60%, 50%
100. 随着新农合制度的推进,为了方便农民,目前河南省省内所有省、市级新农合定点医疗机构全部实行了即时结报。因此,河南省省内所有定点医院,省、市、县、乡四级,参合患者按照规定就医,出院医疗费用可以 (B)。
A. 一周之后结算 B. 直接结算 C. 一天后 D. 半月之后结算
101. 任何单位或者个人开展诊疗活动,必须依法取得 (C)。
A. 《设置医疗机构批准书》 B. 《设置医疗机构备案回执》
C. 《医疗机构执业许可证》 D. 《医疗机构校验申请书》
102. 医疗机构的门诊病历的保存期不得少于 () 年;住院病历的保存期不得少于 () 年。(B)
A. 10、20 B. 15、30 C. 30、15 D. 15、20
103. 医师注册后,在执业过程中应当按照以下注册内容执业 (C)。

- A. 执业范围、执业目的、执业类别 B. 执业地点、执业机构、执业范围
C. 执业范围、执业类别、执业地点 D. 执业范围、执业类别、医疗机构
104. 对考核不合格的医师，县级以上人民政府卫生行政部门可以（ B ）。
A. 吊销其医师执业证书 B. 责令其暂停执业活动 3 个月至 6 个月，并接受培训和继续教育
C. 降低其执业等级 D. 给予行政或纪律处分
105. 《药品管理法》界定劣药的依据主要是指（ B ）。
A. 药品所含成分的名称与法定药品标准规定是不符合的 B. 药品成分的含量不符合国家药品标准的
C. 未取得批准文号生产的 D. 被污染不能药用的
106. 我国健康公民自愿献血的年龄是（ D ）。
A. 十八至五十周岁 B. 二十至六十周岁 C. 十八至六十周岁 D. 十八至五十五周岁
107. 血液发出，受血者和供血者的血样应在什么条件下保存几天（ A ）。
A. 应在 2-6℃ 下保存 7 天 B. 常温下保存 10 天 C. 零下保存一个月 D. 22℃ 保存一周
108. 构成医疗事故的主观方面是（ B ）。
A. 技术水平欠缺的技术过失 B. 违反卫生法规和诊疗护理规范、常规的过失
C. 违反操作规程的故意 D. 过于自信的过失
109. 申请医疗事故鉴定后，对于鉴定结论不服，申请再次鉴定的，向以下机构提出申请（ B ）。
A. 医疗机构所在地医学会 B. 医疗机构所在地卫生行政部门
C. 医疗机构所在地省级医学会 D. 患者家属住所地省级卫生行政部门
110. 处方一般不得超过（ ）日用量；急诊处方一般不得超过（ ）日用量。（A）
A. 7、3 B. 3、7 C. 15、7 D. 15、30
111. 医德关系的主体是（ B ）
A. 医生 B. 医务人员 C. 患者 D. 被防治者
112. 在问诊过程中，下列哪种做法是错误的（ B ）
A. 使病人理解无误 B. 对病人的不良情绪立即批评 C. 不中断病人的思路 D. 不强迫病人回答有关隐私问题
113. 三级预防中的第一级预防指（ A ）
A. 病因预防 B. 疾病潜伏期预防 C. 疾病前驱期预防 D. 疾病临床期治疗
114. 主动安乐死是指（ D ）
A. 放弃抢救濒死者生命的措施，任其死亡
B. 病人自己结束痛苦的生命
C. 对濒死病人给予适当的维持治疗，使其安然死亡
D. 对治愈无望的患者，利用人工干预的医学方法，加速其死亡
115. 哪种医德品质最能体现出医学人道主义（ A ）
A. 仁慈 B. 诚挚 C. 公正 D. 节操
116. 区域 D3:F5 包含的单元格数是：（ A ）
A. 9 B. 2 C. 5 D. 15
117. 在 EXCEL 中工作簿名称显示在（ A ）
A. 标题栏 B. 标签栏 C. 工具栏 D. 信息栏
118. 要将整个屏幕内容复制到剪贴板上，应按（ C ）
A. “剪切”按钮 B. “粘贴”按钮 C. Print screen 键 D. “拷贝”按钮
119. 在 Word 2003 的编辑状态中，“粘贴”操作的组合键是（ C ）
A. Ctrl+A B. Ctrl+C C. Ctrl+V D. Ctrl+X
120. 在 Word2003 的编辑状态中，对已经输入的文档进行分栏操作，需要使用的菜单是（ C ）。
A. 编辑 B. 视图 C. 格式 D. 工具
121. 可以打印的内容包括（ D ）
A. 幻灯片 B. 备注页 C. 大纲视图 D. 讲义
122. 在 Excel 的工作簿文件的扩展名是（ A ）
A. xls B. exl C. xlt D. xlc
123. PowerPoint 演示文稿文件的扩展名为（ B ）
A. XLS B. PPT C. POT D. DOC
124. 默认情况下，单元格中数值型数据的水平对齐方式为（ B ）
A. 居中 B. 右对齐 C. 左对齐 D. 分散对齐
125. 目前使用最广泛，影响最大的全球计算机网络是（ D ）
A. Novellnet B. Etherent C. Cernet D. Internet

126. 用户打算把文档中已经选取的一段内容移到其他位置上,应当先执行编辑菜单中的()命令。(D)
A. 粘贴 B. 复制 C. 查找 D. 剪切
127. 在 WORD 窗口中创建第二个新文档,标题栏显示临时文档名字为(A)。
A. 文档 1 B. 文档 2 C. 文档 D. 文档 2. DOC
128. 对于已经执行过保存命令的文档,为防止突然掉电丢失新输入的文档内容,应经常执行()命令。(C)
A. 另存为 B. 关闭 C. 保存 D. 退出
129. WORD 文档默认的扩展名为(D)。
A. TXT B. BMP C. RTF D. DOC
130. 在 WORD 编辑状态下,要切换改写/插入方式,在状态栏的改写按钮处(B)。
A. 单击鼠标左键 B. 双击鼠标左键 C. 单击鼠标右键 D. 按 Insert 键
131. 在一个单元格内输入一个公式时,应当先键入()符号。(D)
A. + B. & C. # D. =
132. 在 Word 2003 的编辑状态中,“剪切”操作的组合键是。(D)
A. Ctrl+A B. Ctrl+C C. Ctrl+V D. Ctrl+X
133. 在 Word 2003 的编辑状态中,“复制”操作的组合键是。(B)
A. Ctrl+A B. Ctrl+C C. Ctrl+V D. Ctrl+X
134. 一个完整的计算机系统应包括(B)
A. 系统硬件和系统软件 B. 硬件系统和软件系统 C. 主机和显示器 D. 主机、外部存储器
135. 在中文输入法间切换的快捷键是(A)
A. Ctrl+Shift B. Alt+Shift C. Ctrl+空格 D. Alt+空格
136. 在我国用体质指数评价营养状况时,超过多少为超重(B)
A. 23 B. 24 C. 25 D. 28
137. 米面加工精度过高会导致何种营养素严重损失(D)
A. 维生素 C B. 维生素 A C. 维生素 E D. B 族维生素
138. 中国居民膳食中膳食纤维的重要来源是(D)
A. 肉类 B. 蛋类 C. 精制米面 D. 水果蔬菜
139. 某患者,主诉倦怠、乏检查发现牙龈肿胀出血、牙齿松动、贫血、关节肌肉疼痛、伤口难愈合、皮下出血。此患者可能是缺乏(C)
A. 铁 B. 叶酸 C. 维生素 C D. 维生素 B1
140. 发病率的定义是:(C)
A. 指一年内生存的病例数除同期初期平均人口数
B. 指一年内生存的病例数除同期平均人口数
C. 指一年内发生新病例数除以同期初期平均人口数
D. 指一年内新病例数除以同期平均人口数
141. 奶类含量较低的营养素是(B)
A. 钙 B. 铁 C. 蛋白质 D. 脂肪
142. 疾病发生的条件(D)
A. 机体抵抗力降低 B. 环境中大量病原体存在
C. 致病因子、宿主和环境同时存在,并相互作用失去平衡 D. 致病因子、宿主和环境同时存在
143. 某医师调查 7 名急性咽炎患者的潜伏期分别为 3, 2, 5, 11, 7, 9, 13 天,其中位数 M 为(A)
A. 7 B. 6 C. 9 D. 11
144. 哪项不属于保护易感人群的具体措施:(B)
A. 预防接种 B. 积极治疗病人 C. 传染病监测 D. 健康教育与咨询
145. 标准误差越大,则表示此次抽样得到的样本均数(C)
A. 系统误差越大 B. 可靠程度越大 C. 抽样误差越大 D. 离散程度越大
146. 计算发病率的分子是(A)
A. 观察期间某病的新发病例数 B. 观察期间某病的现患病例数
C. 观察期间之前某病的患病人数 D. 观察期间某病的暴露人口
147. 病例对照研究可以得到(A)
A. OR 值 B. RR C. AR 值 D. 以上都对
148. 普查的优点是(C)
A. 适于患病率低的疾病调查 B. 最不容易出现漏查
C. 确定调查对象简单 D. 能较快得到发病率

149. 下列哪种氨基酸不是必需氨基酸：(A)
- A. 鸟氨酸 B. 亮氨酸 C. 色氨酸 D. 蛋氨酸
150. 水体富营养化是由于下列哪种物质在水中含量过多而形成的？(A)
- A. 磷、氮 B. 钙、镁 C. 铅、磷 D. 锰、氮
151. 治疗亚硝酸盐食物中毒的特效药物是(A)
- A. 美蓝 B. 二巯基丙醇 C. 亚硝酸异戊酯 D. 硫代硫酸钠
152. 豆类蛋白中含量较高的是(C)
- A. 色氨酸 B. 蛋氨酸 C. 赖氨酸 D. 苏氨酸
153. 世界无烟日是每年的(A)
- A 5月31日 B 6月5日 C 12月1日 D 11月5日
154. 美国学者研究发现，冠心病患者多具有(A)
- A. A型性格 B. B型性格 C. C型性格 D. D型性格
155. 某地调查18岁男大学生110名身高标准差为4.10cm，体重标准差为4.12kg，对比两指标变异程度的大小可用：(C)
- A. 中位数 B. 几何均数 C. 变异系数 D. 标准差
156. 我国居民膳食中热能的主要来源是(C)
- A. 动物肝脏 B. 豆类 C. 粮谷类 D. 奶类
157. 艾滋病的传播途径是(D)
- A. 血液传播 B. 性传播 C. 母婴传播 D. 以上都是
158. 婴儿需要添加辅食的时间是(D)
- A. 1—2个月 B. 2—3个月 C. 3—4个月 D. 4—6个月
159. 人的体重增长或减少()属于正常值范围(B)
- A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%
160. 不属于突发性公共卫生事件的特征的是(C)
- A. 突发性 B. 危害性 C. 绝对性 D. 复杂性
161. 流动儿童是指户籍在外地在居住地居住满()的儿童(A)
- A. 3个月 B. 6个月 C. 1年 D. 3年
162. 流动儿童是指户籍在外地在居住地居住满一定时间的()岁儿童(B)
- A. ≤ 6 B. ≤ 7 C. ≤ 8 D. ≤ 9
163. 在冷藏箱中放在最下层的应该是(A)
- A. 脊灰疫苗 B. 卡介苗 C. 乙肝疫苗 D. 百白破疫苗
164. 乙肝疫苗的接种途径是(B)
- A. 皮下注射 B. 肌肉注射 C. 肌肉注射 D. 口服
165. 不属于慢性非传染性疾病的特点的是(C)
- A. 病程长 B. 大部分可治愈 C. 可自愈 D. 社会危害严重
166. 心脑血管疾病的主要危险因素是(D)
- A. 高血压 B. 肥胖 C. 吸烟 D. 以上都是
167. 心脑血管病患者在饮食中应限制()的摄入(A)
- A. 钠 B. 维生素 C. 膳食纤维 D. 钙
168. 恶性肿瘤的危险因素有(D)
- A. 环境因素 B. 心理因素 C. 生活方式因素 D. 以上都是
169. 便秘的病人应多吃(C)
- A. 高蛋白食物 B. 高脂肪食物 C. 高膳食纤维食物 D. 高矿物质食物
170. 饮酒过度对人体伤害最严重的器官是(B)
- A. 心脏 B. 肝脏 C. 肺 D. 肾脏
171. 黄曲霉毒素主要存在于()食物中(C)
- A. 剩饭剩菜 B. 肉类食物 C. 霉变食物 D. 海产品
172. 随地吐痰以传播(C)
- A. 流脑 B. 乙脑 C. 肺结核 D. 乙肝
173. 牛奶能提供人体所需的(A)
- A. 钙 B. 镁 C. 钾 D. 钠
174. 肺结核的主要传播途径是(C)
- A. 消化道 B. 血液 C. 空气 D. 皮肤

175. 世界艾滋病日为每年的 (D)
A. 4月1日 B. 5月1日 C. 9月1日 D. 12月1日
176. 患者, 诊断为支原体肺炎应选用下列何种药物治疗 (C)
A. 青霉素 G B. 麦迪霉素 C. 红霉素 D. 氨苄西林
177. 治疗金葡菌性骨髓炎的首选药: (C)
A. 红霉素 B. 万古霉素 C. 克林霉素 D. 螺旋霉素
178. 早产儿、新生儿应避免使用: (B)
A. 红霉素 B. 氯霉素 C. 青霉素 D. 多西环素
179. 对青霉素过敏的耐药的淋球菌感染可选用: (D)
A. 氯霉素 B. 丁胺卡那霉素 C. 头孢氨苄 D. 大观霉素
180. 可治疗伤寒的 β -内酰胺类抗生素是 (C)
A. 青霉素 B. 苯唑西林 C. 氨苄西林 D. 替卡西林
181. 治疗阴道滴虫的首选药是: (B)
A. 氯喹 B. 甲硝唑 C. 甲苯达唑 D. 乙胺嘧啶
182. 下列哪种药物对克林霉素所致假膜性肠炎有较好疗效? (C)
A. 红霉素 B. 林可霉素 C. 万古霉素 D. 阿奇霉素
183. 厌氧菌感染的首选药 (D)
A. 甲氧苄啶 B. 呋喃唑酮 C. 磺胺甲恶唑 D. 甲硝唑
184. 下列药物中, 抗结核杆菌作用强, 对纤维化病灶中结核菌有效的是: (D)
A. 链霉素 B. 丁胺卡那霉素 C. 庆大霉素 D. 异烟肼
185. 治疗流行性脑脊髓膜炎的首选药物是: (B)
A. 磺胺异恶唑 B. 磺胺嘧啶 C. 磺胺甲恶唑 D. 磺胺甲氧嘧啶
186. 喹诺酮类抗菌药的抗菌抑制: (D)
A. 细菌二氢叶酸合成酶 B. 细菌二氢叶酸还原酶 C. 细菌 DNA 聚合酶 D. 细菌 DNA 螺旋酶
187. 不适当的联合用药是: (C)
A. 链霉素+异烟肼治疗肺结核 B. 庆大霉素+羧苄青霉素治疗铜绿假单胞菌感染
C. 庆大霉素+链霉素治疗 G-菌感染 D. SMZ+TMP 治疗呼吸道感染
188. 军团菌感染应首选: (D)
A. 青霉素 B. 链霉素 C. 土霉素 D. 红霉素
189. 下列哪种药物与呋塞米合用增强耳毒性 (B)
A. 头孢菌素 B. 庆大霉素 C. 四环素 D. 氨苄西林
190. 女性, 26岁, 因尿频、尿急、尿痛、发热求诊, 用青霉素 G 治疗三天, 疗效不好, 可改用的药物是: (D)
A. 林可霉素 B. 红霉素 C. 万古霉素 D. 氧氟沙星
191. 中医基础理论体系形成的标志是 (A)
A. 《黄帝内经》 B. 《神农本草经》 C. 《伤寒论》 D. 《金匱要略》
192. 因中气下陷所致的久痢、脱肛、子宫下垂均可采用升提中气法治疗, 此属于 (C)
A. 因人制宜 B. 同病异治 C. 异病同治 D. 实则泻之
193. 根据自然界的阴阳变化规律, 秋冬应 (A)
A. 养阴 B. 养阳 C. 养气 D. 以上都是
194. 五行中具有温热、炎上、伤津特性的是 (B)
A. 木 B. 火 C. 土 D. 水
195. 具有主血脉功能的脏 (D)
A. 肝 B. 肺 C. 脾 D. 心
196. 具有“气血生化之源”指的是 (C)
A. 心 B. 肺 C. 脾 D. 肝
197. 主管一身阴阳的脏是 (D)
A. 心 B. 肺 C. 脾 D. 肾
198. 以下哪种说法是错误的 (C)
A. 舌为心之苗 B. 汗为心之液 C. 心为血之府 D. 心其华在面
199. 主疏泄与运化相关的脏是 (B)
A. 心与肺 B. 肝与脾 C. 肺与肝 D. 心与肾
200. 循行于腹部正中线能总督诸阴的经脉是 (B)
A. 冲脉 B. 任脉 C. 带脉 D. 督脉

201. 易于感冒，是气的什么功能减弱的表现(C)
A. 推动作用 B. 温煦作用 C. 防御作用 D. 固摄作用
202. 治疗出血证时用补气药物的机理是(C)
A. 气能生血 B. 气能行血 C. 气能摄血 D. 血能载气
203. 六淫中具有病程长，难以速愈的邪气是(D)
A. 寒邪 B. 火 C. 风邪 D. 湿邪
204. 怒则(B)
A. 气缓 B. 气上 C. 气下 D. 气消
205. 瘀血形成之后可致疼痛，其特点为：(C)
A. 胀痛 B. 隐痛 C. 刺痛 D. 灼痛
206. 五色配五脏脾有病多见(B)
A. 青色 B. 萎黄 C. 白色 D. 红色
207. 下列何项属正治法则(C)
A. 寒因寒用 B. 塞因塞用 C. 寒者热之 D. 因人制宜
208. 各种拔罐方法，一般正常留罐的时间是(A)
A. 10—15分钟 B. 15—20分钟 C. 20—25分钟 D. 25—30分钟
209. 下列哪种针刺进针方法适用于皮肤松弛部位的进针(D)
A. 单手进针法 B. 双手进针法 C. 挟持进针法 D. 舒张进针法
210. 犊鼻穴下3寸，胫骨外侧一横指处的穴位是(B)
A. 合谷 B. 足三里 C. 内关 D. 列缺
211. 康复医学的核心和支柱是(C)
A. 临床康复评定学 B. 基础康复学 C. 康复残疾学 D. 临床康复治疗学
212. 康复评定的内容不包括(C)
A. 躯体功能评定 B. 语言功能评定 C. 中期评定 D. 社会功能评定
213. 下列疗法中，最基本、最积极的治疗方法是(A)
A. 运动疗法 B. 心理疗法 C. 作业疗法 D. 推拿按摩
214. 下列除哪项外，均属于理疗的作用(B)
A. 镇静安眠 B. 恢复平衡 C. 镇痛 D. 缓解痉挛
215. 属于主动式休闲方式的是(C)
A. 看电视 B. 读书 C. 打太极 D. 听音乐
216. 作业疗法的目标不包括(D)
A. 维持正常的作业能力 B. 改善功能，防止受限 C. 建立代偿功能 D. 防止肌肉痉挛
217. 脑卒中最常见的功能障碍(C)
A. 言语功能障碍 B. 心理功能障碍 C. 运动功能障碍 D. 吞咽功能障碍
218. 脑卒中急性期被动运动的主要目的是(C)
A. 恢复肌张力 B. 促进运动分离 C. 防止肌肉萎缩 D. 增强肌力
219. 小儿脑瘫最常见的类型是(B)
A. 手足徐动型 B. 痉挛型 C. 强直型 D. 肌张力低下型
220. 小儿脑瘫的康复中最常用的运动疗法是(D)
A. Vojta疗法 B. Temple Fay法 C. 上田法 D. Bobath疗法
221. 下列哪些不是软组织牵拉的目的：(A)
A. 增加肌力 B. 改善或重新获得关节周围软组织的伸展性
C. 降低肌张力 D. 增加或恢复关节的活动范围
222. 软组织损伤后应尽早进行被动运动的目的：(C)
A. 恢复和增加肌力 B. 减轻水肿和疼痛
C. 保持和恢复关节的活动范围 D. 保持软组织弹性
223. 手的休息位是：(C)
A. 直拳 B. 钩拳 C. 半握拳姿势 D. 完全握掌
224. 以下不能减少泌尿系统感染的措施是：(B)
A. 保持会阴部清洁 B. 卧位排尿 C. 间歇导尿 D. 鼓励病人多饮水
225. 烧伤患者的主要运动正确的是：(C)
A. 提高患者的自信心 B. 每次都要在治疗师指导下进行
C. 若无禁忌，应尽早进行 D. 只做患侧，越多越好

226. 下列哪一个属于康复三级预防中的二级预防(C)
- A. 避免原发性残疾的发生
B. 采取措施防止残疾恶化
C. 残疾发生后积极预防合并症的发生或继发残疾
D. 通过职业咨询和训练促进残疾者重返家园
227. 听力残疾的一级聋(B)
- A. 91dB
B. > 90dB
C. >92dB
D. <90dB
228. 动脉粥样硬化是()的病因 (A)
- A. 脑血栓的形成
B. 脑出血
C. 蛛网膜下腔出血
D. 脑血管畸形
229. 下列不是关节松动术治疗作用的是(D)
- A. 缓解疼痛
B. 改善 ROM
C. 增加本体反馈
D. 消炎杀菌
230. 四肢瘫痪的病人适合选用(D)
- A. 一般轮椅
B. 低靠背轮椅
C. 高靠背轮椅
D. 电动轮椅
231. 间歇热常见于:(B)
- A. 伤寒
B. 急性肾盂肾
C. 败血症
D. 大叶性肺炎
232. 突发剧烈胸痛伴呼吸困难和发绀常见于:(D)
- A. 心绞痛
B. 急性心肌梗死
C. 肺梗死
D. 气胸
233. 进食油腻食物后右上腹剧痛, 辗转不安常见于:(C)
- A. 急性胃炎
B. 胃穿孔
C. 急性胰腺炎
D. 肝脓肿
234. 肝浊音界消失多见于:(C)
- A. 急性胆囊炎
B. 急性阑尾炎
C. 溃疡穿孔
D. 急性肝炎
235. 心房颤动时可发生(D)
- A. 奇脉
B. 重搏脉
C. 交替脉
D. 短绌脉
236. 上消化道出血患者, 出现黑便, 表明出血量至少已达:(D)
- A. 20ml
B. 30ml
C. 40ml
D. 50~70ml
237. 在心尖部触及舒张期震颤可见于:(C)
- A. 肺动脉瓣狭窄
B. 主动脉瓣狭
C. 二尖瓣狭窄
D. 房缺
238. 触诊对全身哪个部位的检查更重要(B)
- A. 胸部
B. 腹部
C. 皮肤
D. 神经系统
239. 腹壁揉面感多见于(C)
- A. 胃肠穿孔
B. 肝脾破裂
C. 结核性腹膜炎
D. 急性胆囊炎
240. 正常脾浊音区宽度为(C)
- A. 3~5cm
B. 4~6cm
C. 4~7cm
D. 5~8cm
241. 急性胆囊炎腹痛常在:(A)
- A. 右上腹
B. 左上腹
C. 右下腹
D. 左下腹
242. 左肋缘下触及一 5cm 肿块, 并有切迹, 应诊断为(C)
- A. 胃扩张
B. 左肾
C. 脾脏
D. 胰尾部
243. 瞳孔缩小见于:(C)
- A. 白内障
B. 青光眼
C. 有机磷中毒
D. 阿托品过量
244. 移动性浊音用于检查(B)
- A. 胸腔积液
B. 腹腔积液
C. 心包积液
D. 胃潴留
245. 梨形心见于:(B)
- A. 主动脉瓣关闭不全
B. 二尖瓣狭窄
C. 心包积液
D. 房间隔缺损
246. 下列哪项属于脑膜刺激征:(D)
- A. Babinski 征
B. Lasegue 征
C. Gordon 征
D. Kernig 征
247. 气管移位不见于以下哪些病(C)
- A. 肺不张
B. 肺纤维
C. 肺气肿
D. 气胸
248. 肾源性水肿者, 其水肿常先出现于:(B)
- A. 下肢
B. 眼睑
C. 胸腔
D. 腹腔
249. 肠鸣音活跃是指每分钟听诊大于:(D)
- A. 3 次
B. 5 次
C. 7 次
D. 10 次
250. 浅部触诊法适用于下列哪项检查(A)
- A. 关节、阴囊、精索
B. 阑尾压痛点
C. 胆囊压痛点
D. 腹部反跳痛
251. 下列哪项检查有助于检测少量腹水(C)
- A. 振水音
B. 肠鸣音
C. 搔弹音
D. 液波震颤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/708113127001007003>