

2024 年广东省揭东区《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库大全带答案 (综合卷)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 易被胃酸破坏，口服吸收少，故临床一般服用其肠衣片或酯化物的是

- A: 克拉霉素
- B: 阿奇霉素
- C: 红霉素
- D: 氟曲南

答案: C

2. 临床常用，起效最快的硝酸酯类药物是

- A: 5-单硝酸异山梨酯
- B: 硝酸甘油
- C: 硝酸异山梨西旨
- D: 戊四硝酸

答案: B

3. 以下平喘药可辅助治疗急性心功能不全和心源性哮喘的是

- A: 布地奈德
- B: 氨茶碱
- C: 沙美特罗
- D: 孟鲁司特

答案: B

4. (2021 年真题) 属于微管蛋白活性制剂的抗肿瘤药物是 ()

- A: 长春新碱
- B: 环磷酰胺
- C: 来曲唑
- D: 厄洛替尼

答案: A

5. 双环醇片作为保护肝细胞药的作用机制是

- A: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用
- B: 降低血清丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 水平
- C: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用
- D: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞

答案: B

6. 对于万古霉素，描述错误的是 ()

- A: 可用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染
- B: 对革兰阴性杆菌和真菌有一定作用
- C: 口服给药可用于难辨梭杆菌性假膜性肠炎
- D: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成

答案: B

7. 以下关于氯吡格雷使用的描述，错误的是

- A: 如果漏服，在常规服药时间的 12 小时内漏服，应立即补服一次标准剂量，并按照常规服药时间服用下一次剂量

B: 在需要进行择期手术的患者，如抗血小板治疗并非必须，则应在术前停用氯吡格雷 7 日以上

C: 超过常规服药时间的 12 小时后漏服，应在下次常规服药时间服用加倍剂量

D: 发现氯吡格雷抗血小板作用不足者可检测 CYP2C19 基因型

答案：C

8. 主要用于复发转移乳腺癌、乳腺癌术后转移的辅助治疗和子宫内膜癌的治疗的药物是

A: 依西美坦

B: 来曲唑

C: 他莫昔芬

D: 氟维司群

答案：C

9. 对甲氧西林耐药的葡萄球菌引起的感染有效的抗生素为

A: 万古霉素

B: 哌拉西林

C: 氨曲南

D: 阿莫西林

答案：A

10. 过量会引起严重心脏毒性的药物是()

A: 地高辛

B: 哌唑嗪

C: 氨氯地平

D: 卡托普利

答案：A

11. 苯妥英钠血药浓度超过多少可出现中毒症状

A: 20 $\mu\text{g/ml}$

B: 5 $\mu\text{g/ml}$

C: 10 $\mu\text{g/ml}$

D: 2 $\mu\text{g/ml}$

答案：A

12. 抑制血管平滑肌和心肌细胞 Ca

A: 胍屈嗪

B: 利血平

C: 硝苯地平

D: 氢氯噻嗪

答案：C

13. 可抑制维生素 K 环氧化酶活性的抗凝血药是

A: 华法林

B: 达比加群酯

C: 氨甲环酸

D: 依诺肝素

答案：A

14. 属于血小板糖蛋白 GP IIb / IIIa 受体阻断剂的是

A: 替罗非班

B: 替格瑞洛

C: 阿司匹林

D: 双嘧达莫

答案：A

15. 亚胺培南西司他丁一般不宜用于

- A: 病原菌未查明严重感染
- B: 社区获得性感染
- C: 严重需氧菌与厌氧菌混合性感染
- D: 对其他药物耐药的革兰阴性杆菌感染

答案：B

16. 司坦唑醇不具有的适应证为()

- A: 遗传性血管神经性水肿
- B: 骨质疏松症
- C: 慢性消耗性疾病
- D: 痤疮

答案：D

17. 抗生素类抗真菌药()

- A: 两性霉素
- B: 氟康唑
- C: 阿莫罗芬
- D: 特比萘芬

答案：A

18. 联合应用可使部分患者血压升高的药物是

- A: 利奈唑胺+哌替啶
- B: 利奈唑胺+苯丙醇胺
- C: 磷霉素钠+万古霉素
- D: 磷霉素氨丁三醇

答案：B

19. 下列药物中，没有降低眼压作用的药物是()

- A: 比马前列素
- B: 阿托品
- C: 噻吗洛尔
- D: 毛果芸香碱

答案：B

20. 噻唑烷二酮类药物可降低

- A: 血红蛋白
- B: 体重
- C: 血容量
- D: 女性骨折的风险

答案：A

21. 通过促进或恢复凝血过程而止血的药物是

- A: 酚磺乙胺
- B: 氨基己酸
- C: 卡巴洛克
- D: 氨甲苯酸

答案：A

22. 治疗脑水肿、降低颅内压的首选药物是

- A: 氨苯蝶啶
- B: 阿米洛利
- C: 螺内酯
- D: 甘露醇

答案：D

23. 可引起肺间质纤维化的抗心律失常药物是

- A: 胺碘酮
- B: 维拉帕米
- C: 地尔硫革
- D: 美托洛尔

答案：A

24. 利福平与口服避孕药合用

- A: 后者血药浓度升高，不良反应增加
- B: 药理作用拮抗
- C: 不良反应叠加
- D: 后者血药浓度下降，药效降低

答案：D

25. 作用于微管的抗肿瘤药物是

- A: 依托泊苷
- B: 来曲唑
- C: 紫杉醇
- D: 顺铂

答案：C

26. 阻断 H₂ 受体的药物是

- A: 氢氧化铝
- B: 雷尼替丁
- C: 奥美拉唑
- D: 阿托品

答案：B

27. 阿托伐他汀用于原发性高胆固醇血症和混合型高脂血症的初始剂量是

A: 20~40mg

B: 15mg

C: 5mg

D: 10mg

答案: D

28. 下列氨基糖苷类抗菌药物中，引起耳蜗神经损伤发生率最高的是

A: 链霉素

B: 妥布霉素

C: 卡那霉素

D: 新霉素

答案: D

29. 新斯的明治疗重症肌无力的机制是

A: 增强运动神经乙酰胆碱合成

B: 抑制胆碱酯酶和兴奋骨骼肌 N 胆碱受体

C: 对大脑皮质有兴奋作用

D: 兴奋骨骼肌中 M 胆碱受体

答案: B

30. 同时具有短效和长效（双时相）作用的胰岛素是

A: 赖脯胰岛素注射液

B: 普通胰岛素注射液

C: 预混胰岛素注射液

D: 精蛋白锌胰岛素注射液

答案：C

31. 戈那瑞林的禁忌不包括

- A: 垂体相关性闭经者
- B: 垂体腺瘤患者
- C: 肝肾病患者
- D: 妊娠期妇女

答案：C

32. 糖皮质激素禁用于胃溃疡患者是因为

- A: 抑制蛋白质合成
- B: 抑制免疫功能，只抗炎不抗菌
- C: 促进胃酸分泌及胃蛋白酶分解
- D: 水钠潴留

答案：C

33. 下述药物中用于拮抗肝素过量的是()

- A: 硫酸鱼精蛋白
- B: 维生素
- C: 氨甲苯酸
- D: 维生素 K

答案：A

34. 西咪替丁治疗消化性溃疡病的机制是()

- A: 阻断 H
- B: 抑制胃壁细胞的 H
- C: 抗幽门螺杆菌
- D: 阻断 CTZ 的 D

答案：A

35. (2021 年真题) 用于验光配镜屈光度检查前散瞳的药物是 ()

- A: 聚乙二醇滴眼液
- B: 雷珠单抗注射液
- C: 硫酸阿托品眼用凝胶
- D: 毛果芸香碱滴眼液

答案：C

36. 以下所列药物中，能促进小肠对维生素 D 的吸收是

- A: 矿物油
- B: 考来烯胺
- C: 雌激素
- D: 硫酸铝

答案：C

37. 属于 ACEI 类药，临床用于糖尿病肾病的是

- A: 普萘洛尔
- B: 硝苯地平
- C: 肼屈嗪
- D: 卡托普利

答案：D

38. 阻断脑内多巴胺受体，小剂量抑制延脑催吐化学感受区的多巴胺受体，大剂量时直接抑制呕吐中枢，兼有镇静作用的是

- A: 氯丙嗪
- B: 劳拉西泮
- C: 帕洛诺司琼

D: 甲氧氯普胺

答案: A

39. 癫痫大发作合并小发作选用

A: 丙戊酸钠

B: 乙琥胺

C: 苯巴比妥

D: 苯妥英钠

答案: A

40. 属于 β 受体阻断剂，对正常人血压影响不明显，而对高血压患者具有降压作用的降压药是()

A: 利血平

B: 硝苯地平

C: 美托洛尔

D: 氢氯噻嗪

答案: C

41. 对衣原体有效的是

A: 替硝唑

B: 红霉素

C: 克林霉素

D: 万古霉素

答案: B

42. 属于超短效胰岛素/胰岛素类似物的是

A: 精蛋白锌胰岛素

B: 甘精胰岛素

C: 普通胰岛素

D: 门冬胰岛素

答案：D

43. (2017 年真题) 可能引起高铁血红蛋白血症的抗高血压药是 ()

A: 阿利克仑(阿利吉仑)

B: 氨氯地平

C: 卡托普利

D: 硝普钠

答案：D

44. 属于非麻醉性镇痛药的是

A: 美沙酮

B: 布洛芬

C: 吗啡

D: 可待因

答案：B

45. 谷维素适用于

A: 急慢性脑功能不全

B: 内分泌失调引起的失眠

C: 神经源性尿崩症

D: 原发性失眠

答案：B

46. 对其他药物不能控制的顽固性癫痫仍有效的是

A: 乙琥胺

B: 苯妥英钠

C: 卡马西平

D: 丙戊酸钠

答案: D

47. 主要用于青光眼急性发作短期控制的药物是()

A: 依托塞米

B: 乙酰唑胺

C: 依他尼酸

D: 布美他尼

答案: B

48. 是第一个 P2Y₁₂ 拮抗剂，可抑制血小板聚集的是()

A: 肝素

B: 尿激酶

C: 华法林

D: 噻氯匹定

答案: D

49. 甲状腺功能亢进症的内科治疗选用

A: 格列齐特

B: 大剂量碘剂

C: 放射性碘

D: 丙硫氧嘧啶

答案: D

50. 高血压伴消化性溃疡患者慎用的药物是

A: 普萘洛尔

B: 利血平

C: 哌唑嗪

D: 卡托普利

答案: B

51. 若无禁忌,冠心病或缺血性脑卒中患者均应长期使用的药物是

A: 依诺肝素

B: 氯吡格雷

C: 肝素

D: 阿司匹林

答案: D

52. 以下不属于干扰核酸生物合成的药物是

A: 甲氨蝶呤

B: 卡培他滨

C: 表柔比星

D: 培美曲塞

答案: C

53. 肝素的抗凝作用特点是

A: 体内、体外均有效

B: 必须有维生素 K 辅助

C: 仅在体内有效

D: 作用缓慢

答案: A

54. 下列关于吉非替尼的描述, 错误的是

A: 与传统化疗药存在交叉耐药

B: 常见典型不良反应是皮肤毒性、腹泻

C: 与细胞毒类药物如铂类、紫杉类有协同作用

D: 用于治疗经含有铂类或多西他赛治疗失败的晚期非小细胞肺癌患者

答案：A

55. 适应证为仅用于治疗失眠的药物是

A: 氟西汀

B: 佐匹克隆

C: 卡马西平

D: 地西泮

答案：B

56. 促使脓性痰中 DNA 分解，使脓痰黏度下降的药物是

A: 氨溴索

B: 乙酰半胱氨酸

C: 糜蛋白酶

D: 表面活性剂

答案：C

57. 有激素样作用，长期服用可导致男性乳房发育、阳痿、女性月经失调的是

A: 醛固酮

B: 依他尼酸

C: 氢氯噻嗪

D: 乙酰唑胺

答案：A

58. 对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用镇咳药的同时，应及时联合应用的药品是

- A: 左氧氟沙星
- B: 多索茶碱
- C: 羧甲司坦
- D: 泼尼松龙

答案：C

59. 治疗肝胆疾病比较好的是

- A: 土霉素
- B: 氯霉素
- C: 青霉素
- D: 红霉素

答案：D

60. 适用于心功能比较稳定的 II～III 级心力衰竭患者的药物是

- A: 多巴酚丁胺
- B: 氯沙坦
- C: 卡维地洛
- D: 维拉帕米

答案：C

61. 血肌酐升至

- A: 大于 $265 \mu\text{mol/L}$
- B: 大于 $172 \mu\text{mol/L}$
- C: 大于 6mmol/L
- D: 大于 $7 \mu\text{mol/L}$

答案：A

62. 治疗绝经后妇女的骨质疏松症可选用()

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 阿法骨化醇
- C: 依降钙素
- D: 葡萄糖酸钙

答案：A

63. 选择性地兴奋 β

- A: 奈多罗米
- B: 扎鲁司特
- C: 沙丁胺醇
- D: 酮替芬

答案：C

64. 治疗酮症酸中毒及糖尿病昏迷的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 罗格列酮
- C: 氢氧化镁
- D: 胰岛素

答案：D

65. 脓疱型痤疮可选用()

- A: 阿达帕林
- B: 维 A 酸
- C: 酮康唑
- D: 林旦霜

答案：A

66. 典型不良反应为皮肤毒性,属于酪氨酸激酶抑制剂的药物是()

- A: 氟尿嘧啶
- B: 奥沙利铂
- C: 顺铂
- D: 吉非替尼

答案：D

67. 催眠药应()

- A: 定时内服
- B: 空腹内服
- C: 睡前内服
- D: 饭前内服

答案：C

68. 以下抗寄生虫药的使用方法错误的是

- A: 左旋咪唑驱蛔虫空腹或睡前顿服
- B: 阿苯达唑治疗蛲虫病一次即为一疗程，药片需用水吞服
- C: 蛲虫病易自身重复感染，故在阿苯达唑治疗 2 周后应重复治疗一次
- D: 氯硝柳胺驱牛带绦虫和猪带绦虫应空腹吞服

答案：D

69. 不能直接抑制凝血因子 Xa 的药物是

- A: 利伐沙班
- B: 华法林
- C: 依度沙班
- D: 阿哌沙班

答案：B

70. 抑制过敏介质释放，主要用于预防哮喘发作的药物是

- A: 特布他林
- B: 异丙肾上腺素
- C: 色甘酸钠
- D: 倍氯米松

答案：C

71. 用于治疗肺外结核病的药物是

- A: 阿糖腺苷
- B: 布洛芬
- C: 对氨基水杨酸钠
- D: 阿司匹林

答案：C

72. 奎宁日剂量超过 1g/d 或连续长时间应用，可见耳鸣、头痛、视力与听力减退等，停药后常可恢复，临床称为

- A: 双硫仑样反应
- B: 金鸡纳反应
- C: 吉海反应
- D: 锥体外系反应

答案：B

73. 长期使用可引起维生素 B12 缺乏的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 华法林
- C: 头孢哌酮
- D: 阿司匹林

答案：A

74. 仅在体内有凝血作用的药物是

- A: 华法林
- B: 尿激酶
- C: 肝素
- D: 噻氯匹啶

答案：A

75. 患者，女，26 岁，妊娠 3 个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是()。

- A: 头孢氨苄
- B: 青霉素 G
- C: 左氧氟沙星
- D: 阿莫西林

答案：C

76. 使用时可引起单抗药综合征的是

- A: 氟他胺
- B: 阿那曲唑
- C: 他莫昔芬
- D: 曲妥珠单抗

答案：D

77. 黄体酮治疗先兆流产，必须肌内注射给药的主要理由是()

- A: 口服后在消化道和肝内被迅速破坏
- B: 口服用药排泄快
- C: 口服吸收缓慢
- D: 肌内注射吸收迅速

答案：A

78. 口服呋喃妥因可用于治疗()

- A: 肠道感染
- B: 尿路感染
- C: 肺感染
- D: 呼吸道感染

答案: B

79. 仅用于皮下注射，激动胰高糖素样多肽-1 受体降糖()

- A: 二甲双胍
- B: 格列本脲
- C: 艾塞那肽
- D: 阿卡波糖

答案: C

80. 女，54 岁，患风湿性二尖瓣闭锁不全多年，用地高辛和氢氯噻嗪维持疗效。但近日呼吸困难加重，夜间频繁发作，心慌，两肺满肺野湿性啰音，经检查左室舒张期充盈压明显升高，诊断为高血压急症。除上述药物外，该加用哪种药物进行治疗

- A: 米力农
- B: 硝普钠
- C: 多巴胺
- D: 氨力农

答案: B

81. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38.8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82.1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0.59，每 6 小时一次。

- A: 如发生转氨酶升高，应考虑氟康唑的肝毒性
- B: 出院后如发生过敏症状，可使用抗过敏药特非那定
- C: 侵袭性真菌感染疗程较长，患者出院后仍需口服氟康唑
- D: 定期复查血常规、肝肾功能

答案：B

82. 男性，68 岁，发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠，气急，近 2 天全身散在出血点及瘀斑，血压 60/40mmHg，血红蛋白 120g/L，白细胞 $12 \times 10^9 / L$

- A: 低分子肝素
- B: 维生素 K
- C: 维生素 C
- D: 鱼精蛋白

答案：D

83. 骨折患者、低磷血症患者不宜服用

- A: 三硅酸镁
- B: 氢氧化镁
- C: 碳酸钙
- D: 氢氧化铝

答案：D

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

84. 磺酰脲类降糖药的药理作用是

A: 提高胰岛 B 细胞功能

B: 加速胰岛素合成

C: 抑制胰岛素降解

D: 刺激胰岛细胞分泌胰岛素

答案：D

85. 具有肾保护作用的降压药是

A: 氢氯噻嗪

B: 沙拉新

C: 缬沙坦

D: 硝苯地平

答案：C

86. 抗菌谱广，抗菌活性均类似于头孢噻肟的药物是

A: 拉氧头孢

B: 头孢孟多

C: 头孢氨苄

D: 氨曲南

答案：A

87. 能松弛前列腺和膀胱括约肌，很少发生低血压的抗前列腺增生症药为

A: 乙酰唑胺

B: 特拉唑嗪

C: 酚苄明

D: 坦洛新

答案：D

88. 治疗黏液性水肿的药物是

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 普萘洛尔

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/708120050045007022>