

2024 湖北省丹江口市《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库（含答案）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2019 年真题）患者，女，32 岁，孕 2 周，既往有癫痫病史，长期服用卡马西平治疗，为防止引起新生儿出血，该患者妊娠晚期应当补充的维生素是（ ）

- A: 维生素 D
- B: 维生素 B12
- C: 叶酸
- D: 维生素 K

答案：D

2. 男性，68 岁，发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠，气急，近 2 天全身散在出血点及瘀斑，血压 60/40mmHg，血红蛋白 120g/L，白细胞 $12 \times 10^9/L$

- A: 低分子肝素
- B: 鱼精蛋白
- C: 维生素 K
- D: 维生素 C

答案：B

3. 氨基酸分类正确的是

- A: 肝病的氨基酸制剂: 复方氨基酸注射液（20AA）、复方氨基酸注射液（9AA）
- B: 肾病的氨基酸制剂: 复方氨基酸注射液（15AA）、复方 α -酮酸片

C: 肝病的氨基酸制剂: 复方氨基酸注射液 (9AA)、复方氨基酸注射液 (15AA)

D: 肾病的氨基酸制剂: 复方氨基酸注射液 (9AA)、复方 α -酮酸片

答案: D

4. 呋喃妥因主要用于

A: 消化道感染

B: 尿路感染

C: 全身感染

D: 呼吸道感染

答案: B

5. 长期服用广谱抗生素，导致出血倾向选用

A: 维生素 K

B: 氨甲环酸

C: 尿激酶

D: 低分子肝素

答案: A

6. 血浆半衰期较短的治疗阴茎勃起功能障碍的 5 型磷酸二酯酶抑制剂的是

A: 丙酸睾酮

B: 西地那非

C: 他达拉非

D: 甲睾酮

答案: B

7. 用于治疗单纯性甲状腺肿的是

- A: 甲状腺素
- B: 放射性碘
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 糖皮质激素

答案：A

8. 阿司匹林与华法林合用

- A: 心源性水肿
- B: 抗凝血作用增强
- C: 头晕、头痛、血压下降
- D: 诱发胃肠道溃疡出血

答案：B

9. 氯磺丙脲的降糖作用机制是

- A: 降低靶组织对胰岛素的敏感性
- B: 能明显降低空腹血糖、胰岛素和 C 肽水平
- C: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- D: 防治遗传性血管神经性水肿

答案：C

10. 阿米卡星与万古霉素合用()

- A: 药理作用拮抗
- B: 不良反应叠加
- C: 后者血药浓度下降，药效降低
- D: 后者血药浓度升高，不良反应增加

答案：B

11. 与磺胺甲噁唑具有协同抑菌和杀菌作用的是()

- A: 呋喃唑酮
- B: 甲氧苄啶
- C: 诺氟沙星
- D: 磺胺嘧啶

答案：B

12. 应用高剂量的 β

- A: 高钙血症
- B: 低镁血症
- C: 低钙血症
- D: 低钾血症

答案：D

13. 可引起高钾血症，应避免与留钾利尿药联合应用的是()

- A: 卡托普利
- B: 呋塞米
- C: 哌唑嗪
- D: 地高辛

答案：A

14. 用青霉素治疗梅毒、钩端螺旋体病时能出现寒战、咽痛、心率加快等症状,其原因可能是大量病原体被杀灭后出现的全身性反应,这种反应称为()

- A: 青霉素脑病
- B: 金鸡纳反应
- C: 瑞夷综合征
- D: 赫氏反应

答案：D

15. 早产儿、新生儿禁用()

- A: 四环素可的松
- B: 氯霉素
- C: 利福平
- D: 夫西地酸

答案：B

16. 兼具抑菌作用、抑制痛觉神经和刺激腺体分泌的鼻用制剂是

- A: 鲑鱼降钙素鼻喷剂
- B: 氟替卡松鼻喷剂
- C: 异丙托溴铵吸入剂润德教育
- D: 复方薄荷脑滴鼻液

答案：D

17. 阵发性室上性心动过速首选

- A: 普罗帕酮
- B: 维拉帕米
- C: 阿托品
- D: 奎尼丁

答案：B

18. 中枢性或肾性尿崩症可选用

- A: 呋塞米
- B: 氢氯噻嗪
- C: 螺内酯
- D: 乙酰唑胺

答案：B

19. (2017 年真题) 维 A 酸软膏治疗痤疮时,合理的用法是 ()

- A: 一日一次,晨起使用
- B: 一日一次,睡前使用
- C: 一日二次,早晚使用
- D: 一日一次,固定时间使用

答案: B

20. 主要作用是抗部分革兰阴性杆菌和抗革兰阳性菌的青霉素是

- A: 阿莫西林
- B: 替莫西林
- C: 甲氧西林
- D: 哌拉西林

答案: A

21. 高血钾的肾损伤患者禁用下列哪种利尿药 ()

- A: 依他尼酸
- B: 山梨醇
- C: 呋塞米
- D: 螺内酯

答案: D

22. 对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌等的作用均很强的头孢类药物是

- A: 第一代头孢菌素
- B: 第四代头孢菌素
- C: 第三代头孢菌素
- D: 第二代头孢菌素

答案：B

23. 下述可用于治疗甲氨蝶呤引起的巨幼红细胞性贫血的是

- A: 亚叶酸钙
- B: 叶酸+维生素 B
- C: 叶酸
- D: 维生素 B

答案：A

24. 腺病毒可致

- A: 急性出血性结膜炎
- B: 角膜炎
- C: 巨细胞病毒性视网膜炎
- D: 流行性结膜炎

答案：D

25. 抑制排卵避孕药的较常见不良反应是

- A: 肾功能损坏
- B: 增加哺乳期妇女的乳汁分泌
- C: 子宫不规则出血
- D: 多毛、痤疮

答案：C

26. 不得与碱性物质或铁器接触的是()

- A: 阿达帕林
- B: 苯甲酸苄酯
- C: 克罗米通
- D: 林旦霜

答案：D

27. 乙胺丁醇的抗结核杆菌作用原理是

- A: 与锌离子络合、影响戊糖代谢
- B: 抑制分枝菌酸合成
- C: 抑制 RNA 多聚酶
- D: 抑制蛋白质合成

答案：A

28. 作用于细菌二氢叶酸合成酶而发挥作用的抗菌药物是

- A: 利奈唑胺
- B: 甲氧苄啶
- C: 磺胺甲唑
- D: 呋喃妥因

答案：C

29. 治疗子宫内膜异位症的药物是

- A: 达那唑
- B: 氯地孕酮
- C: 左炔诺孕酮
- D: 他达拉非

答案：A

30. 以下关于过氧苯甲酰的描述中，不正确的是

- A: 可分解出新生氧而发挥作用
- B: 可导致皮肤干燥，脱屑
- C: 为强还原剂，极易分解
- D: 可杀灭痤疮丙酸杆菌

答案：C

31.（2020 年真题）主要用于治疗呼吸道合胞病毒感染的药物是

- A: 阿德福韦酯
- B: 拉米夫定
- C: 更昔洛韦
- D: 利巴韦林

答案：D

32.（2016 年真题）属于贝丁酸类调节血脂药的是

- A: 阿托伐他汀
- B: 依折麦布
- C: 非诺贝特
- D: 阿昔莫司

答案：C

33. 推荐与吸入性糖皮质激素联合使用，尤其适合于中、重度持续哮喘患者长期治疗的药物是

- A: 长效 B₂ 受体激动剂
- B: 白三烯受体阻断剂
- C: M 胆碱受体阻断剂
- D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：A

34.（2016 年真题）会加重奥沙利铂所致的严重神经系统毒性（感觉障碍、痉挛）的行为是

- A: 日光浴
- B: 接触塑料制品

C: 冷水浴

D: 饮用热饮

答案: C

35. 患者，女，55 岁，2 型糖尿病史 5 年；心律失常病史 2 年长期使用胺碘酮治疗。关于胺碘酮的不良反应的说法，错误的是

A: 可致甲状腺功能减退较为常见发病隐匿

B: 可掩盖低血糖症状（如心悸、手抖），但低血糖的其他症状（如出汗）仍然存在

C: 可致甲状腺功能亢进，同时会加重心房颤动或出现快速室性心律失常

D: 可致肺毒性，早期一般表现为咳嗽，但病情发展时可出现发热和呼吸困难，表现为急性肺炎

答案: B

36. 有良好的促动力作用，无心脏不良反应的是

A: 奥关拉唑

B: 莫沙必利

C: 枸橼酸铋钾

D: 碳酸钙

答案: B

37. 可能导致跟腱断裂和血糖异常的抗菌药物是

A: 多西环素

B: 庆大霉素

C: 加替沙星

D: 甲砷霉素

答案: C

38. 属于治疗固醇性胆囊结石的是

- A: 山莨菪碱
- B: 多潘立酮
- C: 熊去氧胆酸
- D: 胶体果胶铋

答案：C

39. 多柔比星与肝素、头孢菌素等同用()

- A: 增加肝毒性
- B: 易产生沉淀
- C: 导致坏死性结肠炎
- D: 增加心脏毒性

答案：B

40. (2015 年真题) 属于血小板糖蛋白 IIb/IIIa 受体阻断剂的是 ()。

- A: 氯吡格雷
- B: 阿司匹林
- C: 替罗非班
- D: 奥扎格雷

答案：C

41. 用于治疗耐氯喹和耐多种药物虫株所致的恶性疟，也可用于治疗间日疟的药物是

- A: 蒿甲醚
- B: 奎宁
- C: 乙胺嘧啶
- D: 双氢青蒿素

答案：B

42. 是碘与表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮经反应生成的复合物。含有效碘 9%~12%。从载体中释出碘，可直接卤化菌体蛋白质，与细菌蛋白质的氨基酸结合，破坏菌体的蛋白质和酶，使微生物代谢功能发生障碍而死亡的广谱强效杀菌药是

- A: 依沙吖啶
- B: 聚维酮碘
- C: 过氧乙酸
- D: 氯己定

答案：B

43. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药(具体不详)治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次 / 日。

- A: 不会导致 Q~T 间期延长及室性心律失常
- B: 不会促进乙酰胆碱的释放
- C: 不会导致催乳素增多
- D: 不会导致锥体外系反应

答案：B

44. 扎那米韦的作用靶点是

- A: HIV-1 反转录酶
- B: 脱氧核糖核酸聚合酶
- C: 神经氨酸酶
- D: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶

答案：C

45. 下列属于二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断药的是()

- A: 阿司匹林
- B: 阿替普酶
- C: 氯吡格雷
- D: 双嘧达莫

答案：C

46. 对红霉素的描述，下列不正确的是

- A: 属繁殖期杀菌剂
- B: 具有肝脏毒性
- C: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效
- D: 抗菌谱与青霉素相似但略广

答案：A

47. 对 I 型和 II 型单纯疱疹病毒作用最强的是

- A: 干扰素
- B: 阿昔洛韦
- C: 阿糖腺苷
- D: 奥司他韦

答案：B

48. 酰胺醇类药的主要作用靶点是

- A: 核糖体的 30S 亚基
- B: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- C: 细胞内膜 PBP
- D: 核糖体的 50S 亚基

答案：D

49. 黏液性水肿选用

- A: 粒细胞下降
- B: 甲状腺素
- C: 血管神经性水肿
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：B

50. 呋布西林()

- A: 对 G
- B: 特别对铜绿假单胞菌有效
- C: 对 G
- D: 抗菌作用强，对厌氧菌有效

答案：B

51. 急性心梗死引起的急性室性心动过速可选用

- A: 美西律
- B: 硝苯地平
- C: 阿托品
- D: 利多卡因

答案：D

52. 不属于中枢性镇咳药典型不良反应的是

- A: 心率增快
- B: 腹泻
- C: 成瘾性
- D: 情绪激动

答案：B

53. 主要用于复发转移乳腺癌、乳腺癌术后转移的辅助治疗和子宫内膜癌的治疗的药物是

- A: 来曲唑
- B: 依西美坦
- C: 氟维司群
- D: 他莫昔芬

答案：D

54. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38.8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82.1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0.59，每 6 小时一次。

- A: 克柔念珠菌
- B: 白色念珠菌
- C: 热带念珠菌
- D: 新型隐球菌

答案：A

55. 第一代蒽环类抗肿瘤药物，主要用于急性白血病的药物是

- A: 多柔比星
- B: 柔红霉素
- C: 吡柔比星
- D: 表柔比星

答案：B

56. 患者女性，40 岁，上呼吸道感染服用磺胺嘧啶。

- A: 碳酸氢钠
- B: 维生素 B
- C: 碳酸钙
- D: 维生素 C

答案：A

57. （2016 年真题）具有抑制 5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取作用，用于难治性抑郁症且疗效明显的抗抑郁药是

- A: 西酞普林
- B: 文拉法辛
- C: 马普替林
- D: 阿米替林

答案：B

58. 没有成瘾性，兼有中枢和外周镇咳作用的药品是（）。

- A: 右美沙芬
- B: 苯丙哌林
- C: 氯化铵
- D: 可待因

答案：B

59. 下列关于肝素类药物的抗凝血作用描述正确的是

- A: 仅在体内有效
- B: 体内、体外均有强大的抗凝作用
- C: 用药 2 个月后需检测血小板计数

D: 仅在体外有效

答案：B

60. (2016 年真题) 铜绿假单胞菌感染首选的抗菌药物是

A: 头孢曲松

B: 头孢他啶

C: 利奈唑胺

D: 罗红霉素

答案：B

61. 患者，女，40 岁。癫痫病史 3 年，近来常觉头痛，测量血压为 170 / 110mmHg。

A: 利血平

B: 硝苯地平

C: 普萘洛尔

D: 氢氯噻嗪

答案：A

62. 可抑制蛋白质合成全过程，具繁殖期和静止期杀菌作用的药物是

A: 替加环素

B: 庆大霉素

C: 多黏菌素

D: 环丙沙星

答案：B

63. 高血压伴甲状腺功能亢进者宜选用

A: 硝苯地平

B: 尼莫地平

C: 利血平

D: 普萘洛尔

答案: D

64. 属于持续大剂量应用糖皮质激素引起的不良反应是

A: 骨质疏松症

B: 青光眼

C: Cushing 综合征体型

D: 胰腺炎

答案: C

65. 新生儿服用可发生低凝血酶原血症及出血的药物是

A: 苯巴比妥

B: 卡马西平

C: 唑吡坦

D: 地西泮

答案: A

66. 头孢拉定()

A: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

B: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

C: 肾毒性大

D: 口服，肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染

答案: C

67. 以肝细胞膜损害为主的急慢性肝炎患者，宜使用的药物是

A: 还原型谷胱甘肽

B: 甘草酸二铵

C: 葡醛内酯

D: 多烯磷脂酸胆碱

答案: D

68. 下列药物中，属于非二氢吡啶类钙通道阻滞药的是()

A: 尼莫地平

B: 硝苯地平

C: 维拉帕米

D: 氨氯地平

答案: C

69. 卡泊三醇禁用于

A: 高钙血症患者

B: 高钠血症患者

C: 低钙血症患者

D: 低钠血症患者

答案: A

70. 患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

A: 氯吡格雷

B: 利伐沙班

C: 替格瑞洛

D: 双嘧达莫

答案: B

71. 四环素的抗菌作用机制()

- A: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成
- B: 影响胞浆膜通透性
- C: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性
- D: 作用于细菌 70S 核糖体的 50S 亚基，抑制转肽酶

答案：A

72. (2017 年真题) 药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

- A: 替考拉宁
- B: 头孢曲松
- C: 头孢哌酮
- D: 阿米卡星

答案：A

73. 不溶于水，微溶于有机溶剂的是

- A: 羟喜树碱
- B: 替尼泊苷
- C: 依托泊苷
- D: 博来霉素

答案：A

74. 应用强心苷或停用后 7 日内禁用

- A: 枸橼酸钾
- B: 氯化钙
- C: 氯化钠
- D: 氯化钾

答案：B

75. 索他洛尔最严重的不良反应是

- A: 心动过缓
- B: 呼吸困难
- C: 尖端扭转型室速
- D: 头晕

答案：C

76. 可致维生素 B12 缺乏的药物是

- A: 碳酸氢钠
- B: 乳酸菌素
- C: 雷尼替丁
- D: 铝碳酸镁

答案：C

77. 局部应用杀灭疥虫的药物中，疗效最佳的是()

- A: 硫黄软膏
- B: 克罗米通
- C: 苯甲酸苄酯
- D: 林旦霜

答案：D

78. 肝素最大作用时间是

- A: 5~7 天
- B: 3 天
- C: 2min
- D: 6 天

答案：C

79. (2017 年真题) 不属于糖皮质激素的适应症是 ()

- A: 风湿
- B: 系统性红斑狼疮
- C: 活动性肺结核
- D: 再障

答案: C

80. 患者，女，46 岁。以"口角歪斜 3 天"之主诉入院。3 天前洗澡冲凉后次日晨起刷牙时发现右口角漏水，右侧闭眼不紧，口角歪斜，伴右眼流泪。查体：大致正常。诊断：面神经麻痹(右侧)。医嘱：

- A: 苯巴比妥
- B: 苯妥英钠
- C: 卡马西平
- D: 伊曲康唑

答案: D

81. 糖尿病合并轻中度肾功能不全者可选用 ()

- A: 格列吡嗪
- B: 胰岛素
- C: 格列喹酮
- D: 格列齐特

答案: C

82. 适用于心功能比较稳定的 II ~ III 级心力衰竭患者的药物是

- A: 卡维地洛
- B: 维拉帕米
- C: 多巴酚丁胺

D: 氯沙坦

答案: A

83. 对耐氯喹的恶性疟虫株，首选

A: 静脉滴注奎宁

B: 咯萘啶或甲氟喹

C: 氯喹+伯氨喹

D: 乙胺嘧啶+磺胺药

答案: B

84. 减鼻充血药所致的典型不良反应是()。

A: 心率减慢

B: 共济失调

C: 血压升高

D: 血管舒张

答案: C

85. 属于芳基乙酸类的是

A: 对乙酰氨基酚

B: 阿司匹林

C: 吲哚美辛

D: 塞来昔布

答案: C

86. 治疗黏液性水肿的主要药物是()

A: 甲巯咪唑

B: 甲状腺素

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 小剂量碘剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/715124041122012033>