

## 急救理论知识考试模拟题（附答案）

### 一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、急性肺水肿时吸入乙醇湿化氧的目的是（ ）

- A、降低肺泡内泡沫的表面张力
- B、兴奋呼吸中枢
- C、促使毛细血管扩张而减轻心脏负荷
- D、解除支气管平滑肌痉挛

正确答案：A

2、患者男性，55 岁。车祸造成多发性损伤，急救车首先要处理的情况是（ ）

- A、颅脑外伤
- B、膀胱破裂
- C、外伤性大出血
- D、开放性骨折
- E、腹部外伤后肠管脱出

正确答案：C

3、下列哪项不是急救中心的任务（ ）

- A、负责对下级急救医疗站的业务指导；
- B、承担大型集会，重大比赛的现场治安保障。
- C、在卫生行政部门的领导或委托下，负责实施本地院前急救工作；
- D、承担大型集会，重大比赛的现场急救保障；

正确答案：B

4、护士巡视病房时发现病人闭式胸膜腔引流管脱出，首先要（ ）

- A、急送手术室处理
- B、把脱出的引流管重新插入
- C、立即报告医生
- D、用无菌凡士林纱布、厚层纱布封闭引流口

正确答案：D

5、成人心肺复苏时胸外按压实施者交换按压操作的时间间隔为（ ）

- A、2 分钟
- B、10 分钟；
- C、3 分钟；
- D、5 分钟；

正确答案：A

6、目前国内医院感染最常发生的部位是（ ）

- A、胃肠道
- B、血液
- C、泌尿道
- D、外科切口
- E、下呼吸道

正确答案：E

7、造成产前大出血的原因是（ ）

- A、以上均是
- B、前置胎盘
- C、胎盘早剥
- D、输卵管妊娠
- E、腹腔妊娠

正确答案：A

8、气管插管留置时间不宜超过（ ）

- A、48 小时
- B、72 小时
- C、24 小时
- D、36 小时

正确答案：B

9、影响除颤成功的因素有（ ）

- A、是否使用呼吸兴奋剂
- B、室颤波波幅大小
- C、是否行亚低温治疗
- D、代谢性碱中毒

正确答案：B

10、现场救护局部伤口处理正确的是（ ）

- A、内脏、组织等纳回伤口
- B、清除伤口异物
- C、无菌纱布覆盖
- D、清除血凝块

正确答案：C

11、抢救溺水后肺水肿的患者，可用乙醇置于湿化瓶内给氧，乙醇浓度为（ ）

A、40~50%

B、50~60%

C、30~40%

D、10~20%

E、20~30%

正确答案：B

12、淹溺的救治原则，下列选项错误的是（ ）

A、迅速将淹溺者救离出水

B、立即恢复有效通气

C、心肺复苏术

D、根据病情做出救治处理

E、首先考虑电击除颤

正确答案：E

13、25岁女性患者，面部刀刺伤12小时，刀口长4cm，深0.8cm，最恰当的治疗措施是（ ）

A、局部固定

B、清创缝合

C、换药

D、延期缝合

E、理疗

正确答案：B

14、男，40岁，误服氢氧化钾，出现咽喉及胸骨后烧灼感，上腹剧痛，恶心呕吐，以下哪项处理是错误的（ ）

A、口服牛乳

B、给抗生素

C、给镇静药

D、静脉输液

E、内镜检查

正确答案：E

15、支气管哮喘救治原则哪个不正确（ ）

A、注意诱发及加重该病因素的处理：及时脱离致敏环境，及时发现气胸等伴发情况

B、首先给予抗生素

C、吸氧 流量为1~3L/min

D、扩张支气管，糖皮质激素使用

正确答案：B

16、患者女性，48岁。家住平房，生煤火取暖，晨起感到头痛、头晕、视物模糊而摔倒，被他人发现后送至医院。急查血液碳氧血红蛋白实验呈阳性，首要的治疗原则是（ ）

A、注意保暖

B、纠正缺氧

C、静脉输液治疗

D、保持呼吸道通畅

E、测量生命体征

正确答案：B

17、抢救肺结核大咯血窒息，最关键的措施是（ ）

A、立即输液输血扩容

B、立即进行人工呼吸

C、立即注射呼吸兴奋剂

D、立即使病人取头低足高位

E、立即吸氧

正确答案：D

18、某患者颅内高压症状明显，医嘱静滴甘露醇 250ml，30分钟滴完，每分钟应滴（ ）

A、60d

B、80d

C、100d

D、125d

正确答案：D

19、复苏后病人应严密监测脉搏、心率和血压，一般血压维持在（ ）mmHg（ ）

A、80-90/50-60 mmHg

B、100-120/60-70 mmHg

C、90-100/60-70 mmHg

D、90-100/50-60 mmHg

正确答案：C

20、在车祸伤现场，作为奔向伤员的现场急救人员，应如何正确向伤员喊话？（ ）

- A、大声报出自己名字，让伤员放心。
- B、大声警告伤员不可随意活动，等待急救的处理；
- C、大声喊出自己是来营救的急救人员，让伤员放心；
- D、不向伤员喊话，该处理什么就做什么措施。
- E、大声呼喊伤员的名字，确定其是否能活动和反应；

正确答案：B

21、为明显降低脓毒症病人的死亡率和并发症发生率，应严格控制（ ）

- A、血糖
- B、心率
- C、肾功能
- D、转氨酶
- E、体温

正确答案：A

22、治疗暴发型流脑（休克型）首选抗菌药物是（ ）

- A、磺胺嘧啶
- B、青霉素
- C、复方新诺明
- D、氨苄青霉素
- E、氯霉素

正确答案：B

23、市民呼救相关信息应保存几年（ ）

- A、1年；
- B、3年
- C、2年；

正确答案：C

24、患者，男性，67岁，呼吸衰竭。血气分析显示患者存在呼吸性酸中毒，其主要治疗措施应该依靠（ ）

- A、使用激素
- B、补充液体
- C、提高吸氧浓度
- D、改善通气
- E、治疗原发病

正确答案：D

25、急救中心人员总编制，根据应配车辆数配备人员，即：\_（ ）

- A、1 辆救护车配 4 人；
- B、1 辆救护车配 5 人；
- C、1 辆车配 5 人；
- D、1 辆救护车配 3 人

正确答案：C

26、不宜用于治疗胃溃疡的药物是（ ）

- A、甲氰咪胍
- B、丙谷胺
- C、三钾铋络合剂
- D、阿托品
- E、前列腺合成剂

正确答案：D

27、患者，男，35 岁。1 天前饮酒后出现上腹剧烈疼痛，伴恶心，呕吐和腹胀，尿便正常。查体：左上腹肌紧张，明显压痛，腹平片示膈下未见游离气体。最可能的诊断是：（ ）

- A、急性阑尾炎
- B、肠梗阻
- C、急性胰腺炎
- D、胆石症
- E、消化性溃疡穿孔

正确答案：C

28、烧伤后病人出现休克症状时，最早的治疗措施中，下列哪项是错误的（ ）

- A、立即静脉输液
- B、镇静止痛
- C、保护创面，防止再损伤
- D、注意合并伤的诊断及处理
- E、立即转往有条件的医院治疗

正确答案：E

29、插胃管时，患者出现呛咳、紫绀应（ ）

- A、嘱患者作吞咽动作
- B、稍停片刻继续插
- C、托起患者头部再插管
- D、嘱患者深呼吸

E、立即拔出胃管重插

正确答案：E

30、心跳、呼吸骤停时心电图表现可为( )

A、病理性 Q 波

B、房性心动过速

C、二度房室传导阻滞

D、心房扑动

E、心室纤颤

正确答案：E

31、口对口人工呼吸的方法，下列哪项是错误的( )

A、吹气时捏紧病人鼻孔

B、胸外心脏按压与人工呼吸的比例为 30:2

C、按压频率成人 8~10 次/min

D、吹气时不要按压胸廓

E、首先必须畅通气道

正确答案：C

32、以下说法错误的是( )( )

A、两个脏器损伤死亡率 50%

B、一个脏器损伤死亡率 25%

C、两个脏器损伤死亡率 20%

D、四个脏器损伤存活率很低

E、三个脏器损伤死亡率 75%

正确答案：A

33、临床诊断急性胆囊炎的最主要根据是:( )

A、黄疸

B、Murphy 征阳性

C、右上腹持续性剧痛

D、胆囊区压痛

正确答案：B

34、破伤风强直性肌肉收缩最先发生在( )

A、四肢肌

B、咀嚼肌

C、肋间肌

D、颈项肌

E、面肌

正确答案：B

35、批量伤员救治中最重要的是( )

A、注意危重、沉默伤员

B、通知医疗机构

C、早到现场

D、检伤分类

E、向上级报告

正确答案：D

36、引起猝死最常见的心律失常是( )

A、室上性阵发性心动过速

B、心房扑动

C、频发性室性早搏

D、心房颤动

E、心室颤动

正确答案：E

37、脊柱骨折的正确搬运法：( )

A、双人搀扶

B、单人搀扶

C、背负

D、抱扶

E、平卧式

正确答案：E

38、男性，25岁，腹部绞痛3H，急诊入院。3小时前于饭后剧烈活动，引起剧烈腹部绞痛。恶心、呕吐，吐物为胃内容，不排便、排气。查体：Bp 6.2/4.2 kPa(50/30 mmHg)，P 110次/分。急性病容，腹部不对称，右侧膨隆，有压痛，肠鸣音消失，治疗中最重要的是：( )

A、手术

B、输血

C、输液

D、抗生素

正确答案：A

39、糖尿病酮症酸中毒救治中哪项不正确( )

A、补液，视脱水和心功能情况决定补液速度和补液量；

- B、立即建立静脉通道，尽早开始补液；
- C、可以鼓励患者口服淡盐水；
- D、可以在现场救治，不需要送到医院。

正确答案：D

40、一急性胰腺炎患者出现手足搐搦，给予静脉注射 10%葡萄糖酸钙后仍未能控制，查血钙 1.0mg / dL。应考虑存在下列哪一种情况（ ）

- A、酸中毒
- B、低血钠
- C、低血钙
- D、低血钾
- E、低血镁

正确答案：E

41、深 II° 烧伤典型的临床表现是（ ）

- A、创面基底呈蜡白
- B、创面基底发红
- C、有大水疱
- D、创面基底红白相间
- E、感觉敏感

正确答案：D

42、预激综合征合并心房颤动的治疗，下列哪项描述是错误的（ ）

- A、禁用洋地黄类药物
- B、禁用钙通道阻滞剂
- C、禁用  $\beta$  受体阻滞剂
- D、可联合应用钙通道阻滞剂与  $\beta$  受体阻滞剂
- E、可使用 IC 类抗心律失常药

正确答案：D

43、2005 年指南在心脏停搏时推荐的每次吹气时间为（ ）

- A、快速用力吹气
- B、大于 1 秒
- C、与呼气时间等同
- D、小于 1 秒

正确答案：B

44、对伤口消毒，以下哪个是最佳的消毒剂？（ ）

- A、碘伏

- B、紫药水
- C、酒精
- D、红药水

正确答案：A

45、最易并发休克的急腹症是( )

- A、肠梗阻
- B、肠伤寒穿孔
- C、急性水肿性胰腺炎
- D、急性梗阻性化脓性胆管炎
- E、阑尾炎穿孔

正确答案：D

46、下列哪项违反手术进行中的无菌原则 ( )

- A、手套接触非无菌后，应酒精消毒
- B、下坠超过手术台边以下的器械不能用
- C、器械不能从手术者背后递送
- D、前臂或肘部碰触有菌地方，应更换无菌手术衣或加套无菌袖套
- E、洗手护士腰以下，背部和肩部以上都应视为有菌区不能接触

正确答案：A

47、有机磷中毒的病人，在应用抗胆碱药时，下列哪项临床表现不能表明阿托品化 ( )

- A、心率 110 次/分
- B、肺部啰音增加
- C、皮肤干燥
- D、颜面潮红

正确答案：B

48、预防和治疗肺部感染的关键措施( )

- A、雾化
- B、咳嗽
- C、有效排除呼吸道分泌物
- D、勤翻身
- E、治疗原发病

正确答案：C

49、开颅术后 24 小时内最危险的并发症是( )

- A、切口感染

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/716044013144010045>