内科学模拟练习题+答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1.糖化血浆白蛋白测定的临床意义为反映糖尿病患者

A、近 4~12 周内血糖总的水平

B、近 3 个月内血糖总的水平

C、近半年内血糖总的水平

D、近 16 周内血糖总的水平

E、近 2~3 周内血糖总的水平

正确答案：E

2.男性,35 岁,发热,,胸部持续性钝痛二天,胸痛于仰卧时加剧,向左臂放射,用硝酸甘油无效,心音减低,伴舒张期附加音,Bp110/80mmHg 下肢水肿,静脉压 180mm 水柱,ECGST 段抬高,弓背向下,未见 Q 波,诊断最可能为

A、急性心肌梗死

B、缩窄性心包炎

C、变异型心绞痛

D、稳定型心绞痛

E、急性渗出性心包炎

正确答案：E

3.血压为 170/112mmHg 时,属于几级高血压

A、2 级高血压

B、1 级高血压

C、单纯收缩期高血压

D、正常高值血压

E、3 级高血压

正确答案：E

4.男,38 岁。因间断心悸 1 天就诊。查体:心率 72 次/分,偶可闻及期前收缩。心电图示:提前出现的 P 波，形态与窦性 P 波略有不同,P-R 间期 0.13 秒,QRS 波群形态正常,代偿间歇不完全。最恰当的处理是

A、口服胺碘酮

B、口服普罗帕酮

C、静脉注射阿托品

D、寻找和去除病因

E、口服美托洛尔

正确答案：D

5.治疗无血流动力学障碍的持续性室速,下列药物应首选

A、毛花苷丙

B、比索洛尔

C、腺苷

D、地尔硫卓

E、利多卡因

正确答案：E

6.男,22 岁。剧烈活动时突发心悸 1 小时。既往体健。BP90/60mmHg。心电图示心室率 220 次/分，节律较规则,QRS 波群时限 0.16 秒,可见心室夺获和室性融合波。最可能的诊断是

A、室性心动过速

B、心房扑动

C、房性心动过速

D、窦性心动过速

E、阵发性室上性心动过速

正确答案：A

7.系统性红斑狼疮的诊断标准不包括

A、抗双链 DNA 抗体阳性

B、抗核抗体阳性

C、抗 Sm 抗体阳性

D、补体增高

E、蛋白尿、管型尿或血尿

正确答案：D

8.磺脲类口服降糖药不适宜下列哪项

A、2 型糖尿病合并妊娠

B、2 型糖尿病患者已用胰岛素<30U/日

C、2 型糖尿病对胰岛素不敏感

D、2 型糖尿病对胰岛素抗药

E、2 型糖尿病患者基础治疗未达控制目标

正确答案：A

9.男性,65 岁,高血压多年,血压达 170/100mmHg,服药可降至正常,二个月来每于走路或上楼时感心前区闷痛,休息或口含硝酸甘油 5 分钟内可缓解,超声心动图示左室腔舒张末内径 5.0cm,左室后壁 0.8cm,该病例最可能诊断为

A、高血压病 3 级

B、高血压病 1 级

C、肥厚型梗阻性心肌病

D、冠心病伴高血压病 2 级

E、高血压性心脏病伴冠心病

正确答案：D

10.一 60 岁男性患者,劳力性呼吸困难 3 年,双下肢水肿两周,查体:口唇发绀,颈静脉怒张,心率 118 次/分,律齐,S1S2 均减弱,P2>A2,心尖部可闻及室性奔马律及 3/6 级收缩期杂音,肝肋下可及,双下肢水肿,为帮助诊断,最需做

A、心电图

B、超声心动图

C、测定静脉压

D、心电向量图

E、胸部 X 线

正确答案：B

11.Sheehan 综合征的主要病因是

A、垂体腺瘤

B、下丘脑肿瘤

C、产后大出血

D、头颅外伤

E、甲状腺肿瘤

正确答案：D

12.男性,58 岁,干部,胸骨后剧烈疼痛 2 小时用硝酸甘油舌下含不缓解急诊入院,心电图Ⅱ、Ⅲ、avF 出现 ST 段抬高,最有价值的治疗措施是

A、葡萄糖、胰岛素、氯化钾静滴

B、硝酸甘油静脉滴注

C、低分子右旋糖酐静滴

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/716050213124011015