2025 年护师类之主管护师题库附答案（典型题）

单选题（共 50 题）

1、社区护士对肢体有伤口的伤员急救处理措施为（ ）。

A.用清水冲洗创面

B.对擦伤、撕裂伤可挤出创面少量血液

C.立即使用吗啡等药物

D.可经口补充一定量的液体

E.发现伤者立即搬运至卫生站

【答案】 B

2、初乳是

A.产后 3 天内分泌的乳汁

B.产后 5 天内分泌的乳汁

C.产后 7 天内分泌的乳汁

D.产后 7～14 天分泌的乳汁

E.产后 14 天以后分泌的乳汁

【答案】 C

3、患者，21 岁，因失恋而服毒自杀，家属在卧室发现患者时，其表现为恶心、呕吐、腹痛、流涎、口鼻大量分泌物伴呼吸困难等症状。由急诊入院治疗，体格检查发现呼吸有浓烈蒜味，瞳孔缩小。最可能的诊断是

A.煤气中毒

B.有机磷农药中毒

C.镇静类药物过量中毒

D.亚硝酸盐中毒

E.一氧化碳中毒

【答案】 B

4、患者女性，33 岁。孕 3 产 1，孕 40 周。阴道流液 2 日、阵发性腹痛 6 小时入院。因宫缩乏力给予缩宫素静脉滴注，宫口迅速开大。在引产过程中患者出现一些临床表现，被诊断为羊水栓塞。

A.加压给氧，准备气管插管

B.静脉推注地塞米松 40mg

C.静注阿托品 1mg

D.子宫切除术

E.5%碳酸氢钠静脉点滴纠正酸中毒

【答案】 D

5、某男性患者，44 岁，患肝炎后肝硬化肝性脑病住院，病人经治疗后神志转清，可逐步增加蛋白质饮食，但短期内蛋白质不能超过

A.20～30g/d

B.40～50g/d

C.60～70g/d

D.80～90g/d

E.100g/d

【答案】 B

6、某肺癌晚期患者面对即将来临的死亡，表现为稳定、平静和少言寡语，这表明患者处于心理反应的（ ）。

A.否认阶段

B.接受阶段

C.协议阶段

D.悲伤阶段

E.孤独阶段

【答案】 B

7、患者男，18 岁。从墙上掉下，后枕部着地，有意识障碍约 15 分钟并有呕吐，清醒后有逆行性遗忘。最可能的诊断是（ ）。

A.脑挫伤

B.脑震荡

C.脑干损伤

D.颅内血肿

E.脑水肿

【答案】 B

8、子宫内膜癌的检查方法

A.内窥镜检查术

B.阴道及宫颈细胞学检查

C.诊断性刮宫

D.输卵管畅通术

E.阴道后穹隆穿刺术

【答案】 C

9、保护胃黏膜的药物是（ ）。

A.硫糖铝

B.碳酸氢钠

C.雷尼替丁

D.非甾体抗炎药

E.洛赛克

【答案】 A

10、冠状动脉造影术后穿刺点沙袋应压迫

A.6 小时

B.8 小时

C.10 小时

D.12 小时

E.24 小时

【答案】 A

11、初产妇第一产程活跃期延长是指活跃期超过（ ）。

A.12h

B.10h

C.8h

D.6h

E.4h

【答案】 C

12、提示可加大运动量，进入高一阶段的训练

A.AMI 康复运动后心率增加＜10 次 / 分

B.AMI 康复运动后心率增加 10-20 次 / 分

C.AMI 康复运动后心率增加>20 次 / 分

D.AMI 康复运动后收缩压降低＜5mmHg

E.AMI 康复运动后收缩压升高＜5mmHg

【答案】 A

13、口服给药时应采取的正确方法是

A.小婴儿可以采取平卧的体位给药

B.油类药物可以用滴管直接滴入口中

C.患儿拒绝服药时可以暂缓给药

D.可以用奶瓶给小婴儿喂药

E.药物可以和食物混合喂服

【答案】 B

14、法洛四联症易出现的临床症状是( )

A.安静时心动过速

B.X 线显示肺门"舞蹈"征

C.短时间内肝脏增大

D.哭闹后出现缺氧发作

E.存在周围血管征

【答案】 D

15、急性心梗病人持续吸氧的氧流量应设定为（ ）。

A.1L/min

B.2～4L/min

C.5L/min

D.6～8L/min

E.10L/min

【答案】 B

16、膀胱癌患者的典型症状是（ ）。

A.进行性排尿困难

B.活动后镜下血尿

C.间歇、无痛性全程血尿，终末加重

D.输精管增粗，有串珠状小结节

E.排尿突然中断，伴会阴部放射痛

【答案】 C

17、对乙型肝炎重点应采取的预防措施是（ ）。

A.空气隔离

B.饮食隔离

C.肠道隔离

D.加强血液、体液管理

E.虫媒隔离

【答案】 D

18、行肿瘤放射治疗的患者，当口腔出现假膜时，应选用的漱口水是（ ）。

A.呋喃西林溶液

B.生理盐水

C.双氧水

D.纯净水

E.温开水

【答案】 C

19、有一 64 岁女性患者，近 2 年来发现外阴左侧有一肿块，疼痛，2 个月前破溃，且有血性分泌物，查体见左侧大阴唇中段有一硬结约 3cm×2cm×2cm，基底宽，不活动，腹股沟淋巴结未触及。

A.单纯外阴切除

B.外阴广泛切除及双侧腹股沟、盆腔淋巴结清扫术

C.放射治疗

D.单纯病灶切除辅以化疗

E.化疗

【答案】 B

20、患者男，65 岁。进行性吞咽困难 2 个月，病检报告示食管鳞状细胞癌。行食管癌根治术后第 4 天出现胸闷、呼吸困难，血白细胞 14×109/L。该患者最可能发生了（ ）。

A.坠积性肺炎

B.肺不张

C.吻合口瘘

D.乳糜胸

E.急性肺水肿

【答案】 C

21、层流洁净手术产的空气卫生学

A.≤200cfu/cm2

B.≤10cfu/cm2

C.≤15cfu/cm2

D.≤5cfu/cm2

E.≤500cfu/cm2

【答案】 B

22、头面、颈、臀、会阴等部位烧伤，创面处理应采用（ ）。

A.包扎疗法

B.暴露或半暴露疗法

C.热敷疗法

D.浸泡疗法

E.湿敷疗法

【答案】 B

23、女，31 岁，心悸，气促 10 年，反复咯血 4 年。听诊心率 90 次/分，规则，心尖区舒张期隆隆样杂音，第一心音亢进，可闻及开瓣音，P2 亢进，X 线示梨形心。最有效的治疗措施是（ ）。

A.应用洋地黄类药物

B.静脉推注利尿剂

C.调换止血剂品种

D.做二尖瓣分离术

E.做二尖瓣置换术

【答案】 D

24、2.5 岁小儿正常心率是（ ）。

A.120～140 次/分

B.110～130 次

C.100～120 次

D.80～100 次/分

E.70～90 次/分

【答案】 C

25、阴道内有大量泡沫样白带最常见于

A.慢性宫颈炎

B.滴虫性阴道炎

C.老年性阴道炎

D.念珠菌性阴道炎

E.慢性盆腔炎

【答案】 B

26、女性，40 岁，石油化工工人，长期与苯接触，一年来全身乏力、Hb50g / L，血小板 14×10

A.告诉患者需坚持治疗使用 3～6 个月才能判断是否有效

B.向患者说明药物副作用

C.肝功能受损需定期检查肝功能

D.停药后副作用不会消失

E.经常检查注射部位，发现硬块应及时报告，必要时作理疗

【答案】 D

27、小儿结核性脑膜炎早期主要表现是（ ）。

A.颅神经损害

B.头痛、呕吐

C.性情改变

D.脑膜刺激征

E.抽搐昏迷

【答案】 C

28、破坏血小板的器官是（ ）。

A.心脏

B.肝脏

C.脾脏

D.肺脏

E.骨髓

【答案】 C

29、患者，女性，25 岁，近 2 个月来轻度咳嗽，咳白色黏痰，内带血丝；午后低热，面颊潮红，疲乏无力，常有心悸、盗汗，较前消瘦。经 X 线摄片检查，发现右上肺第 2 肋部有云雾状阴影，无透光区。痰菌 3 次检验阴性，你认为下列哪项护理措施不必要

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

A.做好保健指导

B.室内开窗通风

C.按医嘱给予抗结核药物治疗，观察药物不良反应

D.住院隔离治疗

E.给予高热量、高维生素和高蛋白饮食

【答案】 D

30、有关含有孕激素宫内节育器的避孕原理，不正确的是( )。

A.释放的孕酮使子宫内膜腺体萎缩

B.抑制下丘脑.垂体.卵巢轴的作用

C.宫颈粘液变稠妨碍精子运行

D.影响精子的代谢

E.孕酮使子宫内膜间质蜕膜化不利于受精卵着床

【答案】 B

31、人类行为的主要适应形式不包括

A.反射

B.反馈

C.调试

D.顺应

E.应对

【答案】 B

32、某男性患者，58 岁，恶心呕吐、皮肤瘙痒 1 年，加重伴乏力、鼻出血 2 周。查体：血压 160/100mmHg，皮肤粘膜苍白，血尿素氮(BUN)15.2mmol/L，血红蛋白(Hb)70g/L，血肌酐(SCr)685μmol/L，内生肌酐清除率(Ccr)22ml/min。肾脏 B 超显示双肾缩小，皮质变薄。 最可能的诊断是

A.慢性肾衰竭

B.急性肾衰竭

C.恶性高血压

D.急进性肾小球肾炎

E.原发性肾病综合征

【答案】 A

33、妊娠晚期每日增加蛋白质的量是

A.5g

B.28mg

C.15g

D.80～100mg

E.10μg

【答案】 C

34、患者右上腹痛伴有黄疸、寒战、发热，应考虑为

A.胆总管结石

B.胆囊癌

C.高胆固醇血症

D.胆道蛔虫病

E.急性阑尾炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/716112022035011031