

# 2024 年广东省惠阳区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题内部题库有解析答案

## 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 马兜铃酸可导致

- A: 阻塞肾小管、肾小球
- B: 肾间质纤维化
- C: 肾小管坏死
- D: 前列腺素合成障碍

**答案：B**

2. 即在体内有抗凝作用，又在体外有抗凝作用的药物是

- A: 华法林
- B: 肝素
- C: 尿激酶
- D: 噻氯匹定

**答案：B**

3. 有关汞中毒的解救措施，错误的是

- A: 可以用二巯丙醇驱汞，并应酸化尿液以促进排泄
- B: 可以用青霉胺驱汞
- C: 口腔出现炎症时，可以用 2% 碳酸氢钠或氯己定含漱
- D: 可以用二巯丙磺钠驱汞

**答案：A**

4. (2016 年真题) 与左旋多巴合用，可提高疗效的是 ( )。

- A: 克拉维酸钾
- B: 叶酸
- C: 奥美拉唑
- D: 苄丝肼

**答案: D**

5. (在乳汁中排泄的药物) 青霉素较难在乳汁中出现的机制是青霉素

- A: 在脂肪与水中都有一定的溶解度
- B: 呈弱酸性
- C: 呈弱碱性
- D: 脂溶性高

**答案: B**

6. 下列关于脑梗死急性期药物治疗的说法，正确的是 ( )

- A: 应在使用溶栓药的同时联合使用阿司匹林
- B: 急性脑梗死的溶栓时间窗是 48 小时内
- C: 甘油果糖的脱水作用较甘露醇强且快
- D: 血小板计数  $<100 \times 10^9 / L$  时禁用溶栓药物

**答案: D**

7. 实施"用药列表"，能有效地

- A: 转变疾病预防和保健观念
- B: 健康生活方式的教育
- C: 识别及管理多重用药
- D: 提高用药顺应性

**答案: C**

8. 美金刚的主要不良反应是

- A: 呼吸抑制
- B: 血脂升高
- C: 幻觉
- D: 心律不齐

**答案：C**

9. 可用于不明毒物、与其形成腐蚀性较小的化合物的是

- A: 鸡蛋白
- B: 3%~5%鞣酸溶液
- C: 1%氯化钠溶液
- D: 药用炭混悬液

**答案：C**

10. 人体的生物钟规律即指在人体内调控某些生化、生理和行为现象有节奏地出现的生理机制，很多药物的作用和毒性、不良反应与人体的生物节律(生物钟)有着极其密切的关系，同一种药物在同等剂量可因给药时间不同而产生不同的作用和疗效。

- A: 抗抑郁药
- B: 平喘药
- C: 抗过敏药
- D: 调节血脂药

**答案：A**

11. 以下用于治疗寻常痤疮的药物中，属于非处方药的是

- A: 维胺酯
- B: 过氧苯甲酰
- C: 异维 A 酸

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

D: 阿达帕林

**答案：B**

12. 泌尿系统感染可能出现

A: 尿沉渣管型

B: 尿沉渣尿酸盐

C: 尿沉渣结晶

D: 尿沉渣白细胞

**答案：D**

13. 患者，男，60 岁，有糖尿病家族史。出现口干，多饮，多尿，体重下降 6 个月，BMI 值 29.0。空腹血糖 10.2mmol/L，餐后 2 小时血糖 16.7mmol/L，血压 115/80mmHg。

A: 双胍类降糖药

B: 胰岛素

C:  $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂

D: 磺酰脲类降糖药

**答案：A**

14. 稳定型心绞痛发作应首选的药物是

A: 硝酸甘油

B: 美托洛尔

C: 氨氯地平

D: 单硝酸异山梨酯

**答案：A**

15. 5%葡萄糖注射液 500ml 含有葡萄糖的克数是()

A: 33.3

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

B: 25

C: 30

D: 10

**答案：B**

16. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别头孢曲松属于药物妊娠毒性分级

A: A 级

B: C 级

C: B 级

D: D 级

**答案：C**

17. 除全身症状外，尚有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状

A: 病毒型

B: 肺炎型

C: 胃肠型

D: 神经型

**答案：C**

18. 宜于清晨服用的药品是

A: 糖皮质激素

B: 甲氧氯普胺

C: 阿卡波糖

D: 洛伐他汀

**答案：A**

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

19. 患者，男，53 岁。因心前区疼痛 6 年，加重伴呼吸困难 10 小时入院。入院前 6 年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续 3~5min，休息后减轻。入院检查：体温 37.8℃，心率 130 次/分，血压 80/40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

A: 硝普钠、利尿药、ACEI

B: 利尿药、长效二氢吡啶类钙通道阻滞药、ACEI

C:  $\beta$  受体阻断药、钙拮抗剂、ACEI

D: ACEI、AR

**答案：C**

20. 选择药物的首要标准是药物治疗的

A: 适宜性

B: 安全性

C: 经济性

D: 有效性

**答案：D**

21. (2016 年真题) 治疗口腔溃疡时，取少量吹敷于患处，一日用 2~3 次的药物是 ( )。

A: 西地碘含片

B: 地塞米松粘贴片

C: 冰硼咽喉散

D: 甲硝唑口腔粘贴片

**答案：C**

22. I 期临床试验样本数为

A: 常见病  $\geq 1000$  例

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

B: 20~30 例

C: 100~300 例

D: 常见病 $\geq$ 2000 例

**答案: B**

23. (常用的特殊解毒剂的适应证), 丙烯腈、氟化物、一氧化碳、重金属等中毒的特殊解毒剂

A: 二巯丁二钠

B: 谷胱甘肽

C: 乙酰半胱氨酸

D: 纳洛酮

**答案: B**

24. 目前治疗低 HDL-C 血症, 较为有效的药物是

A: 贝特类

B:  $\omega$ -3 脂肪酸制剂

C: 他汀类

D: 烟酸类

**答案: D**

25. 感冒初, 出现卡他症状, 如鼻粘膜充血、打喷嚏、流眼泪、流鼻涕, 宜选服

A: 含氢溴酸右美沙芬制剂

B: 含伪麻黄碱及氯苯那敏制剂

C: 含非甾体抗炎药制剂

D: 含中枢兴奋剂咖啡因制剂

**答案: B**

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

26. 提供的药物信息和建议是否均来自受过专门药学培训的合格人员，是衡量互联网信息的

- A: 权威性
- B: 归因性
- C: 新颖性
- D: 合理性

**答案：A**

27. 以下药品中，最容易受湿度影响而变质的是

- A: 滴眼剂
- B: 水溶性基质栓
- C: 肝素等生物制品
- D: 胰岛素制剂

**答案：B**

28. 在审核处方用药适宜性时，应特别注意是否有潜在临床意义的相互作用和配伍禁忌。下列联用药物中有潜在不良相互作用的是

- A: 头孢哌酮和舒巴坦
- B: 苄丝肼和左旋多巴
- C: 阿莫西林和克拉维酸钾
- D: 甲氧氯普胺和氯丙嗪

**答案：D**

29. 下列药物中，可影响性功能的药物为

- A: 西咪替丁
- B: 泮托拉唑
- C: 法莫替丁
- D: 雷尼替丁

**答案：A**

30. (联合用药) 感染性腹泻患者应用小檗碱+鞣酸蛋白属于

- A: 超剂量用药
- B: 非适应证用药
- C: 超适应证用药
- D: 过度治疗用药

**答案：D**

31. (2019 年真题) 患者，男，62 岁，无吸烟饮酒史，患高血压、高脂血症数年，未治疗。半年前就诊，查肝肾功能正常，按医嘱服用阿托伐他汀、氨氯地平。服药一个月后复查肝功能结果显示：AST145U/L，ALT134U/L，排除了其他疾病因素后，停用阿托伐他汀，肝功能逐步恢复正常。一个月后改用普伐他汀，再次出现肝功能异常。肝功能异常的不良反应用与他汀类药物之间的因果关系应评价为

- A: 可能无关
- B: 肯定
- C: 可能
- D: 很可能

**答案：B**

32. 重症抑郁症的首选治疗方法是

- A: 重复经颅磁刺激疗法
- B: 光线疗法
- C: 食物疗法
- D: 电休克疗法

**答案：D**

33. 下列对于轻度沙眼疗效最好的药物是

- A: 红霉素
- B: 酞丁安
- C: 磺胺醋酰钠
- D: 硫酸锌

**答案：B**

34. 《药物事实与比较》属于

- A: 药物综合信息
- B: 药物相互作用
- C: 药品标准
- D: 药品不良反应

**答案：A**

35. 洗胃液 1:5000 高锰酸钾溶液可用于解救哪类药物中毒

- A: 3911 中毒
- B: 1605 中毒
- C: 乐果中毒
- D: 巴比妥类中毒

**答案：D**

36. 单个样品量足够的随机对照试验结果属于

- A: 四级证据
- B: 三级证据
- C: 一级证据
- D: 二级证据

**答案：D**

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

37. (2017 年真题) 正常剂量维生素 D 的妊娠毒性分级是 ( )

- A: A 级
- B: C 级
- C: D 级
- D: X 级

**答案: A**

38. 患者突发心前区压榨性疼痛, 立即取出硝酸甘油片, 正确的使用方法是 ( )

- A: 清晨服用
- B: 舌下含服
- C: 用温水调服
- D: 应同时碱化尿液

**答案: B**

39. 药师审核后判定为合理处方, 应该

- A: 拒绝调配处方, 并依照有关规定报告
- B: 拒绝调配处方, 联系处方医师并进行干预
- C: 拒绝调配处方
- D: 调配处方并发药

**答案: D**

40. (致畸药物的种类与危害) 可能导致胎儿肢体、耳、内脏畸形的是

- A: 雄激素
- B: 氮芥类
- C: 沙利度胺
- D: 孕激素

**答案: C**

41. 缺铁性贫血患者常表现为()

- A: 嗜酸性粒细胞增多
- B: 血红蛋白减少
- C: 中性粒细胞增多
- D: 红细胞增多

**答案：B**

42. 控制癫痫持续状态应入院后首选（）

- A: 静脉注射丙戊酸钠
- B: 肌肉注射地西洋
- C: 口服硫酸镁
- D: 静脉注射地西洋

**答案：D**

43. 治疗胃食管反流病，雷尼替丁的正确服药时间是

- A: 三餐前 30min
- B: 症状发作时、餐后 1.5h 和睡前
- C: 餐后、睡前
- D: 早餐前 30min

**答案：C**

44. 据统计，全国高血压患者已经超过 2 亿，高血压患者中不足三成的人知道自己患病，而知道自己患有高血压的患者中，一半多没有用药物治疗，接受治疗的患者中，能达到治疗要求的仅三成左右。高血压死亡率不断升高。熟悉高血压及相关用药，对更有效地治疗高血压非常重要。

- A: 甲基多巴

B: 氢氯噻嗪

C: 依那普利

D: 拉贝洛尔

**答案: C**

45. 判别"大三阳"区别于"小三阳"的主要检查项目是

A: 抗-HBs(+)

B: HBeAg(+)

C: 抗-HBc(+)

D: 抗-HBe(+)

**答案: B**

46. 多用于病情急重者的制剂

A: 泡腾片剂

B: 滴丸剂

C: 透皮贴剂

D: 膜剂

**答案: B**

47. 慢性汞中毒患者的首发症状是 ( )

A: 剥脱性皮炎

B: 神经衰弱

C: 口腔炎

D: 易兴奋症

**答案: B**

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

48. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

- A: 氯化钾
- B: 红霉素
- C: 奥美拉唑
- D: 卡马西平

**答案：B**

49. 应用华法林抗凝治疗时，INR 安全有效范围为血栓性疾病患者实施抗凝治疗，应该控制国际标准化比值为

- A: 2.0~3.0
- B: >3.0
- C: 2.0~2.5
- D: <2.0

**答案：A**

50. 患者，男，54 岁，2 周前痛风急性发作，经治疗后病情缓解，后期针对其痛风的治疗不宜选用的药物是 ()

- A: 别嘌醇
- B: 秋水仙碱
- C: 非布索坦
- D: 苯溴马隆

**答案：B**

51. 儿科用药中，对新生儿或婴儿最常用的给药途径是

- A: 静脉滴注

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

B: 静脉注射

C: 肌肉注射

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

D: 口服给药

**答案：A**

52. 与硫酸亚铁合用，可减少铁吸收的药物是

A: 叶酸

B: 奥美拉唑

C: 苜丝肼

D: 克拉维酸钾

**答案：B**

53. 抗类风湿关节炎药物中，至少服用 6 个月才能宣布无效，长期大剂量服用可出现肾损害和骨髓抑制的是

A: 来氟米特

B: 氯喹

C: 柳氮磺吡啶

D: 青霉胺

**答案：D**

54. 下列中药、化学药联合应用，不存在重复用药的是

A: 曲克芦丁片联用维生素 C 片

B: 消渴丸联用格列本脲片

C: 新癬片联用吲哚美辛胶囊

D: 鼻炎康片联用马来酸氯苯那敏片

**答案：A**

55. 癫痫持续状态的首选治疗方法为

A: 苯妥英钠静脉注射

B: 地西洋静脉注射

C: 苯巴比妥肌内注射

D: 乙琥胺口服

**答案: B**

56. 适宜进餐时给药，可以减少脂肪吸收率的药物是

A: 氢氧化铝

B: 甲氧氯普胺

C: 奥利司他

D: 多潘立酮

**答案: C**

57. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎

B: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等

C: 氯霉素在新生儿体内蓄积呈现灰婴综合征

D: 口服避孕药致阿米替林清除率下降

**答案: D**

58. 哺乳期妇女泌尿道感染应该选用的药物是

A: 米诺环素

B: 氨苄西林

C: 磺胺嘧啶

D: 依托红霉素

**答案: B**

59. 可引起胎儿性发育异常的药物是

- A: 苯巴比妥
- B: 沙利度胺
- C: 叶酸拮抗剂
- D: 雌激素、孕激素、雄激素

**答案：D**

60. 胰岛素增敏剂

- A: 瑞格列奈
- B: 伏格列波糖
- C: 罗格列酮
- D: 格列吡嗪

**答案：C**

61. 收录 22000 多种处方药和 6000 多种 OTC 药物的是

- A: 《中国国家处方集》
- B: 《药物事实与比较》
- C: 《美国药典药物信息》
- D: 《马丁代尔药物大典》

**答案：B**

62. 应用高剂量时可导致脑病的抗菌药物是

- A: 美罗培南
- B: 头孢唑林
- C: 青霉素
- D: 头孢哌酮

**答案：B**

63. 属于 M 受体阻断剂的是

- A: 福莫特罗
- B: 异丙托溴铵
- C: 美托洛尔
- D: 乙酰胆碱

**答案：B**

64. 患者，男，48 岁，近日自感头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、失眠、乏力等症状，就诊后测定血压 160 / 100mmHg。

- A: 阿奇霉素
- B: 呋塞米
- C: 依那普利
- D: 硝酸甘油

**答案：C**

65. 患者，男，58 岁，有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2 年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊，开具药品如下：

- A: 阿司匹林用药期间，需定期监测 INR
- B: 阿司匹林肠溶片在进餐时服用，以减轻对胃肠道的刺激性
- C: 用药期间，应关注腹痛、柏油样便或呕血等消化道出血症状
- D: 阿司匹林属于冠心病一级预防，长期使用方可获益

**答案：C**

66. 泡腾片的使用正确的是

- A: 幼儿可自行服用
- B: 150~200ml 冷水中浸泡
- C: 100~150ml 凉开/温水中浸泡

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

D: 50~100ml 热水中浸泡

**答案：C**

67. 长期服用苯妥英钠，可能导致

A: 血清碱性磷酸酶升高

B: 丙氨酸氨基转移酶升高

C: A / G 比值 < 1

D:  $\gamma$ -谷氨酰转移酶升高

**答案：D**

68. 痛风急性发作期应选用

A: 别嘌醇

B: 秋水仙碱

C: 丙磺舒

D: 阿司匹林

**答案：B**

69. 峰值一般在清晨 7~8 时，谷值则在午夜 0 时，是

A: 胃酸的分泌

B: 糖皮质激素的分泌

C: 肝脏合成胆固醇

D: 胰岛 B 细胞

**答案：B**

70. 适用于夜间服用的药物是

A: 他汀类

B: 利尿剂

C: 糖皮质激素

D: 氨基糖苷类

**答案：A**

71. 女，37 岁，前来药店购买退热药，药师应进行的咨询与指导，错误的是

A: 若经过咨询得知顾客是为家里 3 岁女儿购买，不应推荐阿司匹林

B: 如果顾客购买对乙酰氨基酚口服液，应告知患者 3 天后症状未缓解需及时就医

C: 顾客告知自己母亲 72 岁，有慢阻肺病史，昨日出现头痛、肌肉酸痛、咽痛、咳嗽，前来替母亲购药，药师应建议顾客带家属就医，不宜自我药疗

D: 如果得知顾客为本人购药，且已经服用过对乙酰氨基酚 3 日，症状未缓解，药师可建议患者联合服用布洛芬口服液

**答案：D**

72. 根据时辰药理学，选择最适宜的给药时间，可增强药物疗效、避免不良反应、提高用药依从性避免导致肾上腺皮质功能下降的是

A: 清晨服糖皮质激素

B: 清晨服氨基糖苷类

C: 清晨服利尿药

D: 清晨服抗抑郁药

**答案：A**

73. 属于拓扑异构酶抑制剂是

A: 放线菌

B: 顺铂

C: 培美曲塞

D: 依托泊苷

**答案：D**

74. 对于轻度（IPSS<8 分）至中度（IPSS 为 8~19 分）前列腺增生症患者，建议初始治疗药物是

- A: 坦索罗辛
- B: 米多君
- C: 奥昔布宁
- D: 非那雄胺

**答案：A**

75. 嗜酸性粒细胞正常参考区间是

- A: 0.01~0.05
- B: 0~0.01
- C: 0.20~0.40
- D: 0.03~0.08

**答案：A**

76. 下列医学检查项目中，可用于诊断急性心肌梗死的是

- A: 肌酸激酶增高
- B: 胆碱酯酶增高
- C: 血淀粉酶增高
- D: 尿淀粉酶增高

**答案：A**

77. 患者，女，52 岁，近年来发现手关节肿痛，且呈对称性，并有畸形，晨起时有僵硬现象持续 1 小时，疼痛难忍。经实验室检测示血沉 28mm / 1h，指尖关节的 X 线片显示受累关节有骨侵蚀特征。

- A: 布洛芬

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

- B: 阿司匹林
- C: 塞来昔布
- D: 双氯芬酸钠

**答案：C**

78. 静脉注射青霉素的适宜溶媒是

- A: 5%葡萄糖注射液
- B: 50%葡萄糖注射液
- C: 复方氨基酸注射液
- D: 0.9%氯化钠注射液

**答案：D**

79. 患者，女，45岁，1年前临床诊断为室上性心动过速，服用美托洛尔片 25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡，幽门螺杆菌阳性。既往有膝关节疼痛，长期服用非甾体抗炎药。医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgqd，甲硝唑片 0.4gtid，克拉霉素片 50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊 220mg tid。该处方中，给药剂量错误的药物是

- A: 枸橼酸铋钾胶囊
- B: 甲硝唑片
- C: 克拉霉素片
- D: 奥美拉唑肠溶片

**答案：C**

80. 属于 HIV 整合酶链转移抑制剂的是 ( )

- A: 阿巴卡韦
- B: 多替拉韦
- C: 奈韦拉平
- D: 洛匹那韦

**答案：B**

81. 放射性碘的不良反应是

- A: 甲状腺功能亢进
- B: 中枢抑制
- C: 甲状腺功能低下
- D: 粒细胞缺乏

**答案：C**

82. 服药后宜多饮水的药物是

- A: 磺胺类药物
- B: 胃黏膜保护剂
- C: 镇静催眠药
- D: 微生态制剂

**答案：A**

83. 一般给予肠外营养物质的热氮比为

- A: NPC7: 3
- B: 100kcal: 1gN
- C: NPC5: 5
- D: 150kcal: 1gN

**答案：D**

84. 癫痫大发作首选

- A: 丙戊酸钠
- B: 苯妥英钠
- C: 卡马西平
- D: 拉莫三嗪

**答案：B**

85. 患者，男，75 岁，有高血压，长期服用厄贝沙坦氢氯噻嗪片（150mg/12.5mg）1 片 qd，血压控制平稳。因排尿困难、尿频和尿不尽感就诊，诊断为良性前列腺增生。给予非那雄胺片 5mgqd，特拉唑嗪片 5mgqd。患者用药后出现头晕，前来咨询。

- A: 非那雄胺可引起直立性低血压，头晕可能与此相关
- B: 建议睡前服用特拉唑嗪，有助于缓解头晕症状
- C: 非那雄胺可增强降压药的降压效果，建议更换降压药
- D: 头晕可能与患者焦虑有关，继续用药会逐渐缓解

**答案：B**

86. 阿托品联用氯解磷定解救有机磷重度中毒的机制是

- A: 促进机体的利用
- B: 竞争性拮抗作用
- C: 作用于不同的靶点
- D: 延缓或降低抗药性

**答案：C**

87. 药名容易混淆的药物识别，安定 / 地西洋

- A: 抗心绞痛药
- B: 抗焦虑药
- C: 抗高血压药
- D: 退热药

**答案：B**

88. 可影响幼儿软骨发育，导致承重关节损伤的药物是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

A: 诺氟沙星

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/716212131101011030>