

2024 江苏省阜宁县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题王牌题库标准卷

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列哪个不是慢性咽炎的临床表现

- A: 咽喉部不适、干燥、发痒、疼痛或有异物感
- B: 常伴有发热
- C: 清晨起床后常会吐出微量的稀痰，伴有声嘶
- D: 有刺激性咳嗽

答案：B

2. 淋巴细胞正常参考区间是

- A: 0~0.01
- B: 0.03~0.08
- C: 0.005~0.05
- D: 0.20~0.40

答案：D

3. 某男性，27 岁，间断上腹痛 3 年，表现为餐后痛，1~2 小时后缓解，以冬春季多发。

- A: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂
- B: 法莫替丁+克拉霉素+阿莫西林+铋剂
- C: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂
- D: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁

答案：A

4. 可导致性功能减退、皮疹、乳腺增大的药物是

- A: 坦索罗辛
- B: 非那雄胺
- C: 奥昔布宁
- D: 多沙唑嗪

答案：B

5. 以下患者中，最适宜口服给药的是

- A: 吞咽困难的老人
- B: 病情危重的患者
- C: 慢性病或轻症患者
- D: 胃肠反应大的患者

答案：C

6. 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15KG，一天前发热(39℃)，咽喉痛，无咳嗽、吐血，家长主诉在家中应用退烧药治疗，发病左右出现腹泻，约 2~5 次大便，量少，黄色粘液便，呕吐一次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽微充血，出现轻脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃，实验室检查：WBC： 5×10

- A: 若患儿腹泻加重，可口服自制补液盐进行补液
- B: 每次腹泻后均要少量多次喂水，直至腹泻停止
- C: 应给予少量、多次、清淡饮食
- D: 若症状不能改善，及时加用诺氟沙星

答案：D

7. 以下临床用药中，药物相互作用主要是药效学的影响是

- A: 四环素同服硫酸亚铁减效
- B: 利福平同服异烟肼致肝毒性增加
- C: 氯噻嗪减弱甲苯磺丁脲的降糖作用
- D: 维生素 C 与多潘立酮同服吸收减少

答案：C

8. 可能导致因心力衰竭和呼吸衰竭而死亡的是

- A: 易制毒药品
- B: 精神刺激剂
- C: 肽激素类
- D: 蛋白同化制剂

答案：A

9. 以下肌酸激酶检查值升高的临床意义中，最正确的是

- A: 诊断恶性贫血
- B: 诊断痛风
- C: 诊断急、慢性白血病
- D: 诊断心肌梗死

答案：D

10. 尿失禁治疗的首要处理原则是

- A: 调整生活方式
- B: 除去诱因和针对原发病进行治疗
- C: 药物治疗
- D: 进行行为治疗

答案：B

11. 维生素类适宜

- A: 清晨服用
- B: 餐中服用
- C: 餐前服用
- D: 餐后服用

答案：D

12. 治疗癌症疼痛患者因服用阿片类镇痛剂导致的便秘，可选择的药物是

- A: 乳果糖
- B: 硫酸镁
- C: 东莨菪碱
- D: 比沙可啶

答案：A

13. 胆酸螯合剂

- A: 吉非贝齐
- B: 辛伐他汀
- C: 考来烯胺
- D: 阿昔莫司

答案：C

14. (在乳汁中排泄的药物)青霉素较难在乳汁中出现的机制是青霉素

- A: 在脂肪与水中都有一定的溶解度
- B: 呈弱酸性
- C: 脂溶性高
- D: 呈弱碱性

答案：B

15. 观察人体对新药的耐受程度和药动学评价阶段是

- A: IV 期临床试验
- B: I 期临床试验
- C: III 期临床试验
- D: II 期临床试验

答案: B

16. 可提示完全梗阻性黄疸的是

- A: STB $17.1\ \mu\text{mol/L}$ ~ $34.2\ \mu\text{mol/L}$
- B: STB $34.2\ \mu\text{mol/L}$ ~ $171\ \mu\text{mol/L}$
- C: STB $>342\ \mu\text{mol/L}$
- D: STB $17.1\ \mu\text{mol/L}$ ~ $171\ \mu\text{mol/L}$

答案: C

17. 关于丁螺环酮治疗焦虑症的优点，下列说法不正确的为

- A: 无呼吸抑制
- B: 起效快
- C: 镇静作用轻
- D: 较少引起运动障碍

答案: B

18. 混合型高脂血症，首选用的药物是

- A: 贝特类
- B: 烟酸
- C: 他汀类
- D: ω -3 脂肪酸

答案: C

19. 脂肪或酪蛋白消化不良（儿童）可呈现

- A: 白陶土便
- B: 乳凝块便
- C: 鲜血便
- D: 柏油黑便

答案：B

20. 沿静脉出现迂回线状色素沉着

- A: 柔红霉素
- B: 白消安
- C: 氟尿嘧啶
- D: 博来霉素

答案：C

21. 治疗滴虫性阴道炎首选的药物是()

- A: 伏立康唑片
- B: 莫匹罗星软膏
- C: 吡哆美辛栓
- D: 甲硝唑栓

答案：D

22. 有助建立、维持并增进药师与患者的专业性关系的技能是

- A: 药历书写技能
- B: 沟通技能
- C: 药品警戒技能
- D: 自主学习能力

答案：B

23. 服用后不宜立刻饮水，以免冲淡咽部药物浓度的是

- A: 舌下片
- B: 粉剂
- C: 糖浆剂
- D: 胶囊剂

答案：C

24. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。头孢曲松属于()

- A: C 级
- B: B 级
- C: D 级
- D: A 级

答案：B

25. 吩噻嗪类抗精神病药中毒时若癫痫发作应给予

- A: 间羟胺
- B: 有机硫类
- C: 阿托品
- D: 地西泮

答案：D

26. 易受光线影响而变质的药品是

- A: 复方甘草合剂
- B: 阿卡波糖片
- C: 头孢曲松钠
- D: 硝酸甘油

答案：D

27. (2015 年真题) 上市后药品临床再评价阶段是 () 。

- A: I 期临床试验
- B: II 期临床试验
- C: III 期临床试验
- D: IV 期临床试验

答案: D

28. (用药与尿液检查异常) 甲氨蝶呤可能引起

- A: 尿液隐血
- B: 尿蛋白
- C: 尿液 pH 增高
- D: 尿胆红素

答案: B

29. 患者，男，60 岁，呈典型的“面具脸”“慌张步态”及“写字过小征”表现，确诊为帕金森病患者同时患有消化道溃疡，不宜选用的治疗药物是

- A: 左旋多巴
- B: 氟西汀
- C: 卡马西平
- D: 多奈哌齐

答案: A

30. 提示并不存在风险，目前不需采取措施的信号属于

- A: 确认的信号
- B: 驳倒的信号
- C: 尚不确定的信号

D: 部分确认信号

答案：B

31. 患者，男，36 岁。临床诊断痛风性关节炎急性发作期。症见左侧踝关节红肿，剧烈疼痛。为控制炎症，治疗首选药是

A: 秋水仙碱

B: 非布司他

C: 布洛芬

D: 尼美舒利

答案：A

32. 下列治疗良性前列腺增生症的药物中，可以引起性功能减退的是

A: 奥昔布宁

B: 托特罗定

C: 非那雄胺

D: 索利那新

答案：C

33. 有助于提高医、护、药专业人员对 ADR 的警惕性和识别能力；说明 ADR 监测的意义是

A: 为“药品召回”提供依据

B: 促进临床合理用药

C: 促进新药的研制开发

D: 减少 ADR 的危害

答案：B

34. 可能增加严重心血管疾病风险，减肥治疗的风险大于获益，已于 2010 年 10 月在我国停止生产、销售和使用的减重药是

- A: 芬特明
- B: 西布曲明
- C: 安非拉酮
- D: 奥利司他

答案：B

35. 食入何种物质对磺胺药、抗痛风药、氢氧化铝、红霉素有影响

- A: 食醋
- B: 脂肪
- C: 蛋白质
- D: 食盐

答案：A

36. (2019 年真题) 患者，男，60 岁，诊断为高血压伴高尿酸血症，首选的药物是

- A: 美托洛尔
- B: 螺内酯
- C: 维拉帕米
- D: 氯沙坦

答案：D

37. 主要侵犯生殖器、肛门等部位及新生儿的是 (单纯疱疹病毒的分型)

- A: HSV-I 型
- B: HSV-II 型
- C: HSV-IV 型
- D: HSV-III 型

答案：B

38. 患者,男,59 岁,高血压病史 5 年,因头痛伴有恶心、呕吐就诊,MRI 检查结果显示蛛网膜下腔出血。为防治脑血管痉挛,早期宜选用的药物()

- A: 氨氯地平
- B: 硝苯地平
- C: 尼莫地平
- D: 缬沙坦

答案: C

39. 某患者,女,27 岁,多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁 3 个月。血 FT

- A: 体重
- B: 心率
- C: 白细胞
- D: 血压

答案: D

40. 药物相互作用使药物吸收增加的联合用药事例是

- A: 青蒿素联用乙胺嘧啶
- B: 硝苯地平联用普萘洛尔
- C: 阿托品联用普萘洛尔
- D: 铁剂联用维生素

答案: D

41. 滴眼液或眼膏开瓶后保质期一般为

- A: 10~20 天
- B: 28~40 天

C: 25~35 天

D: 28~30 天

答案：D

42. 饮水冲淡药物对感受器的刺激是指

A: 利胆药

B: 抗利尿药

C: 苦味健胃药

D: 舌下片（丸）

答案：C

43. 药物警戒对用药安全具有重要作用。下列确认的用药不良事件中，属于发现药品使用环节问题的是

A: “阿糖胞苷儿科事件”

B: “拜斯亭(西立伐他汀)事件”

C: “亮菌甲素事件”

D: “万络(罗非昔布)事件”

答案：A

44. 下列说法错误的

A: 空腹服用抗蠕虫药可增强疗效

B: 抗蠕虫药对妊娠及哺乳期妇女不宜应用

C: 急性化脓性或弥漫性皮炎禁用抗蠕虫药

D: 噻嘧啶与枸橼酸哌嗪合用可增强疗效

答案：D

45. 肾脏功能主要是分泌和排泄尿液、废物、毒物和药物，调节和维持体液容量和成分，维持机体内环境（血压、内分泌）的平衡。变态反应、感染、肾血管病变、代谢异常、先天性疾病、全身循环和代谢性疾病、药物、毒素对肾脏的损害，均可影响肾功能。

A: $18\sim 35\ \mu\text{mol/L}$

B: $53\sim 97\ \mu\text{mol/L}$

C: $45\sim 84\ \mu\text{mol/L}$

D: $18\sim 62\ \mu\text{mol/L}$

答案：A

46. 血红蛋白(HGB)正常参考区间是

A: $180\sim 220\text{g/L}$

B: $(4.0\sim 10.0)\times 10$

C: $(15.0\sim 20.0)\times$

D: $170\sim 200\text{g/L}$

答案：D

47. 1g 葡萄糖可提供机体的能量是

A: 2kcal

B: 3kcal

C: 1kcal

D: 4kcal

答案：D

48. 不属于常用缓泻药的作用机制的是

A: 润湿性

B: 润滑性

C: 膨胀性

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

D: 容积性

答案：A

49. 躯干部出现鞭打状色素沉着的是

- A: 白消安
- B: 氟尿嘧啶
- C: 博来霉素
- D: 柔红霉素

答案：C

50. 从事驾车、高空作业的患者不宜服用的药物是()

- A: 伪麻黄碱
- B: 布洛芬
- C: 氯苯那敏
- D: 对乙酰氨基酚

答案：C

51. 仅用于解热、镇痛的非处方药是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 西咪替丁
- C: 氢化可的松
- D: 布洛芬

答案：A

52. 春季卡他性结膜炎严重者可选用

- A: 硫酸锌滴眼液
- B: 杆菌肽眼膏
- C: 1%泼尼松龙滴眼液
- D: 碘苷滴眼液

答案：C

53. 应用抗生素头孢哌酮时宜

- A: 不饮酒
- B: 少食盐
- C: 少食醋
- D: 不吸烟

答案：A

54. 患者，男，32 岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒。立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再给予阿莫西林胶囊治疗。该 ADR 的因果关系评价结果是

- A: 可能无关
- B: 很可能
- C: 可能
- D: 肯定

答案：B

55. 患者，男，69 岁，因高血压长期服用抗高血压药，近日患者出现足踝部水肿引起此不良反应的药物是()

- A: 卡托普利
- B: 普萘洛尔
- C: 多沙唑嗪
- D: 非洛地平

答案：D

56. 非甾体抗炎药的典型不良反应是

- A: 肝毒性
- B: 胃肠道刺激出血

C: 血液系统毒性

D: 肾毒性

答案: B

57. 以保证正常起居（避免夜尿）的是

A: 利尿药

B: 氨基糖苷类

C: 阿苯达唑

D: 抗忧郁药

答案: A

58. 氰化氢中毒呈现

A: 呼出气体中可有苦杏仁气味

B: 出血、凝血时间延长

C: 抽搐、进行性加重

D: 恶心、呕吐、口内有金属味

答案: A

59. 在中国，具有"规范处方行为和指导合理用药的法规性和专业性文件"属性的药物专著是

A: 中国国家处方集

B: 中国药学文摘

C: 新编药物学

D: 国家基本药物处方集

答案: A

60. 下列药物中，一般不会呈现肝毒性的药物是

A: 青霉素类

B: 异烟肼

C: 水杨酸

D: 氯丙嗪

答案: A

61. 医疗机构制剂申请要求临床研究受试例数不得少于

A: 20 例

B: 80 例

C: 40 例

D: 60 例

答案: D

62. 属于肾上腺素能 α 受体阻断剂，可改善尿道梗阻症状的药品

A: 阿夫唑嗪

B: 非那雄胺

C: 黄酮哌酯

D: 氟他胺

答案: A

63. (2017 年真题) 有较强刺激性服药时不可嚼碎的泻药是 ()

A: 硫酸镁

B: 干酵母

C: 比沙可啶

D: 双歧杆菌

答案: C

64. 清晨尿液酸碱度的参考范围为

A: pH4.5~5.5

B: pH5.5~6.5

C: pH4.5~8.0

D: pH4.5~6.5

答案：B

65. 服用氨基糖苷类药时应该禁用的是

A: 食醋

B: 脂肪

C: 酒

D: 食盐

答案：A

66. 主要不良反应为锥体外系反应的是

A: 西沙必利

B: 莫沙必利

C: 甲氧氯普胺

D: 多潘立酮

答案：C

67. 痛风急性发作期应禁用的药物是

A: 布洛芬

B: 秋水仙碱

C: 别嘌醇

D: 碳酸氢钠

答案：C

68. (2019 年真题) 患者，男，25 岁，有癫痫病史 2 年，一直服用丙戊酸钠和左乙拉西坦，癫痫控制良好，近期因社区获得性肺炎入院。

下列药物中最可能影响患者基础疾病控制的是

- A: 头孢曲松
- B: 阿奇霉素
- C: 莫西沙星
- D: 阿莫西林

答案：C

69. 下列关于烫伤救治措施的说法，正确的是

- A: 可用清洁塑料薄膜覆盖创面，以防创面感染
- B: 创面及时外涂甲紫溶液预防感染
- C: I 度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏
- D: 烫伤患者的镇痛、镇静药物首选氯丙嗪

答案：C

70. 患者，男，56 岁。因肾功能不全行肾移植术。可引起移植肾发生慢性排斥反应的危险因素不包括

- A: 感染
- B: 组织相容性差
- C: 高血脂
- D: 糖尿病

答案：D

71. 胰岛素制剂适宜

- A: 置阴凉干燥、阳光不易直射到的地方的药品
- B: 与其他药品分库贮存的药品
- C: 干燥、压缩成包贮存的药品

D: 不宜冷冻的药品

答案：D

72. 患者，男，53 岁。因心前区疼痛 6 年，加重伴呼吸困难 10 小时入院。入院前 6 年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续 3~5min，休息后减轻。入院检查：体温 37.8℃，心率 130 次/分，血压 80/40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

A: 无症状型心肌缺血型

B: 稳定型心绞痛

C: 非 ST 段抬高型心肌梗死

D: 冠状动脉粥样硬化型心脏病

答案：C

73. 服用药物对粪外观的影响，保泰松

A: 黄色

B: 变红或黑色

C: 红至黑色

D: 橘红至红色

答案：B

74. 患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗，服用 4 小时后，面部出现皮疹，无其他不适，停药后皮疹消失，排除其他疾病的可能。该病例用药与不良反应的因果关系评价结果是

A: 肯定

B: 可能无关

C: 很可能

D: 可能

答案：C

75. 双侧肾动脉狭窄抗高血压药物的禁忌证

- A: 美托洛尔
- B: 维拉帕米
- C: 依那普利
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

76. 具有末梢神经炎毒性，必要时需补充 B 族维生素和神经营养剂的药物是

- A: 环磷酰胺
- B: 甲氨蝶呤
- C: 阿糖胞苷
- D: 长春新碱

答案：D

77. 配制 10%葡萄糖注射液 500ml，现用 50%和 50A 两种浓度葡萄糖注射液混合配制，分别需要

- A: 72ml 和 428ml
- B: 56ml 和 444ml
- C: 85ml 和 415ml
- D: 94ml 和 406ml

答案：B

78. 发现严重滥用药品的处方，应该

- A: 拒绝调配处方，依照有关规定报告
- B: 调配处方并发药

C: 拒绝调配处方

D: 依照处方调配药品

答案: A

79. 患者，男，57 岁，查体：心率 54 次/分，既往患有痛风。近期体检发现高血压，未服药时血压维持在 150 / 95mmHg 左右，建议服药控压，适宜该患者的降压药是

A: 哌唑嗪

B: 氢氯噻嗪

C: 美托洛尔

D: 氯沙坦

答案: D

80. 临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

A: 呋喃唑酮

B: 克林霉素

C: 依替米星

D: 庆大霉素

答案: A

81. (2019 年真题) 儿童退热的用药选择和单次用量，正确的是

A: 对乙酰氨基酚 25~50mg/kg

B: 阿司匹林 30~60mg/kg

C: 布洛芬 0.4-0.6g (12 岁以上儿童)

D: 对乙酰氨基酚 10~15mg/kg

答案: D

82. 其含量用生育酚当量表示的是

A: 维生素 E

B: 维生素 A

C: 维生素 D

D: 维生素 B

答案: A

83. 夏季用前宜在冰箱冷藏室放置 15 分钟的剂型是 ()

A: 滴眼剂

B: 软膏剂

C: 直肠栓剂

D: 含漱剂

答案: C

84. (2019 年真题) 夏季用前宜在冰箱冷藏室放置 15 分钟的剂型是

A: 直肠栓剂

B: 软膏剂

C: 含漱剂

D: 滴眼剂

答案: A

85. 依据生物钟规律, 适宜清晨服药的是

A: 抗忧郁药

B: 平喘药

C: 抗过敏药

D: 调节血脂药

答案：A

86. 以下药物中，肝病患者应该慎用的是

A: 谷氨酸

B: 甘草酸二铵

C: 氯丙嗪

D: 泛酸钙

答案：C

87. 对痛风急性发作者不宜服用，以防发生转移性痛风的是

A: 秋水仙碱

B: 泼尼松

C: 别嘌醇

D: 苯溴马隆

答案：D

88. 患者，男，48 岁，患有青光眼 3 年。今日因支气管哮喘急性发作，给予舒张支气管、抗炎等治疗，应告知该患者用药后需漱口的药物是
()

A: 多索茶碱注射液

B: 孟鲁斯特纳咀嚼片

C: 沙丁胺醇气雾剂

D: 布地奈德混悬液

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

89. 在妊娠期可致颅骨和面部畸形、腭裂的药是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/716235213054011030>