

主管护师-护理学（中级）专业知识综合模考卷 4

单选题（共 100 题，共 100 分）

(1.) 婴儿期预防接种疫苗正确的是

- A. 24 小时内接种卡介苗
- B. 1 个月首次接种乙肝疫苗
- C. 3（江南博哥）个月首次口服脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸
- D. 2 个月接种麻疹减毒活疫苗
- E. 3 个月首次接种百白破混合制剂

正确答案： E

参考解析：接种百白破联合制剂的时间分 3 次，第一次为 3 个月；生后 2~3 天接种卡介苗；生后 24 小时内首次接种乙肝疫苗；首次口服脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸为 2 个月。

(2.) 胎儿可以从母体通过胎盘获得的免疫球蛋白是

- A. IgA
- B. SIgA
- C. IgM
- D. IgG
- E. IgE

正确答案： D

参考解析：IgG 是唯一能通过胎盘进入胎儿体内的免疫球蛋白。

(3.) 下列符合口服补液的适应证为

- A. 休克
- B. 轻度脱水，无呕吐者
- C. 肾功能不全
- D. 心功能不全
- E. 明显腹胀

正确答案： B

参考解析：轻、中度脱水，呕吐不明显者可口服补液。

(4.) 下列符合川崎病皮疹特点的是

- A. 呈对称性
- B. 荨麻疹样皮疹
- C. 可有水疱
- D. 以环形红斑多见
- E. 呈离心性

正确答案： B

参考解析：在发热时或发热后不久可出现皮疹，呈向心性，最常见为遍布全身的荨麻疹样皮疹，其次为深红麻疹、斑丘疹，无水疱或结痂。

(5.) 小儿 6 个月，已添加蛋黄、米糊，母亲打电话到儿科门诊咨询，此时应指导家长给小儿添加的辅食是

- A. 菜汤
- B. 饼干
- C. 肉末
- D. 面包
- E. 水果泥

正确答案： E

参考解析：4~6 个月小儿添加米汤、米糊、稀粥、蛋黄、豆腐、动物血、菜泥、鱼泥、水果泥等。

(6.) 下列母子血型关系最可能发生新生儿溶血症的是

- A. 母 A 子 O
- B. 母 B 子 O
- C. 母 AB 子 A
- D. 母 AB 子 B
- E. 母 O 子 B

正确答案： E

参考解析：ABO 血型不合引起的新生儿溶血症，母亲多为 O 型，新生儿为 A 型或 B 型多见，母亲为 AB 型或婴儿为 O 型均不发生。

(7.) 营养性巨幼细胞贫血出现震颤的护理措施有

- A. 预防感染
- B. 防止心力衰竭
- C. 提倡母乳喂养
- D. 绝对卧床休息
- E. 防止患儿受伤

正确答案： E

参考解析：营养性巨幼细胞贫血患儿出现震颤者，可在上、下牙之间垫缠有纱布的压舌板或牙垫，防止咬伤舌头；烦躁、震颤严重甚至抽搐者，可按医嘱给予镇静剂。

(8.) 水痘临床症状为

- A. 水痘为自限性，一般 7 日左右自愈
- B. 帕氏线
- C. 疹退留有色素沉着
- D. 皮疹连续分批出现，同一部位可见不同性状皮疹
- E. 潜伏期为 1~12 天

正确答案： D

参考解析：水痘皮疹按红斑、丘疹、疱疹、结痂的顺序演变。连续分批出现，同一部位可见不同性状皮疹。

(9.) 患儿，3 岁。护士量血压收缩压为 90mmHg，他的血压是

- A. 高血压
- B. 临界状态
- C. 正常血压
- D. 低血压
- E. 测量错误

正确答案： C

参考解析：新生儿收缩压 60~70mmHg；1 岁 70~80mmHg；2 岁后收缩压可按公式计算，收缩压(mmHg)=年龄×2+80mmHg。高于或低于此标准 20mmHg 为异常。

(10.) 急性呼吸衰竭

- A. 端坐呼吸
- B. 肝-颈静脉回流征阳性
- C. 皮肤潮红、视乳头水肿、呼吸性酸中毒
- D. 突然出现呼吸停止，眼球固定、双瞳孔缩小后扩大
- E. 性格变化、反应迟钝

正确答案： C

参考解析：呼吸衰竭时由于机体缺氧，二氧化碳潴留，故临床上可出现相应的呼吸系统、低氧血症及高碳酸血症的表现。颅内压升高，严重时迫使脑组织嵌入孔隙，形成脑疝，导致中枢性呼吸衰竭，危及生命。其中，小脑扁桃体疝入枕骨大孔内，形成枕骨大孔疝而出现瞳孔、意识、呼吸的改变。而左心衰主要表现为肺循环淤血。

(11.) 脑疝

- A. 端坐呼吸
- B. 肝-颈静脉回流征阳性
- C. 皮肤潮红、视乳头水肿、呼吸性酸中毒
- D. 突然出现呼吸停止，眼球固定、双瞳孔缩小后扩大
- E. 性格变化、反应迟钝

正确答案： D

参考解析：呼吸衰竭时由于机体缺氧，二氧化碳潴留，故临床上可出现相应的呼吸系统、低氧血症及高碳酸血症的表现。颅内压升高，严重时迫使脑组织嵌入孔隙，形成脑疝，导致中枢性呼吸衰竭，危及生命。其中，小脑扁桃体疝入枕骨大孔内，形成枕骨大孔疝而出现瞳孔、意识、呼吸的改变。而左心衰主要表现为肺循环淤血。

(12.) 月经规律的妇女常用推算预产期的方法是

- A. 初觉胎动的时间
- B. 自末次月经开始之日
- C. 自末次月经干净之日
- D. 早孕反应的开始时间
- E. 孕早期妇科检查时子宫大小

正确答案： B

参考解析：计算方法为，末次月经第一天起，月份减 3 或加 9，日期加 7。

(13.) 确定早孕最可靠的辅助诊断方法是

- A. 妊娠免疫试验
- B. 妇科检查
- C. B 超检查
- D. 阴道脱落细胞学检查
- E. 测定尿中孕二酮值

正确答案： C

参考解析：B 超检查是早期妊娠快速准确的方法，B 超可见增大的子宫轮廓，有圆形妊娠环，用超声多普勒仪能听到有节律，单一高调的胎心音。

(14.) 妊娠晚期出血的处理，下列不正确的是

- A. 前置胎盘应禁止做肛查
- B. 中央性前置胎盘胎儿已死，尽可能阴道分娩
- C. 子宫胎盘卒中，必要时切除子宫
- D. 妊娠合并宫颈癌，可行剖宫产
- E. 妊娠合并子宫颈息肉，可阴道分娩

正确答案： B

参考解析：中央性前置胎盘不适合阴道分娩，只能剖宫产。

(15.) 关于急性输卵管妊娠破裂时的体征，下列不正确的是

- A. 下腹明显压痛和反跳痛
- B. 子宫稍大、软
- C. 宫颈举痛，子宫漂浮感
- D. 移动性浊音(+)
- E. 附件包块形成边界清楚质硬

正确答案： E

参考解析：急性输卵管妊娠破裂时的体征为下腹明显压痛和反跳痛，叩诊移动性浊音(+)，出血时间长，在下腹可触及软性包块，盆腔检查子宫较大略软，有宫颈举痛或摇摆痛。

(16.) 未婚女青年滴虫阴道炎首选的治疗是

- A. 阴道内塞入乙酰肿胺
- B. 阴道内塞入甲硝唑
- C. 阴道内塞入咪康唑
- D. 口服甲硝唑片
- E. 口服曲古霉素

正确答案： D

参考解析：未婚妇女一般禁阴道内用药，该病的全身治疗是口服甲硝唑片。

(17.) 适宜碱性溶液冲洗阴道的患者是

- A. 外阴阴道假丝酵母菌病
- B. 滴虫阴道炎
- C. 老年性阴道炎
- D. 前庭大腺炎
- E. 慢性宫颈炎

正确答案： A

参考解析：外阴阴道假丝酵母菌病阴道灌洗采用 2%~4%碳酸氢钠溶液。

(18.)关于急性盆腔炎，下列处理不正确的是

- A. 立即手术治疗
- B. 半卧位休息
- C. 补液及纠正电解质失衡
- D. 静脉滴注广谱抗生素
- E. 高热量、高蛋白、高维生素流质饮食

正确答案： A

参考解析：急性盆腔炎主要治疗手段是抗生素治疗，当药物治疗无效，患者中毒症状加重可手术治疗以免脓肿破裂。

(19.)具有恶变倾向的葡萄胎患者不包括的是

- A. 年龄大于 40 岁
- B. 葡萄胎排出前 hCG 值异常升高
- C. 子宫明显大于停经月份
- D. 卵巢黄素化囊肿大于 5cm
- E. 无条件随访者

正确答案： D

参考解析：具有恶变倾向的葡萄胎患者包括：年龄大于 40 岁，葡萄胎排出前 hCG 值异常升高，子宫明显大于停经月份卵巢黄素化囊肿大于 6cm，无条件随访者。

(20.)正常情况下，葡萄胎清除后 hCG 降至正常范围的时间是

- A. 6~7 周
- B. 7~8 周
- C. 8~12 周
- D. 12~13 周
- E. 13~14 周

正确答案： C

参考解析：正常情况下，葡萄胎清除后 hCG 降至正常范围的时间是 8~12 周，如：hCG 持续高水平，或 hCG 曾一度降至正常水平又迅速升高，即考虑发生恶性滋养细胞肿瘤。

(21.)滴虫阴道炎的治愈标准是

- A. 连续 3 次月经后检查滴虫阴性

- B. 连续 3 次月经前检查未找到滴虫
- C. 全身及局部用药 3 个疗程可治愈
- D. 白带悬滴法检查滴虫转阴性
- E. 连续 3 次月经前检查临床症状消失

正确答案： A

参考解析：滴虫阴道炎治疗后应在每次月经干净后复查 1 次，连续 3 个月经周期均是阴性称治愈。

(22.) 护理措施的内容包括

- A. 执行医嘱，缓解症状，促进舒适的护理措施
- B. 预防、减轻和消除病变反应的措施
- C. 用药指导
- D. 健康教育
- E. 以上均正确

正确答案： E

参考解析：护理措施是指护士为帮助病人达到预定目标所采取的具体护理活动。包括执行医嘱、缓解症状、促进舒适的护理措施，预防、减轻和消除病变反应的措施；用药指导和健康教育等。

(23.) 患者女，25 岁。停经 45 天，阴道少量流血 2 天，伴下腹部轻度酸痛，尿妊娠试验(+) 妇科检查：宫口闭，子宫 6 周妊娠大小，考虑哪项诊断

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产
- D. 完全流产
- E. 稽留流产

正确答案： A

参考解析：1. 该病例子宫大小符合孕周、阴道少量出血，宫口未开，符合先兆流产的临床表现。

2. 患者子宫小于正常月份，有胚胎组织排出，阴道出血多，符合不全流产的临床表现。

3. 患者胚胎组织排出，阴道出血不多宫口闭，并且妊娠试验(-)，符合完全流产的临床表现。

4. 该病例子宫缩小，曾有阴道出血，现尿妊娠试验(-)，证明胎儿已死亡，为稽留流产。

(24.) 患者女，28 岁。停经 3 个月，出现腹痛并有妊娠组织排出，阴道出血量较多，查体子宫较正常月份小，宫口开。应诊断为

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产

- D. 完全流产
- E. 稽留流产

正确答案： C

参考解析：1. 该病例子宫大小符合孕周、阴道少量出血，宫口未开，符合先兆流产的临床表现。

2. 患者子宫小于正常月份，有胚胎组织排出，阴道出血多，符合不全流产的临床表现。

3. 患者胚胎组织排出，阴道出血不多宫口闭，并且妊娠试验(-)，符合完全流产的临床表现。

4. 该病例子宫缩小，曾有阴道出血，现尿妊娠试验(-)，证明胎儿已死亡，为稽留流产。

(25.)患者女，30岁。停经4个月，曾有阴道流血史，现尿妊娠试验(-)。妇科检查：子宫孕8周大小。应诊断为

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产
- D. 完全流产
- E. 稽留流产

正确答案： E

参考解析：1. 该病例子宫大小符合孕周、阴道少量出血，宫口未开，符合先兆流产的临床表现。

2. 患者子宫小于正常月份，有胚胎组织排出，阴道出血多，符合不全流产的临床表现。

3. 患者胚胎组织排出，阴道出血不多宫口闭，并且妊娠试验(-)，符合完全流产的临床表现。

4. 该病例子宫缩小，曾有阴道出血，现尿妊娠试验(-)，证明胎儿已死亡，为稽留流产。

(26.)患者女，孕龄期妇女，停经40天余，腹痛后有妊娠组织排出，现出血不多，查体宫口闭，妊娠试验(-)。应诊断为

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产
- D. 完全流产
- E. 稽留流产

正确答案： D

参考解析：1. 该病例子宫大小符合孕周、阴道少量出血，宫口未开，符合先兆流产的临床表现。

2. 患者子宫小于正常月份，有胚胎组织排出，阴道出血多，符合不全流产的临床表现。
3. 患者胚胎组织排出，阴道出血不多宫口闭，并且妊娠试验(-)，符合完全流产的临床表现。
4. 该病例子宫缩小，曾有阴道出血，现尿妊娠试验(-)，证明胎儿已死亡，为稽留流产。

(27.) 采集标本的正确方法是

- A. 若患者正在输液，为了避免再次穿刺可直接从输液针头抽血
- B. 若患者血管暴露不明显，可尽可能地延长止血带压迫时间，直至血管暴起
- C. 为了便于抽血，止血带尽可能绑紧
- D. 若采血比较费力，可用手挤压局部组织迫使血液流出
- E. 抽得血液后，应先将针头卸掉，再将血液沿试管壁徐徐注入试管内

正确答案： E

参考解析：采集标本不能从输液针头或输液的同一血管抽血，否则所测结果极不准确。应尽量缩短止血带压迫血管的时间，压迫时间过长，可以使局部静脉扩张、淤血，血液中的某些成分的含量会有所变化。避免人为溶血，办法为：注射器及针头应洁净干燥，止血带不要束缚太紧，针刺时不能使局部组织损伤过多，不能用手挤压局部组织迫使血液流出。抽得血液后，应先将针头卸掉，再将血液沿试管壁徐徐注入试管内，以免用力挤压出或冲击致使红细胞破坏而溶血。

(28.) 下列对盲目自信、产生自恃心理的患者的护理措施中正确的是

- A. 回避患者对自己病情的询问
- B. 应加强健康教育
- C. 要加强心理卫生指导
- D. 酌情给予镇静剂
- E. 直言不讳指出患者存在的问题

正确答案： B

参考解析：对盲目自信、产生自恃心理的患者，应加强健康教育，提高患者对疾病的正确认识，发挥患者对诊疗护理的主观积极性。

(29.) 关于支气管扩张咳嗽、咳痰的特点描述错误的是

- A. 与体位无关
- B. 咳大量脓痰
- C. 痰液静置后有分层现象
- D. 常在晨起或夜间卧床时加重
- E. 痰量每日可达数百毫升

正确答案： A

参考解析：本题考核了支气管扩张咳嗽、咳痰的特点，其与体位有关，常在晨起或夜间卧床时加重，痰量每日可达数百毫升，痰液静置后可分为三层。

(30.) 三(四)腔管的正确护理措施

- A. 放置期间不得轻易放气以防滑出
- B. 定期抽吸胃管
- C. 出血停止后应立即拔管，以防黏膜受损
- D. 放置期间，无需定时测定囊内压力，以防窒息
- E. 间断应用气囊压迫一般以 4~5 天为限

正确答案： B

参考解析：本题考查学生对三(四)腔管护理的掌握。

(31.) 消化性溃疡合并幽门梗阻最具诊断价值的临床表现是

- A. 上腹饱胀
- B. 营养不良
- C. 呕吐量大
- D. 频繁呕吐宿食
- E. 呕吐物内有胆汁

正确答案： D

参考解析：幽门梗阻时胃排空延迟，患者可感上腹饱胀疼痛，于餐后加重、且有反复、大量呕吐。呕吐物为酸臭味宿食。

(32.) 对系统性红斑狼疮患者做健康指导时，下列不正确的指导是

- A. 要注意劳逸结合，适当锻炼
- B. 嘱患者遵医嘱服药
- C. 嘱患者避免日晒
- D. 及早发现和治疗感染
- E. 育龄妇女可口服避孕药避孕，防止疾病恶化

正确答案： E

参考解析：因避孕药含雌、孕激素，而性激素可能会诱发系统性红斑狼疮，所以 E 选项是不正确的。

(33.) 有机磷中毒毒蕈碱样症状，严重者出现

- A. 肌纤维颤动
- B. 共济失调
- C. 肺水肿
- D. 呼吸肌麻痹
- E. 抽搐和昏迷

正确答案： C

参考解析：有机磷中毒毒蕈碱样症状主要是副交感神经末梢兴奋所致，表现为平滑肌痉挛和腺体分泌增加，恶心呕吐，腹痛，多汗，流涎，心跳减慢，瞳孔缩小等，严重患者出现肺水肿。

(34.) 急性中毒患者洗胃的原则是

- A. 快进慢出
- B. 先出后入

- C. 密切观察
- D. 出多入少
- E. 对症处理

正确答案： B

参考解析：急性中毒患者洗胃原则是先出后入，快进快出，出入基本平衡。

(35.)热射病“三联症”是指

- A. 高热、无汗、意识障碍
- B. 高热、烦躁、嗜睡
- C. 高热、灼热、无汗
- D. 高热、疲乏、眩晕
- E. 高热、多汗、心动过速

正确答案： A

参考解析：热射病又称中暑高热，是致命性急症，以高热、无汗、意识障碍“三联症”为典型表现，直肠温度可超过 41℃，甚至高达 43℃，皮肤干燥，灼热而无汗，可有严重的神经系统症状，如意识障碍，嗜睡甚至昏迷，可发生于任何年龄的人，但以老年人或有心血管疾病的人较多见。

(36.)中毒患者皮肤黏膜表现为“樱桃红色”，提示

- A. 有机磷中毒
- B. 一氧化碳中毒
- C. 阿托品中毒
- D. 氰化物中毒
- E. 酒精中毒

正确答案： B

参考解析：中毒患者皮肤黏膜呈“樱桃红色”，是急性一氧化碳中毒典型的临床特征，血 COHb 浓度为 30%~40%，若能及时抢救，经吸氧治疗后可恢复正常且无明显并发症。

(37.)二尖瓣型 P 波见于

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 二尖瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 三尖瓣狭窄

正确答案： A

参考解析：1. 二尖瓣狭窄心电图可有二尖瓣型 P 波，P 波宽度>0.12 秒，伴有切迹。

2. 主动脉瓣关闭不全的临床表现有血压收缩压升高，舒张压降低，脉压增大产生周围血管征。

(38.)脉压增大见于

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 二尖瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 三尖瓣狭窄

正确答案： D

参考解析：1. 二尖瓣狭窄心电图可有二尖瓣型 P 波，P 波宽度 >0.12 秒，伴有切迹。

2. 主动脉瓣关闭不全的临床表现有血压收缩压升高，舒张压降低，脉压增大产生周围血管征。

(39.) 急性胆管炎、胆管结石的典型症状是

- A. 腹痛、高热、胆囊肿大
- B. 腹痛、高热、寒战
- C. 高热、寒战、黄疸
- D. 胆囊肿大、寒战、黄疸
- E. 腹痛、寒战高热、黄疸

正确答案： E

参考解析：胆管结石急性发作和急性胆管炎典型三联症是“腹痛、寒战高热、黄疸”，亦称之为“Charcot 三联症”。在此基础上加上“休克和神经症状”即是急性梗阻化脓性胆管炎(急性重症胆管炎)五联症。因此答案为 E。

(40.) 出血坏死性胰腺炎最常见的并发症是

- A. 化脓性腹膜炎
- B. 慢性胰腺炎
- C. 消化道出血
- D. 胰腺假性囊肿
- E. 休克

正确答案： E

参考解析：出血坏死性胰腺炎可继发多种并发症。最常见的是休克，由于胰酶、组织坏死、感染中毒等促使大量血管活性物质释放，加之体液丢失和 DIC 等因素所致。

(41.) 细菌性肝脓肿最常见的早期症状是

- A. 恶心、呕吐
- B. 肝区疼痛
- C. 肝大
- D. 寒战、高热
- E. 黄疸

正确答案： D

参考解析：

细菌性肝脓肿是肝内化脓性感染，全身脓毒血症症状明显，寒战、高热是最常见的早期症状，多为弛张热。

(42.) T形引流管的描述正确的是

- A. 支撑胆道避免胆总管切口瘢痕狭窄
- B. 引流渗血、渗液
- C. 防止积血、积液压迫手术部位
- D. 防止腹胀
- E. 可使胆管扩张

正确答案： A

参考解析：胆总管探查或切开取石术后，在胆总管切开处放置 T 形引流管，可引流胆汁及残余结石，同时支撑胆道避免胆总管切口瘢痕狭窄，管腔变小、粘连狭窄等。

(43.) 骨牵引时牵引针孔处应

- A. 纱布覆盖
- B. 滴 75%酒精 2 次/日
- C. 滴 2%碘酊 2 次/日
- D. 滴 70%酒精每 4 小时一次
- E. 滴 2%碘酊每 4 小时一次

正确答案： B

参考解析：为防止牵引针孔处感染，需要保持牵引针孔周围皮肤清洁，防止牵引针左右滑动，每日在针孔处滴 75%酒精 2 次，无菌敷料覆盖。如针孔处感染及时处理，必要时拔针换位牵引。

(44.) 关于高渗性缺水，下列不正确的是

- A. 中度缺水的缺水量为体重的 4%~6%
- B. 血清钠为 150mmol/L 以上
- C. 患者通常无口渴
- D. 治疗给予 5%葡萄糖溶液或低渗盐水
- E. 纠正缺水时，还需适当补钠

正确答案： C

参考解析：低渗性缺水因渗透压不高，患者无口渴，而高渗性缺水患者会出现突出的口渴症状。

(45.) 肠外营养穿刺置管时最容易引起的并发症是

- A. 气胸、血胸
- B. 血栓性静脉炎
- C. 肠源性感染
- D. 非酮性高渗性高血糖性昏迷
- E. 空气栓塞

正确答案： A

参考解析：

肠外营养穿刺置管时最容易引起的是损伤性并发症即气胸、血胸，其他并发症都是在输注过程中发生的，如在输注过程中易引起代谢并发症即肠源性感染、非酮性高渗性高血糖性昏迷，由于营养液浓度高从周围静脉输注时易发生血栓性静脉炎、输注系统不严密或未排净空气易发生空气栓塞。

(46.) 休克早期的临床表现不正确的是

- A. 烦躁不安
- B. 脉搏细数
- C. 血压明显下降
- D. 面色苍白出冷汗
- E. 少尿

正确答案： C

参考解析：休克早期由于机体的代偿作用，交感-肾上腺轴兴奋，大量儿茶酚胺释放、肾素、血管紧张素分泌增加等，故血压可升高。

(47.) 关于门静脉高压症术前护理不正确的是

- A. 术前肝功能受损严重应限制蛋白质摄入
- B. 避免腹内压增高
- C. 避免干硬和刺激性食物
- D. 术前一日晚肥皂水清洁灌肠
- E. 口服药片应研成粉末冲服

正确答案： D

参考解析：术前一日晚清洁灌肠禁用肥皂水，因为肥皂水是碱性溶液，促使氨在肠道内的生成，而使血氨增高，导致肝性脑病的发生。

(48.) 食管癌中晚期的典型症状为

- A. 哽噎感
- B. 胸骨后烧灼感
- C. 进行性的吞咽困难
- D. 消瘦、贫血
- E. 营养不良、恶病质

正确答案： C

参考解析：食管癌早期有哽噎感、胸骨后烧灼感；中晚期表现为进行性的吞咽困难，先是难咽干硬食物，继而只能进半流食、流食，最后滴水难进。患者逐渐出现消瘦、贫血、营养不良、恶病质。

(49.) 为了保持心包纵隔引流管的通畅，患者生命体征平稳后可采取

- A. 平卧位
- B. 健侧卧位
- C. 患侧卧位
- D. 半坐卧位
- E. 头低足高位

正确答案： D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/717050035021010056>