

2024 湖南省桂阳县《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题真题（全优）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于芳基乙酸类的是

- A: 塞来昔布
- B: 阿司匹林
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 吲哚美辛

答案：D

2. 需停 5 周才能换用单胺氧化酶抑制剂的药物是

- A: 吗氯贝胺
- B: 吡拉西坦
- C: 氟西汀
- D: 文拉法辛

答案：C

3. （2018 年真题）可导致视神经炎和血尿酸升高的药物是（）

- A: 吡嗪酰胺
- B: 利福平
- C: 对氨基水杨酸
- D: 乙胺丁醇

答案：D

4. 可作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌和肠杆菌作用的药物是

- A: 阿莫西林
- B: 氨基糖
- C: 克拉维酸
- D: 亚胺培南

答案：B

5. 抑制胃酸分泌作用最强的药物是

- A: 西咪替丁
- B: 尼扎替丁
- C: 奥美拉唑
- D: 雷尼替丁

答案：C

6. 下列可引起糖尿病患者血糖过低，而对非糖尿病患者无降血糖作用的抗心律失常药物是

- A: 胺碘酮
- B: 普萘洛尔
- C: 美西律
- D: 地尔硫革

答案：B

7. 促进尿酸排泄的抗痛风代表药物是

- A: 别嘌醇
- B: 塞来昔布
- C: 丙磺舒
- D: 扑热息痛

答案：C

8. 对短动作电位时程的心房肌无效，仅用于室性心律失常的是()

- A: 普萘洛尔
- B: 奎尼丁
- C: 利卡多因
- D: 维拉帕米

答案：C

9. 散瞳和调节睫状肌麻痹宜选用

- A: 碘苷滴眼液
- B: 毛果芸香碱滴眼液
- C: 复方托吡卡胺滴眼液
- D: 左氧氟沙星滴眼液

答案：C

10. 以下患者中可以使用血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)的是()

- A: 高血压患者和心力衰竭患者
- B: 孕妇
- C: 双侧肾动脉狭窄患者
- D: 高钾血症患者

答案：A

11. 通过抑制碳酸酐酶发挥利尿作用的药物是

- A: 呋达帕胺
- B: 乙酰唑胺
- C: 托拉塞米
- D: 氢氯噻嗪

答案：B

12. 不宜与三环类抗抑郁药合用的是()

- A: 麻黄碱
- B: 赛洛唑啉
- C: 羟甲唑啉
- D: 酚甘油滴耳液

答案：A

13. 止泻药()

- A: 甘油
- B: 地芬诺酯
- C: 乳果糖
- D: 硫酸镁

答案：B

14. 预防急性肾功能衰竭可选用

- A: 氢氯噻嗪
- B: 乙酰唑胺
- C: 螺内酯
- D: 呋塞米

答案：D

15. 用药时需关注肺毒性的药物是

- A: 柔红霉素
- B: 紫杉醇
- C: 长春新碱
- D: 博来霉素

答案：D

16. 可明显降低血浆甘油三酯的药物是()

- A: 贝特类
- B: 抗氧化剂
- C: 胆汁酸螯合剂
- D: 苯氧酸类

答案：A

17. (2018 年真题) 具有长效、平稳、血药浓度无峰值特点的胰岛素/胰岛素类似物是()

- A: 甘精胰岛素注射液
- B: 普通胰岛素注射液
- C: 精蛋白锌胰岛素注射液
- D: 预混胰岛素注射液

答案：A

18. 头孢唑林()

- A: 肾毒性较大
- B: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注
- C: 用于非典型致病原感染
- D: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于脑膜炎

答案：A

19. (2021 年真题) 兼有抑菌作用的鼻用减充血剂是()

- A: 羟甲唑啉鼻喷剂
- B: 呋麻滴鼻液
- C: 赛洛唑啉滴鼻液

D: 麻黄碱滴鼻液

答案: B

20. 可引起血压下降、缩瞳、欣快感的受体是

A: K 受体

B: $\mu 2$ 受体

C: $\mu 1$ 受体

D: δ 受体

答案: D

21. 抗酸作用较强、较慢，有导泻作用的是

A: 氢氧化铝

B: 碳酸钙

C: 氢氧化镁

D: 三硅酸镁

答案: C

22. (2020 年真题) 为避免继发真菌感染，使用后应立即漱口的药物是

A: 孟鲁司特片

B: 布地奈德福莫特罗吸入剂

C: 沙丁胺醇气雾剂

D: 羧甲司坦口服液

答案: B

23. 利尿作用最强，特别当急、慢性肾衰竭(肌酐清除率 $<30\text{ml/min}$)时
可作为首选治疗的利尿药为()

A: 碳酸酐酶抑制剂

B: 噻嗪类利尿药

C: 袪利尿药

D: 留钾利尿药

答案: C

24. 在抗血小板药中，阿司匹林属于()。

A: 磷酸二酯酶抑制剂

B: 环氧酶抑制剂

C: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂

D: 整合素受体阻断剂

答案: B

25. 下列不属于中效利尿药的是

A: 呋噻帕胺

B: 氨苯蝶啶

C: 氢氯噻嗪

D: 氢氟噻嗪

答案: B

26. 控制哮喘急性发作的首选药是

A: M 胆碱受体阻断剂

B: 白三烯受体阻断剂

C: 磷酸二酯酶抑制剂

D: β 受体激动剂

答案: D

27. 下列氟喹诺酮类抗菌药物中，原形从肾脏排泄率最高的是

A: 诺氟沙星

B: 氟罗沙星

C: 氧氟沙星

D: 环丙沙星

答案：C

28. 关于孟鲁司特钠临床使用注意事项的说法，正确的

A: 孟鲁司特钠起效快，适用于哮喘急性发作

B: 孟鲁司特钠对阿司匹林诱发的哮喘无效

C: 通过抑制磷酸二酯酶的活性而发挥作用

D: 孟鲁司特钠使用后可能会导致嗜酸性粒细胞增多

答案：D

29. 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺

A: 特布他林

B: 普萘洛尔

C: 利多卡因

D: 碘化钾

答案：B

30. 成人与头孢类并用舒巴坦最大剂量为每日

A: 1g

B: 4g

C: 2g

D: 3g

答案：B

31. 脂溶性强，能透过血—脑屏障，可通过阻断 M1 受体产生镇静、失眠、意识混乱和认知障碍等不良反应，用于治疗膀胱过度活动症用药的是

- A: 奥昔布宁
- B: 索利那新
- C: 黄酮哌酯
- D: 托特罗定

答案：A

32. 禁用于妊娠妇女和小儿的药物是()

- A: 头孢菌素类
- B: 氟喹诺酮类
- C: 大环内酯类
- D: 氨基糖苷类

答案：B

33. 可见头晕、耳鸣、视力减退、出汗等不良反应的是

- A: 甲萘氢醌
- B: 蛇毒血凝酶
- C: 卡巴克络
- D: 氨基己酸

答案：C

34. 四环素类的主要作用靶点是

- A: 核糖体的 30S 亚基
- B: 细胞内膜 PBP
- C: 核糖体的 50S 亚基
- D: 细胞壁丙氨酰丙氨酸

答案：A

35. 被还原后的代谢物可抑制细菌的 DNA 代谢过程，促使细菌死亡，并可抑制阿米巴原虫的氧化还原反应，使原虫的氮链发生断裂的是

- A: 磺胺甲噁唑 (SMZ)
- B: 替硝唑
- C: 莫西沙星
- D: 甲氧苄啶 (TMP)

答案：B

36. 防止急性血栓的首选药物是

- A: 维生素 B
- B: 香豆素类
- C: 维生素 K
- D: 肝素

答案：D

37. 奎宁日剂量超过 1g/d 或连续长时间应用，可见耳鸣、头痛、视力与听力减退等，停药后常可恢复，临床称为

- A: 金鸡纳反应
- B: 锥体外系反应
- C: 双硫仑样反应
- D: 吉海反应

答案：A

38. (2016 年真题) 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式（控制饮食、增加运动）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他丁片 20mg/d 治疗

A: CK

B: Hcy

C: Cr

D: BUN

答案：A

39. 存在高度致吐风险的抗肿瘤药物是

A: 泼尼松

B: 顺铂

C: 奥沙利铂

D: 吉西他滨

答案：B

40. 治疗普通型奈瑟球菌脑膜炎是()

A: 复方磺胺甲噁唑

B: 磺胺嘧啶

C: 磺胺米隆

D: 柳氮磺吡啶

答案：B

41. 可引起眼睛疼痛不适的是

A: 喷托维林

B: 氨溴索

C: 沙丁胺醇

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 噻托溴铵

答案: D

42. 不宜口服给药的药物是

- A: 洛伐他汀
- B: 硝苯地平
- C: 硝酸甘油
- D: 普萘洛尔

答案：C

43. 氨苯蝶啶可导致的不良反应是

- A: 低氯碱血症
- B: 低血糖
- C: 高钾血症
- D: 血小板增多

答案：C

44. 属于肾上腺受体激动剂的降眼压药是()

- A: 噻吗洛尔
- B: 地匹福林
- C: 毛果芸香碱
- D: 拉坦前列素

答案：B

45. 属于糖皮质激素禁忌症的是

- A: 再生障碍性贫血
- B: 过敏性皮炎
- C: 类风湿性关节炎
- D: 严重高血压

答案：D

46. 属于雌激素的是

- A: 泼尼松龙
- B: 尼尔雌醇
- C: 甲羟孕酮
- D: 地塞米松

答案：B

47. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A: 该患者用法不能维持全天稳定的血药浓度
- B: 在使用万古霉素的第 4 个维持剂量给药前测定谷浓度
- C: 万古霉素是浓度依赖性抗菌药物
- D: 该万古霉素浓度偏低

答案：C

48. （2021 年真题）患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

- A: 替格瑞洛
- B: 氯吡格雷
- C: 双嘧达莫
- D: 利伐沙班

答案：D

49. 有性激素样副作用的是()

- A: 氨苯蝶啶
- B: 呋塞米
- C: 氢氯噻嗪
- D: 螺内酯

答案：D

50. 以下不属于地西泮的药理作用的是

- A: 抗惊厥
- B: 抗癫痫
- C: 镇静催眠
- D: 抗抑郁

答案：D

51. 患者，男，45 岁。以"间断巩膜黄染伴腹胀 2 年，加重 1 周"之主诉入院。患者 2 年前无明显诱因出现巩膜黄染，伴有腹胀，在当地医院诊断为酒精性肝硬化。1 周前患者上述症状加重，胃镜检查：胃溃疡(A

- A: 水飞蓟宾
- B: 还原型谷胱甘肽
- C: 氢化可的松琥珀酸钠
- D: 复方甘草酸苷

答案：D

52. 通过分解产生新生态氧而发挥杀菌除臭作用用于治疗痤疮的药物是
()

- A: 壬二酸
- B: 过氧苯甲酰
- C: 阿达帕林
- D: 维 A 酸

答案：B

53. 作用于近曲小管前段的利尿剂是

- A: 袢利尿剂
- B: 碳酸酐酶抑制剂
- C: 噻嗪类和类噻嗪类利尿剂
- D: 醛固酮受体阻断剂

答案：B

54. 可致前庭、耳蜗神经功能障碍，妊娠期妇女和新生儿禁用的抗菌药物是

- A: 四环素类
- B: 酰胺醇类(氯霉素)
- C: 氨基糖苷类
- D: 林可霉素类

答案：C

55. 诱导肝微粒体酶，加速皮质激素和雌激素代谢的是()

- A: 乙胺丁醇
- B: 链霉素
- C: 异烟肼
- D: 利福平

答案：D

56. 阿卡波糖降血糖作用的机制是

- A: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性
- B: 竞争性抑制 α -葡萄糖苷酶，减少碳水化合物的水解
- C: 增强胰岛素的作用

D: 拮抗胰岛高血糖素的作用

答案：B

57. 维 A 酸联合过氧苯甲酰治疗寻常痤疮的正确用法是

A: 将两药的凝胶或乳膏充分混合后应用

B: 两药的凝胶或乳膏间隔 2 小时交替使用

C: 睡前应用维 A 酸凝胶或乳膏，晨起洗漱后应用过氧苯甲酰凝胶

D: 晨起洗漱后应用维 A 酸凝胶或乳膏，睡前应用过氧苯甲酰凝胶

答案：C

58. 可与硝酸酯类药物发生相互作用的是

A: 伐地那非

B: 坎利酮

C: 丙酸睾酮

D: 呋塞米

答案：A

59. 胆绞痛最好选用

A: 吗啡

B: 阿司匹林

C: 阿托品+哌替啶

D: 阿托品

答案：C

60. 关于艾塞那肽的描述，不正确的是

A: 适用于糖尿病酮症酸中毒

B: 应注意是否有过敏性症状

C: 服药期间应警惕急性胰腺炎症状

D: 可造成消化不良

答案: A

61. (2015 年真题) 不易导致便秘或腹泻不良反应的抗酸药是 ()。

A: 碳酸钙

B: 三硅酸镁

C: 铝碳酸镁

D: 氢氧化铝

答案: C

62. (2018 年真题) 配制静脉输液时, 应选择氯化钠注射液或乳酸钠林格注射液稀释, 不得使用葡萄糖注射液稀释的抗真菌药是 ()

A: 卡泊芬净

B: 氟康唑

C: 两性霉素 B

D: 伏立康唑

答案: A

63. 是第一个 P2Y₁₂ 拮抗剂, 可抑制血小板聚集的是 ()

A: 华法林

B: 尿激酶

C: 噻氯匹定

D: 肝素

答案: C

64. 可拮抗维生素 B

A: 丙磺舒

B: 雌激素

C: 异烟肼

D: 糖皮质激素

答案: C

65. 不属于普罗帕酮作用特点的是

A: 无肝首过效应

B: 在胃肠道中吸收良好，血浆蛋白结合率高

C: 适用于室上性和室性心律失常

D: 属于 I c 类抗心律失常药

答案: A

66. 不能阻滞钠通道的抗心律失常药物是()

A: 普罗帕酮

B: 利多卡因

C: 普萘洛尔

D: 普鲁卡因胺

答案: C

67. 患者，男，35 岁。大面积烧伤后铜绿假单胞菌感染，同时伴肾功能严重损害，应选用的药物是()

A: 林可霉素

B: 哌拉西林

C: 庆大霉素

D: 氯霉素

答案: B

68. 仅降低发热者体温，不降低正常体温，用于感冒发热的药物是

A: 氯丙嗪

B: 硫喷妥钠

C: 阿司匹林

D: 地西泮

答案：C

69. 糖尿病合并轻度肾功能不全患者宜选用

A: 正规胰岛素

B: 珠蛋白锌胰岛素

C: 格列喹酮

D: 二甲双胍

答案：C

70. 袢利尿药中，结构中不含有磺酰胺基，可以用于对磺胺过敏者的是
()

A: 依他尼酸

B: 呋塞米

C: 布美他尼

D: 托拉塞米

答案：A

71. 淋巴细胞白血病采用

A: 抗结核病药与糖皮质激素合用

B: 糖皮质激素一般剂量长期疗法

C: 糖皮质激素小剂量代替疗法

D: 糖皮质激素大剂量冲击疗法

答案：B

72. 主要结构与雄激素颇为相似，但雄性化作用甚弱，蛋白同化作用很强，临床上可作为升白药物使用的是

- A: 小檗胺
- B: 丙酸诺龙
- C: 鲨肝醇
- D: 维生素 B₄

答案：B

73. 止吐方案：每日化疗前，应用 5-HT

- A: 低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- B: 微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- C: 重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- D: 中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

答案：A

74. 用于单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的 2 型糖尿病患者宜首选

- A: 二甲双胍
- B: 格列喹酮
- C: 普通胰岛素
- D: 低精蛋白锌胰岛素

答案：A

75. 维生素 B

- A: 脚气病
- B: 坏血病
- C: 成人佝偻病
- D: 角膜软化症

答案：A

76. 用于治疗黏液性水肿的是()

- A: 小剂量碘制剂
- B: 西地那非
- C: 司坦唑醇
- D: 甲状腺素

答案: D

77. 减少房水生成，治疗青光眼可选用

- A: 螺内酯
- B: 氢氯噻嗪
- C: 呋塞米
- D: 乙酰唑胺

答案: D

78. 红霉素的抗菌作用机制

- A: 影响胞浆膜通透性
- B: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性
- C: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性
- D: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成

答案: C

79. 用于预防单纯性甲状腺肿的是

- A: 小剂量碘制剂
- B: None
- C: 甲状腺素
- D: 大剂量碘制剂

答案: A

80. ACEI 与()联合应用时，可能影响后者的促红细胞生成作用。

- A: β 受体阻断剂
- B: 噻嗪类利尿剂
- C: 人促红素
- D: 留钾利尿剂

答案：C

81. 下列哪类药物属于繁殖期杀菌药()

- A: 氯霉素类
- B: 多黏菌素 B
- C: 磺胺类
- D: 青霉素类

答案：D

82. 不易发生“双硫仑样”反应的药物是()

- A: 头孢替安
- B: 头孢曲松
- C: 头孢哌酮
- D: 头孢他啶

答案：D

83. 与 α_1 受体阻断药无相互作用的药物是()

- A: 第三代头孢菌素
- B: 地尔硫
- C: 卡马西平
- D: 西咪替丁

答案：A

84. 与奥美拉唑、甲硝唑三联治疗幽门螺杆菌感染的是

- A: 罗红霉素
- B: 万古霉素
- C: 克拉霉素
- D: 红霉素

答案：C

85. 可能导致牙龈出血的药物是

- A: 普伐他汀
- B: 依诺肝素
- C: 拉西地平
- D: 普萘洛尔

答案：B

86. 司来吉兰用于

- A: 神经源性尿崩症
- B: 早期帕金森病
- C: 慢性脑功能不全
- D: 特发性震颤

答案：B

87. 患者，男性，46 岁，经常头痛，头晕近 8 年。2 天来头痛加重，伴有恶心、呕吐送往急诊。查体：神志模糊，血压 230 / 120mmHg。尿蛋白(++)，尿糖(+)。入院治疗，经处理，血压仍为 202 / 120mmHg，且气急不能平卧，心率 108 次 / 分，早搏 3 次 / 分。两肺底有湿啰音。

- A: 使用 5%葡萄糖注射液配制后保存与应用不应超过 24 小时

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 可使用微量输液泵

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/717052024050010024>