

## 2024 甘肃省通渭县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题完整版及答案【必刷】

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 受精后半个月以内

- A: 几乎见不到药物的致畸作用
- B: 中枢神经系统发育迟缓
- C: 可产生形态或功能的异常而造成畸形
- D: 女性生殖系统发育迟缓

答案：A

2. 抗肿瘤药物中，影响核酸合成的药物是

- A: 依托泊苷
- B: 甲氨蝶呤
- C: 顺铂
- D: 放线菌素

答案：B

3. 为细菌感染性腹泻患者开具小檗碱片、盐酸地芬诺酯片与双八面体蒙脱石散的处方，应评判为

- A: 有禁忌证用药
- B: 联合用药不适宜
- C: 过度治疗用药
- D: 无正当理由超适应证用药

答案：B

4. 在与患者进行沟通的过程中，切忌的事项是

- A: 一次性尽量提供更多的信息
- B: 尽量避免使用专业术语
- C: 可提供一些宣传资料
- D: 认真聆听

**答案：A**

5. 成本-效益分析

- A: 是成本-效果分析的一种特例
- B: 治疗结果采用临床指标表示，如治愈率
- C: 药物利用指数(DUI)
- D: 成本和治疗结果均用货币表示

**答案：D**

6. 减少尿酸排泄，引起高尿酸血症的是

- A: 丙磺舒
- B: 氢氯噻嗪
- C: 苯溴马隆
- D: 吲哚美辛

**答案：B**

7. 患者，女，22岁，因淋雨导致发热、咳痰伴胸痛1天就诊。查体：体温38.6℃，脉搏90次/分，呼吸24次/分，血压正常；双肺布满湿啰音。实验室检查：WBC $11 \times 10^9$  / L，胸片显示斑片状浸润性阴影。既往无过敏史。选用有效抗生素治疗后2天，体温恢复正常，咳痰减少。

- A: 社区获得性肺炎

- B: 支气管炎
- C: 医院获得性肺炎
- D: 慢性阻塞性肺病

**答案：A**

8. 在体内有抗凝血作用、体外没有抗凝血作用的药物是

- A: 华法林
- B: 噻氯匹定
- C: 肝素
- D: 链激酶

**答案：A**

9. 以延长患者生命时间为指标开展的药物经济学评价方法属于()

- A: 成本-效用分析
- B: 成本-效益分析
- C: 成本-效果分析
- D: 最小成本分析

**答案：C**

10. 对混合型血脂异常，必须联用他汀类和贝特类，最佳的给药方案是

- A: 早晚联合服用他汀类和贝特类
- B: 晚上联合服用他汀类和贝特类
- C: 早晨用贝特类，晚上用他汀类
- D: 早晨用他汀类，晚上用贝特类

**答案：C**

11. 患者，女，55 岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应首选的 NSAID 类药物是

- A: 吲哚关辛
- B: 布洛芬
- C: 双氯芬酸
- D: 塞来昔布

**答案：D**

12. 治疗痔疮的常用内服药是

- A: 九华膏
- B: 聚甲酚磺醛栓
- C: 地奥司明
- D: 联苯苄唑乳膏

**答案：C**

13. 口服避孕药可能导致

- A: 粪便细胞显微镜检查检出真菌
- B: 血白细胞减少
- C: 血清血红蛋白升高
- D: 血清总胆固醇升高

**答案：D**

14. 清晨 5 时至中午 11 时最低，下午 2 时至次日凌晨 1 时最高，是指

- A: 糖皮质激素的分泌规律
- B: 胃酸的分泌规律
- C: 胰岛 B 细胞的分泌规律
- D: 肝脏合成胆固醇的规律

**答案：B**

15. 可诊断女性高尿酸血症的是

A: 血尿酸为  $270\ \mu\text{mol/L}$

B: 血尿酸为  $420\ \mu\text{mol/L}$

C: 血尿酸为  $380\ \mu\text{mol/L}$

D: 血尿酸为  $200\ \mu\text{mol/L}$

**答案：C**

16. 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15KG，一天前发热 ( $39^{\circ}\text{C}$ )，咽喉痛，无咳嗽、吐血，家长主诉在家中应用退烧药治疗，发病左右出现腹泻，约 2~5 次大便，量少，黄色粘液便，呕吐一次。体格检查：T $38.8^{\circ}\text{C}$ ，P118 次/分，R28 次/分。咽微充血，出现轻脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃，实验室检查：WBC： $5\times 10$

A: 消化不良性腹泻

B: 分泌性腹泻

C: 动力性腹泻

D: 感染性腹泻

**答案：D**

17. 焦虑障碍最常见的表现形式为

A: 社交焦虑障碍

B: 急性焦虑

C: 惊恐发作

D: 广泛性焦虑

**答案：D**

18. (2016 年真题) 荨麻疹患者常出现 ( )。

A: 血小板计数增多

B: 嗜酸性粒细胞增多

C: 血红蛋白减少

D: 中性粒细胞增多

**答案：B**

19. 有机氟杀虫农药中毒的特效解毒剂是

A: 碘解磷定

B: 维生素 K

C: 乙酰胺

D: 毒扁豆碱

**答案：C**

20. 患者，女，28 岁，妊娠 27 周，头晕 3 天。入院查体：血压 160 / 100mmHg。诊断为：妊娠高血压。

A: 福辛普利

B: 缬沙坦

C: 拉贝洛尔

D: 卡托普利

**答案：C**

21. 异烟肼+链霉素+对氨基水杨酸钠治疗结核病属于

A: 提高药物疗效

B: 延缓细菌耐药性的产生

C: 减少药物不良反应

D: 治疗多种疾病

**答案：B**

22. 患者，男，59 岁，因多尿，下肢浮肿就诊。体征和实验室检查：BM128.3kg / m<sup>2</sup>，餐前血糖 7.8mmol / L，餐后血糖 13.6mmol / L，糖化血红蛋白 7.9%，血清 C 肽 0.2 μg / L，三酰甘油 2.8mmol / L。建议服用

- A: 格列本脲
- B: 二甲双胍
- C: 格列吡嗪
- D: 吡格列酮

**答案：B**

23. 对于 ACEI 类药描述错误的是

- A: 抑制交感神经活性作用
- B: 抑制血管紧张素转化酶 (ACE) 活性
- C: 明显降低全身血管阻力
- D: 唯一的抑制心肌及血管重构药物

**答案：A**

24. 酮康唑、氟康唑、伊曲康唑可导致

- A: 药源性肾损害
- B: 药源性血损害
- C: 药源性肝损害
- D: 药源性神经损害

**答案：C**

25. 患者，男，因药物中毒被紧急送医，中毒表现为昏迷、针尖样瞳孔、呼吸抑制，造成这种中毒症状的常见药物是

- A: 苯巴比妥
- B: 吗啡

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

C: 阿米替林

D: 香豆素类杀鼠药

**答案：B**

26. 以下有关肌酸激酶检查值升高的临床意义中，最正确的是

- A: 诊断痛风
- B: 诊断心肌梗死
- C: 诊断恶性贫血
- D: 诊断急慢性白血病

**答案：B**

27. 患者计划口服避孕药避孕，可能增加避孕失败风险的药物是（）

- A: 丙戊酸钠
- B: 卡马西平
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

**答案：B**

28. 下列白细胞计数中，属于不正常的是

- A: 成人  $3.5 \times 10^9 / L$
- B: 成人  $5.0 \times 10^9 / L$
- C: 新生儿  $15.0 \times 10^9 / L$
- D: 成人  $4.3 \times 10^9 / L$

**答案：A**

29. 对目标适应证患者的治疗作用的初步评价是指

- A: III期临床试验
- B: II期临床试验
- C: 临床预试验
- D: I期临床试验

**答案：B**

30. 药师应及时向患者交待有关用药的注意事项，以避免误用药物，减轻患者不必要的恐慌，提高用药依从性。根据患者用药情况，发药时药师应有针对性的提示患者各类药物的应用注意事项。

- A: 患者一?
- B: 患者四?
- C: 患者三?
- D: 患者二?

**答案：D**

31. 在消化性溃疡形成中起到关键作用的因素为 ( )

- A: 胃黏膜屏障的完整性
- B: H. pylori 感染
- C: 胃酸
- D: 胃黏膜血流减少

**答案：C**

32. 一位巨幼细胞性贫血患儿肌肉注射维生素 B

- A: 0.25~0.40ml
- B: 0.05~0.10ml
- C: 0.049~0.20ml
- D: 0.15~0.30ml

**答案：B**

33. 对氟乙酰胺中毒进行解毒的药物是 ( )。

- A: 阿托品
- B: 毒扁豆碱

C: 卡马西平

D: 乙酰胺

**答案: D**

34. 对伴有血管性水肿的荨麻疹可选用的药物是

A: 泮托拉唑

B: 氯雷他定

C: 氯苯那敏

D: 赛庚啶

**答案: D**

35. “-沙星”的药名词干缩写是

A: #NAME?

B: eef-

C: #NAME?

D: #NAME?

**答案: D**

36. 患者通过电话、网络或信件询问是

A: 主动方式

B: 质问方式

C: 指令方式

D: 被动方式

**答案: D**

37. 药历是开展个体化药物治疗的重要依据。药历书写的基本要求是

A: 客观、真实

B: 客观、完整

C: 科学、易懂

D: 完整、真实

**答案: A**

38. 患者,男,60 岁,坏死性胰腺炎剖腹探查术术后 2 年,恢复良好。进食油炸食品后出现轻度腹泻。宜选用的药物是 ( )

A: 复方阿嗪米特肠溶片

B: 奥美拉唑肠溶胶囊

C: 蒙脱石散

D: 干酵母片

**答案: A**

39. (2016 年真题) 应在餐前服用的药物是 ( )。

A: 氨茶碱片

B: 呋塞米片

C: 胶体果胶铋胶囊

D: 吡罗昔康片

**答案: C**

40. (2018 年真题) 用于胆石症的非手术治疗,属于钙通道阻滞剂,不可掰开嚼碎,避免卧位服用的药物是 ( )

A: 熊去氧胆酸片

B: 鹅去氧胆酸片

C: 匹维溴铵片

D: 山莨菪碱片

**答案: C**

41. 可作为急性胰腺炎的症状指标是

- A: 磷酸激酶升高?
- B: 血清淀粉酶降低?
- C: 血清淀粉酶升高?
- D: 磷酸激酶降低?

**答案: C**

42. 《中华人民共和国药典》、国家食品药品监督管理局颁布标准收载的处方属于

- A: 普通处方?
- B: 医师处方?
- C: 法定处方?
- D: 急诊处方?

**答案: C**

43. 下列可增强华法林抗凝作用的药物是

- A: 苯巴比妥
- B: 维生素 K
- C: 雌激素
- D: 阿司匹林

**答案: D**

44. 患者女，68 岁体重 54kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查 ALT20IU/L，血肌酐(Cr)1.8mg/dL，痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为 1 日 1.5~6g，分 2~3 次给药肌酐清除率为 31~50ml/min 时剂量为每 12 小时 1g；肌酐清除率为 16~30ml/min 时剂量为每 24 小时 1g；肌酐清除率为 6~15ml/min 时量为每 24 小时 0.5g；肌酐清除率≤5ml/min 时剂量为每 48 小时 0.5g。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

- A: 每 8 小时 2g
- B: 每 12 小时 1g
- C: 每 24 小时 0.5g
- D: 每 24 小时 1g

**答案：D**

45. 下列药物中，驾驶员服用后可能出现嗜睡的是

- A: 双氯芬酸
- B: 布洛芬
- C: 奥美拉唑
- D: 雷尼替丁

**答案：C**

46. 当创伤应激严重时，由葡萄糖与脂肪提供 NPC 的比例是

- A: NPC5: 5
- B: NPC7: 3
- C: 100kcal: 1gN
- D: 150kcal: 1gN

**答案：A**

47. 除解热镇痛药外，可推荐给长期精神紧张的头痛患者应用的处方药是

- A: 谷维素
- B: 地西泮
- C: 氟西汀
- D: 卡马西平

**答案：B**

48. 下列药学服务的重要人群中，特殊人群是指

- A: 药物治疗窗窄、需要做监测者
- B: 应用特殊剂型者
- C: 肝肾功能不全者
- D: 需要重新选择药品或调整用药方案者

**答案：C**

49. 症状明显、重要器官或系统功能有中度损害，应判为

- A: 重度
- B: 弱轻度
- C: 中度
- D: 轻度

**答案：C**

50. 患者，女，53 岁，既往有痛风史，长期坚持服药控制。近日因高血压就诊，该患者禁用的药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 氢氯噻嗪
- C: 卡托普利
- D: 洛伐他汀

**答案：B**

51. 不易产生耐受性，对 CYP2C19 快代谢的胃食管反流病人群，推荐长期维持治疗的抑酸剂是

- A: 奥美拉唑
- B: 伊托必利
- C: 法莫替丁
- D: 泮托拉唑

**答案：D**

52. 脑梗死的分期急性期查看材料

- A: 1 个月内
- B: 1~3 个月
- C: 2 周
- D: 1~6 个月

**答案：A**

53. 根据中国营养学会推荐，老年人在每日饮食之外，应补充的元素钙剂量为 (??)

- A: 100mg
- B: 2000—4000mg
- C: 50mg
- D: 500—600mg

**答案：D**

54. 慢性沙眼患者禁用的药品是

- A: 酞丁安滴眼剂
- B: 利福平滴眼剂
- C: 硫酸锌滴眼剂
- D: 醋酸可的松滴眼剂

**答案：D**

55. 服药后饮水冲淡对感受器刺激作用的药物是

- A: 利胆药
- B: 抗利尿药
- C: 抗尿结石药

D: 苦味健胃药

**答案: D**

56. 归属专业学术机构网站的是

A: [www.cmt.com.cn](http://www.cmt.com.cn)

B: [www.google](http://www.google.com)

C: [www.ashp.org](http://www.ashp.org)

D: [www.merck.com](http://www.merck.com)

**答案: C**

57. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛；查体：T38℃，肾区叩击痛：血常规见 WBC15X10<sup>9</sup> / L，中性粒细胞百分比 85%，尿常规见尿液混浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

A: 首选针对革兰阳性菌的药物

B: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄青霉素

C: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高

D: 选用肾毒性小、不良反应少的抗菌药物

**答案: A**

58. 在药学信息咨询服务中，应用二级信息资料的最突出优势是

A: 有的还能提供疾病与药物治疗的基本知识

B: 对一个具体问题所提供的信息简明扼要

C: 读者能自己评价信息，免受他人观点影响

D: 可以很方便地对所需要的一级文献信息进行筛选

**答案: D**

59. 有关药学服务的叙述，正确的是

- A: 药学服务涵盖了患者用药相关的全部需求，但不包括对公众的健康教育
- B: 用药周期长的慢性病患者属于药学服务的重要人群
- C: 药学服务只涉及更高层次的临床实践，不包括处方调剂、药品检验、药品供应
- D: 药学服务的社会属性仅限服务于治疗性药物

**答案：B**

60. “药师参与临床药物治疗，提供药学服务的重要方式和途径”的工作是

- A: 处方调剂
- B: 治疗药物监测
- C: 参与临床药物治疗
- D: 静脉药物配置

**答案：B**

61. 服用磺胺甲噁唑不宜同食

- A: 葡萄柚汁
- B: 高蛋白食物
- C: 食醋
- D: 咖啡

**答案：C**

62. 可在一定程度上准确反映肾小球滤过功能损害程度的是

- A: 尿素氮
- B: 淀粉酶
- C: 肌酐
- D: 胆固醇

**答案：C**

63. 对于化疗药物引起的呕吐，正确的用药方法对严重呕吐，可给予

- A: 昂丹司琼
- B: 羧甲司坦
- C: 苯海拉明
- D: 阿瑞吡坦

**答案：A**

64. 房颤合并支气管哮喘患者，适用于控制心室率的药物为

- A: 胺碘酮
- B: 硝苯地平
- C: 地尔硫
- D: 利伐沙班

**答案：C**

65. 与甲氧苄啶组成复方制剂复方新诺明的药物是

- A: 磺胺甲噁唑
- B: 替硝唑
- C: 磺胺多辛
- D: 磺胺嘧啶

**答案：A**

66. 避免使用 g，mg， $\mu$ g 等专业计量单位，是针对

- A: 交代药物的用量
- B: 交代药品贮存条件与方法
- C: 交代用药途径及用药方法
- D: 交代用药注意事项

**答案：A**

67. 静脉注射两性霉素 B 的适宜溶媒是

- A: 复方氨基酸注射液
- B: 0.9%氯化钠注射液
- C: 5%葡萄糖注射液
- D: 50%葡萄糖注射液

**答案：C**

68. 医师咨询"加替沙星用于糖尿病患者抗感染"，属于

- A: 药物相互作用
- B: 禁忌证
- C: 新药信息
- D: 给药途径

**答案：B**

69. 服用维生素 A、维生素 D 等应该食用的是

- A: 食盐
- B: 酒
- C: 食醋
- D: 脂肪

**答案：D**

70. 应提示患者，该药品内附药片，须先溶解再滴眼

- A: 利福平滴眼剂
- B: 复方甲硝唑栓
- C: 噻托溴铵粉吸入剂
- D: 胰岛素笔

**答案：A**

71. 对慢性中重度铅中毒患者给予

- A: 补充蛋白质
- B: 糖皮质激素
- C: 驱铅治疗
- D: 卫生教育

**答案：C**

72. 表现为"牛肉样舌"的疾病为

- A: 再生障碍性贫血
- B: 缺铁性贫血
- C: 巨幼细胞性贫血
- D: 淋巴瘤

**答案：C**

73. 药品临床评价具有"公正性和科学性"是基于

- A: 药品临床评价重在实践
- B: 应用医药学理论和实践的前沿知识
- C: 药品临床评价采用多中心、大样本、随机、双盲、对照的方法，经数理统计得出结论
- D: 在多学科新进展的基础上进行

**答案：C**

74. 患儿，男，6 个月，体重 9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有乒乓球感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

- A: 维生素 C

B: 维生素 D3

C: 维生素 B12

D: 维生素 A

**答案：B**

75. 左旋多巴的禁用范围是

A: 1 岁以下婴儿

B: 8 岁以下儿童

C: 3 岁以下幼儿

D: 12 岁以下儿童

**答案：C**

76. 不可随意间断用药、停药、换药

A: 早期

B: 规律

C: 适量

D: 联合

**答案：B**

77. 选择药物的首要标准是药物治疗的

A: 经济性？

B: 方便性？

C: 安全性？

D: 有效性？

**答案：D**

78. 属于 M 受体激动剂的是

A: 美托洛尔

- B: 福莫特罗
- C: 乙酰胆碱
- D: 异丙托溴铵

**答案: C**

79. 适用于伴快速型心律失常的高血压患者服用的药物是

- A: 多沙唑嗪
- B: 阿替洛尔
- C: 阿利吉仑
- D: 氢氯噻嗪

**答案: B**

80. (2016 年真题) 缓解视疲劳可选用的药物是 ( )。

- A: 氧氟沙星滴眼液
- B: 羟甲基纤维素钠滴眼液
- C: 色甘酸钠滴眼液
- D: 酞丁安滴眼液

**答案: B**

81. 患者, 女, 71 岁, 2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白 (HbA) 9.2%, 空腹血糖 10.5mmol/L, 餐后血糖 15.5mmo/L。目前服用二甲双胍片 0.5gtidpo, 格列美脲片 2mg tidpo, 罗格列酮片 2mg bidpo, 甲钴胺片 0.5mg tidpo, 羟苯磺酸钙胶囊 250mg bidpo。

- A: 立刻口服糖水或糖块
- B: 立刻舌下含服硝酸甘油片
- C: 立刻服用美托洛尔片
- D: 立刻喝白开水 200mL

**答案: A**

82. 以下的论述哪项是错误的

- A: 氢氯噻嗪不可与普萘洛尔合用于治疗高血压
- B: 氢氯噻嗪作为基础降压药可单用于轻度高血压，也可与其他降压药合用，提高疗效，减少不良反应
- C: 硝普钠可用于高血压危象和慢性心功能不全
- D: 普萘洛尔不可抑制肾素的分泌

**答案：A**

83. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发发生喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，Bp108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 慢性支气管炎急性发作
- B: 支气管哮喘
- C: 急性左心衰竭
- D: 肺动脉栓塞

**答案：C**

84. 患者，男，50 岁，身高 167cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查：空腹血糖 7.8mmol / L（正常值：3.9～6.1mmol / L），餐后血糖 14.8mmol / L；血尿酸 580 μmol/L（正常值：男性 180～440 μmol / L），低密度脂蛋白胆固醇 3.7mmol / L（正常值：2.1～3.1mmol / L），肌酐清除率 100ml / min。颈动脉彩超提示：动脉粥样硬化，有混合性脂质斑块。临床诊断为 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

- A: 甘精胰岛素
- B: 二甲双胍

C: 阿卡波糖

D: 格列齐特

**答案: C**

85. 抗慢性阻塞性肺疾病药的用药监护，禁用于急性心肌梗死，并不得与其他黄嘌呤药同时使用的是

A: 二羟丙茶碱

B: 色甘氨酸

C: 多索茶碱

D: 氨茶碱

**答案: C**

86. 药品不良反应按照程度分为轻度、中度、重度三级。

A: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗

B: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

C: 没有临床症状，无需治疗

D: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

**答案: D**

87. 患者，男，36 岁。临床诊断痛风性关节炎急性发作期。症见左侧踝关节红肿，剧烈疼痛。为控制炎症，治疗首选药是

A: 布洛芬

B: 秋水仙碱

C: 尼美舒利

D: 非布司他

**答案: B**

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/717061136046010024>