

2024 年河北省广宗县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库带答案（考试直接用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 洋地黄中毒的特征性表现为

- A: 视力模糊
- B: 黄视、绿视
- C: 恶心
- D: 快速房性心律失常伴传导阻滞

答案：D

2. 发现处方存在或潜在的问题，制定并实施干预和改进措施，归属于

- A: 处方审核
- B: 静脉药物配置
- C: 治疗药物监测
- D: 处方点评

答案：D

3. 饮用含葡萄柚汁的饮料可能影响一些药物的药动学的机制是

- A: 抑制 CYP3A4
- B: 抑制 CYP1A2
- C: 抑制 CYP2C9
- D: 诱导 CYP3A4

答案：A

4. 下歹关于硫脲类抗甲状腺药不良反应的描述，哪一项是错误的

- A: 咽痛、发热
- B: 粒细胞缺乏
- C: 中毒性肝炎
- D: 药疹、瘙痒

答案：A

5. 药师应具备的素质中，贯穿于药学服务全过程的是()。

- A: 良好的教育背景
- B: 高尚的职业道德
- C: 药历制订、修改
- D: 交流沟通能力

答案：C

6. 心血管疾病患者感冒时退热建议选用的药物是

- A: 布洛芬
- B: 奥司他韦
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 金刚烷胺

答案：C

7. 阿糖腺苷属于

- A: 抗过敏药
- B: 抗病毒药
- C: 抗肿瘤药
- D: 抗真菌药

答案：B

8. 治疗心力衰竭时，可抑制心肌重构和心肌纤维化的治疗药物不包括

- A: 血管紧张素 II 受体阻断剂
- B: 醛固酮受体阻断剂
- C: 血管紧张素转换酶抑制剂
- D: 强心苷类药物

答案：D

9. 患者，男，35 岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

- A: 小檗碱
- B: 双八面体蒙脱石
- C: 碳酸氢钠
- D: 胰酶片

答案：D

10. 下列药师承接的用药咨询内容中，多由患者提出的是

- A: 自我保健
- B: 新药信息
- C: 治疗药物监测
- D: 药品适应证

答案：D

11. 延缓胃排空，影响同服药物吸收的是

- A: 丙磺舒
- B: 丙胺太林
- C: 西沙必利
- D: 阿司匹林

答案：B

12. 某患者到药店购买胃得灵，药师应交付的药物是

- A: 吡拉西坦
- B: 苯乙双胍
- C: 格列本脲
- D: 胃得灵

答案：D

13. 患者，女，45 岁，既往有扩张型心肌病，近 1 年出现劳累性呼吸困难，1 天前因感冒出现发热、咳嗽、咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。肺动脉瓣区第二心音亢进及舒张早期和中期奔马律。

- A: 地高辛
- B: 卡托普利
- C: 毛花苷丙
- D: 硝苯地平

答案：C

14. ADR 报表内容填写不齐全、等待补充，或因果关系难以定论，缺乏文献资料佐证；可评价为

- A: 可能
- B: 可能无关
- C: 很可能
- D: 待评价

答案：D

15. 治疗苯二氮

- A: 呼吸抑制时给氧，必要时做人工呼吸
- B: 血压下降时，选用升压药如去甲肾上腺素
- C: 催吐、洗胃、硫酸钠导泻
- D: 血液透析和血液灌流疗法

答案：D

16. 大剂量或连续使用顺铂导致

- A: 前列腺素合成障碍
- B: 肾间质纤维化
- C: 肾小管坏死
- D: 阻塞肾小管、肾小球

答案：C

17. 起效相对较慢，需 2~4 周，持续治疗可增加抗焦虑疗效的药物是

- A: 加兰他敏
- B: 丁螺环酮
- C: 地西泮
- D: 苯海索

答案：B

18. 患者，女，27 岁，妊娠 4 个月，因肺结核给予异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇联合治疗。为避免胎儿神经毒性，患者应补充

- A: 维生素 D
- B: 维生素 C
- C: 维生素 K1
- D: 维生素 B6

答案：D

19. 下列药源性疾病中，其诱因主要是"性别因素"的是

- A: 老年人应用普萘洛尔可诱发头痛、眩晕、低血压等不良反应
- B: 羟化酶缺乏者服用一半剂量的苯妥英钠呈现引起神经毒性
- C: 口服避孕药致阿米替林清除率下降
- D: 灰婴综合征是氯霉素在新生儿体内蓄积所致

答案：C

20. 适用于静脉推注的抗肿瘤药为

- A: 阿糖胞苷
- B: 塞替派
- C: 氮芥
- D: 甲氨蝶呤

答案：C

21. (2019 年真题) 患者，女，32 岁，一天前发热，体温 39.8℃，全身乏力，四肢疼痛，近日有流感患者接触史。查体见咽部轻度充血，血常规检查白细胞计数偏低，中性粒细胞比例低，该者最适宜选用的药物是

- A: 阿昔洛韦片
- B: 利巴韦林片
- C: 奥司他韦胶囊
- D: 金刚烷胺片

答案：C

22. 服用左旋多巴时应避免同时进食蛋白质类食物，应隔开

- A: 2~3 小时
- B: 1.5~2 小时
- C: 0.5~1 小时

D: 1~1.5 小时

答案：A

23. 糖尿病酮症酸中毒患者应选用

A: 二甲双胍

B: 格列本脲

C: 大剂量碘剂

D: 胰岛素

答案：D

24. (2015 年真题) 用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药是 ()

。

A: 乙胺丁醇

B: 链霉素

C: 利福平

D: 吡嗪酰胺

答案：A

25. 患者，女，65 岁，诊断为房性心律失常，给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。

A: 西咪替丁诱导 CYP2C9, 升高胺碘酮血浆药物浓度

B: 胺碘酮与西咪替丁竞争 CYP2D6, 减慢胺碘酮的代谢

C: 西咪替丁抑制 CYP3A4, 升高胺碘酮血浆药物浓度

D: 西咪替丁抑制 CYP1A2, 升高胺碘酮血浆药物浓度

答案：C

26. 患者男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 肝素
- B: 华法林
- C: 利伐沙班
- D: 氯吡格雷

答案：D

27. 药品不良反应 (ADR) 的机制和影响因素错综复杂，遇到可疑 ADR 时，需要进行因果关系评价

- A: 可能无关
- B: 很可能
- C: 可能
- D: 肯定

答案：D

28. (2019 年真题) 患儿，女，5 岁，误服香豆素灭鼠药，可选用的解救的物是

- A: 纳洛酮
- B: 二巯丙醇
- C: 亚甲蓝
- D: 维生素 K

答案：D

29. 应用多黏菌素、磺胺类、顺铂可能引起的尿常规检查异常是

- A: 尿沉渣尿酸盐结晶
- B: 尿沉渣白细胞增多
- C: 尿沉渣结晶异常
- D: 尿沉渣管型异常

答案：D

30. 可了解工作效果、并为之后工作的进一步完善的是

- A: 随访了解效果，并建立档案
- B: 对查阅的资料进行评价、分析和整理
- C: 对问题进行确定并归类
- D: 形成答案并以口头形式提供给询问者

答案：A

31. 维生素 E 用于

- A: 防治夜盲症
- B: 防治坏血病
- C: 习惯性流产的辅助治疗
- D: 防治佝偻病

答案：C

32. 除全身症状外，尚有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状

- A: 病毒型
- B: 胃肠型
- C: 神经型
- D: 肺炎型

答案：B

33. 配制 10%葡萄糖注射液 500ml，现用 50%和 5%的葡萄糖注射液混合，需要

- A: 50%葡萄糖注射液 72ml 和 5%葡萄糖注射液 428ml
- B: 50%葡萄糖注射液 94ml 和 5%葡萄糖注射液 406ml
- C: 50%葡萄糖注射液 85ml 和 5%葡萄糖注射液 415ml
- D: 50%葡萄糖注射液 56ml 和 5%葡萄糖注射液 444ml

答案：D

34. 大剂量可导致 Q-T 间期延长的是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 西沙必利
- C: 莫沙必利
- D: 多潘立酮

答案：B

35. 蒽环类药物

- A: 溶血性尿毒症
- B: 出血性膀胱炎
- C: 肺纤维化
- D: 心脏毒性

答案：D

36. 帕金森病患者跌倒的最常见原因为

- A: 体位性低血压
- B: 神经精神障碍
- C: 姿势反射障碍
- D: 不宁腿综合征

答案：C

37. IV 期临床试验是在广泛使用条件下，考察药品的疗效和不良反应，
试验样本数常见病不少于

- A: 4000 例
- B: 1000 例
- C: 3000 例

D: 2000 例

答案：D

38. 春季卡他性结膜炎适宜选用

A: 碘苷滴眼液

B: 2%色甘酸钠滴眼液

C: 利巴韦林滴眼液

D: 妥布霉素滴眼液

答案：B

39. 可刺激胃肠黏膜，引起水肿或充血

A: 食盐

B: 酒

C: 食醋

D: 脂肪

答案：B

40. (肾功能不全者的药物排泄机制)心力衰竭导致药物经肾排泄减少

A: 肾血流量减少

B: 肾小管分泌减少

C: 肾小管重吸收增加

D: 肾小球滤过减少

答案：A

41. 消化性溃疡抗 Hp 的四联疗法正确的是

A: 奥美拉唑+甲硝唑+阿奇霉素+胶体次碳酸铋

B: 西咪替丁+胶体次碳酸铋+哌仑西平+替硝唑

C: 兰索拉唑+阿莫西林+克拉霉素+胶体次碳酸铋

D: 雷尼替丁+阿莫西林+胶体次碳酸铋+甲硝唑

答案：C

42. 患者,男,46 岁,因类风湿性关节炎长期使用免疫抑制剂,近日因出现发热、咳嗽、咳痰入院经病原学检查,诊断为侵袭性肺曲霉病,临床欲使用伏立康唑治疗。患者同时合并肝功能不全 Child-TurcottePugh(CTP)评分为 13 分(CTPC 级)。根据 CTP 评分结果,药师的用建议是()

- A: 该患者重度肝功能不全,不建议使用伏立康唑
- B: 该患者轻度肝功能不全,伏立康唑维持剂量减少 25%
- C: 该患者中度肝功能不全,伏立康唑维持剂量减少 50%
- D: 该患者轻度肝功能不全,伏立康唑维持剂量不变

答案：A

43. 目前治疗低 HDL-C 血症,较为有效的药物是

- A: 他汀类
- B: ω -3 脂肪酸制剂
- C: 贝特类
- D: 烟酸类

答案：D

44. 过敏性肠炎、慢性菌痢等可引起

- A: 脓状便
- B: 黏液便
- C: 米泔水样便
- D: 稀糊状或水样粪便

答案：A

45. 乙醇、对乙酰氨基酚等血浆药物浓度升高，地西洋、利多卡因分布容积增大、消除缓慢，是由于

- A: 脂肪组织随年龄增长而增加，血浆白蛋白浓度降低
- B: 肝药酶活性的个体化差异影响大于年龄的增长
- C: 胆汁分泌缺乏
- D: 肾功能随年龄增长而减退

答案：A

46. 下列药品中，新生儿局部应用过多可能导致中毒的是

- A: 硼酸
- B: 氧化锌
- C: 炉甘石
- D: 滑石粉

答案：A

47. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见 WBC $15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%，尿分析见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 急性膀胱炎
- B: 急性肾盂肾炎
- C: 慢性肾盂肾炎
- D: 急性肾小球肾炎

答案：B

48. 不宜肌肉注射或直接静脉注射，滴注速度过快容易导致红人综合征的药物是

- A: 磷霉素
- B: 阿奇霉素

C: 万古霉素

D: 链霉素

答案：C

49. (2017 年真题) 根据《中国成人超重和肥胖预防控制指南》体重指数 (BMI) 判断为肥胖的标准是 ()

A: $BMI < 21.5$

B: $BMI \geq 24.0$

C: $BMI \leq 18.5$

D: $BMI \geq 28.0$

答案：D

50. (2018 年真题) 患者，女，42 岁，因成骨肉瘤使用环磷酰胺甲氨蝶呤联合化疗，用药过程中，者出现出血性膀胱炎。适宜的处理措施是 ()

A: 给予糖皮质激素冲击治疗

B: 停药，给予糖皮质激素

C: 停药，给予亚叶酸钙治疗

D: 停药，水化，给予美司钠治疗

答案：D

51. 静脉滴注青霉素的适宜溶媒是

A: 0.9% 氯化钠注射液

B: 50% 葡萄糖注射液

C: 5% 葡萄糖注射液

D: 复方氯化钠注射液

答案：A

52. 患者，女，39 岁，有哮喘病史。1 天前因发热服用阿司匹林 250mg，用药后 30 分钟哮喘严重发作，大汗、发绀、强迫坐位。

- A: 吸入倍氯米松
- B: 吸入沙丁胺醇
- C: 吸入色甘酸钠
- D: 口服麻黄碱

答案：B

53. 静脉滴注给予万古霉素，滴注时间应该控制的时间是

- A: 2 小时以上
- B: 4 小时以上
- C: 6 小时以上
- D: 1 小时以上

答案：A

54. 再生障碍性贫血、巨幼细胞性贫血可导致

- A: 血红蛋白生成减少
- B: 红细胞生成减少
- C: 红细胞生成过多
- D: 红细胞丢失过多

答案：B

55. 沿静脉出现迂回线状色素沉着的是（）

- A: 阿霉素
- B: 氟尿嘧啶
- C: 博来霉素
- D: 吉非替尼

答案：B

56. 给予(透析患者)维生素 B、维生素 C 的依据是

- A: 透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛
- B: 有助于机体合成红细胞
- C: 腹膜透析容易丢失水溶性维生素
- D: 肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素 D

答案：C

57. (2017 年真题) 抗结核联合治疗方案中可出现橘红色尿的药物是 ()

- A: 乙胺丁醇
- B: 利福平
- C: 左氧氟沙星
- D: 吡嗪酰胺

答案：B

58. 当药品存在安全隐患，需要进行召回时，决定召回药品的名称、规格、生产商、召回范围、召回级别、主要执行者等事宜的相关人员应该是

- A: 业务院长
- B: 药品质量安全管理小组成员
- C: 质量部人员
- D: 药剂科负责人

答案：B

59. 能显示药师的文献评价能力和技巧的是

- A: 对问题进行确定并归类
- B: 形成答案并以口头形式提供给询问者

C: 随访了解效果，并建立档案

D: 对查阅的资料进行评价、分析和整理

答案：D

60. (2016 年真题) 患者，男，70 岁，两周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院、目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是 ()。

A: 阿司匹林

B: 利伐沙班

C: 肝素

D: 氯吡格雷

答案：A

61. 根据《中华人民共和国药典临床用药须知》，使用前必须做皮试的药物是

A: 红霉素

B: 氨苄西林

C: 维生素 K1

D: 克林霉素

答案：B

62. 辛伐他汀

A: 宜餐前服用

B: 宜清晨服用

C: 宜餐后服用

D: 宜睡前服用

答案：D

63. 增加胃肠蠕动，影响同服药物吸收

- A: 四环素+硫酸亚铁
- B: 西咪替丁+格列本脲
- C: 青霉素+丙磺舒
- D: 多潘立酮+维生素 C

答案：D

64. 无症状菌尿

- A: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次（同一菌株），尿细菌数 $>10^5$ cfu / ml
- B: 宜选用毒性小的抗菌药物
- C: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再次出现菌尿，菌种与上次相同
- D: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同

答案：A

65. 下述药物中，具有肝药酶诱导作用的是

- A: 西咪替丁
- B: 卡马西平
- C: 胺碘酮
- D: 环丙沙星

答案：B

66. 急性尿失禁首选哪种药物

- A: 抗胆碱能药物
- B: 钙通道阻滞剂
- C: 非甾体抗炎药

D: 选择性 α_1 受体激动药

答案：A

67. 药物过量、毒性反应、继发反应、后遗效应、致畸、致癌、致突变作用归属

A: 药物制剂因素

B: 药动学相互作用

C: 药物的使用

D: 药理作用

答案：D

68. 患者，女，44 岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断口服沙丁胺醇片 4mg tid 治疗，没有规律用药治疗。近日，因秋冬季节交替，出现明显喘憋、话不成句，被紧急送往医院。

A: 沙丁胺醇气雾剂

B: 福莫特罗干粉吸入剂

C: 沙美特罗-氟替卡松干粉吸入剂

D: 沙丁胺醇片

答案：C

69. 与西咪替丁、喹诺酮类及大环内酯类药物合用，应减少其用量的药品是

A: 孟鲁司特

B: 噻托溴铵

C: 异丙托溴铵

D: 氨茶碱

答案：D

70. 低危患者

A: 立即进行抢救治疗

B: 先观察（血压及危险因素）数周，然后决定是否进行药物治疗

C: 观察相当一段时间，再决定是否进行药物治疗

D: 立即使用抗高血压药物

答案：C

71. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速作出准确判断，及时采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

A: 10～20 分钟

B: 5～10 分钟

C: 15～30 分钟

D: 20～30 分钟

答案：C

72. 吩噻嗪类抗精神病药中毒时若癫痫发作应给予

A: 间羟胺

B: 阿托品

C: 地西泮

D: 有机硫类

答案：C

73. 治疗类风湿关节炎时，需至少连服 6 个月才能宣布无效，可引起视网膜变性而致失明的药物为

A: 来氟米特

B: 氯喹

C: 甲氨蝶呤

D: 柳氮磺吡啶

答案: B

74. 大多数慢性汞中毒患者中毒的主要原因是 ()

A: 饮食

B: 环境污染

C: 长期吸入汞蒸气

D: 被投毒

答案: C

75. 患者，女，65 岁，今日因天气骤变出现急性支气管炎症状，出现喘息困难，无其他基础疾病，可给予的治疗药物是

A: 马来酸氯苯那敏片 4~8mg tid

B: 喷托维林 25mg tid

C: 沙丁胺醇气雾剂 1~2 喷 q6h

D: N-乙酰半胱氨酸片 600mg bid

答案: C

76. 患者，男，45 岁，患有高血压，因感冒发热，咽痛，流鼻涕到药店买药，药师不应推荐其使用的药物是 ()

A: 维 C 银翘片

B: 速感宁胶囊

C: 速克感冒片

D: 复方酚咖伪麻胶囊

答案: D

77. 可用于治疗夜盲症的药物是

- A: 维生素 C
- B: 维生素
- C: 复合维生素 B
- D: 维生素 A

答案：D

78. 根据药物对胎儿的危害,美国 FDA 将妊娠用药毒性分为 A、B、C、D、X 五个级别,依那普利的妊娠毒性分级是()

- A: X 级
- B: D 级
- C: C 级
- D: A 级

答案：B

79. 以甲硝唑口颊片治疗口腔溃疡,最合理的用药方案是()

- A: 三餐前 1 小时含服
- B: 三餐前含服
- C: 三餐后含服
- D: 三餐前 10 分钟含服

答案：C

80. 引起视网膜变性而致失明,服药半年左右应查眼底 DMARDs 是

- A: 氯喹
- B: 环孢素
- C: 硫唑嘌呤
- D: 利妥昔单抗

答案：A

81. 可出现认知功能受损、谵妄、跌倒的是

- A: 苯二氮
- B: 双嘧达莫
- C: 甲氧氯普胺
- D: 哌替啶

答案：A

82. 血清天门冬氨酸氨基转移酶正常参考区间是

- A: 成人<40U/L
- B: 男性 11~50U/L
- C: 男性<40U/L
- D: 成人<50U/L

答案：A

83. 下列药物中，适宜在餐前服用的是

- A: 双氯芬酸钠片
- B: 西咪替丁片
- C: 莫沙必利片
- D: 伊马替尼片

答案：C

84. 以下用于治疗寻常痤疮的药物中，属于非处方药的是

- A: 阿达帕林
- B: 维胺酯
- C: 过氧苯甲酰
- D: 异维 A 酸

答案：C

85. 沿静脉出现迂回线状色素沉着的是

- A: 氟尿嘧啶
- B: 白消安
- C: 柔红霉素
- D: 博来霉素

答案：A

86. 中等强度镇痛选用

- A: 布桂嗪
- B: 多奈哌齐
- C: 丙戊酸钠
- D: 佐匹克隆

答案：A

87. 癫痫持续状态首选的药物是

- A: 拉莫三嗪
- B: 丙戊酸钠
- C: 卡马西平
- D: 地西泮

答案：D

88. 患儿，男，6 个月，体重 9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有乒乓球感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

- A: 400IU
- B: 4000IU
- C: 10000IU

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

D: 6000IU

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/718011073045007022>