

## 康复治疗三基考试整理题

### 康复试题（一）

#### 一、单选题

1. 康复医学强调（E）

A 采用运动

B 采用理疗

C 回归社会

D 生活独立能力

E 采用综合措施

2. 康复得基本内涵不包括（D）

A 采用综合措施

B 强调功能训练、再训练

C 以残疾者与患者得功能障碍为核心

D 以残疾者与患者得器质障碍为核心

E 以提高生活质量、回归社会为最终目标

3. 以下属于单轴关节得就是（E）

A 挠腕关节

B 拇指腕掌关节

C 髋关节

D 肩关节

E 挠尺近侧关节

4. 一患者神经系统受损后出现静止性震颤，最有可能哪个部位出现病变（A）

A 基底节

B 脊髓后索

C 小脑

D 边缘系统

E 前庭系统

5. 烧伤常用部位夹板一般疗程就是（E）

A 2~5 个月

B 1~3 个月

C 2~4 个月

D 3~5 个月

E 3~6 个月

6、造成大腿假肢呈划弧步态得原因就是 ( A )

A 假肢太长

B 假肢太短

C 接受腔太松

D 膝关节不稳定性

E 髁外展肌过强

7、康复医学得一级预防就是指 ( A )

A 健身锻炼与合理得生活习惯，防止疾病得发生

B 发病后，康复介入，预防继发性功能障碍得发生

C 发生功能障碍后，通过康复锻炼，防止功能障碍得加重

D 康复治疗过程需要临床治疗，临床治疗过程也需要康复治疗介入

E 康复医学强调主动锻炼，提高机体对环境得适应力与对疾病得抵抗力

8、中国助残日 ( B )

A 每年四月第三个星期日 B 每年五月第三个星期日 C 每年六月第三个星期日

D 每年七月第三个星期日 E 每年八月第三个星期日

9、康复医学得共性原则不包括 ( D )

A 因人而异

B 循序渐进

C 持之以恒

D 被动参与

E 全面锻炼

10、关于视感知发育阶段，精细辨别物体阶段就是指 ( C )

A 出生~2个月

B 3~6个月

C 7个月后

D 2岁

E 18个月后

11、心电运动试验得分类不包括 ( D )

A 极限运动试验

B 症状限制性试验

C 低水平运动试验

D 等长收缩试验

E 定量行走

试验

12、患者，男，30岁，因事故被热气体烧伤躯干前面与双上肢，患者水泡较小，可见网状

栓塞血管，微痛，感觉较迟钝，其烧伤深度与面积为 ( E )

A Ⅲ度，31%

B 深Ⅱ度，30%

C 浅Ⅱ度，30%

D 深Ⅱ度，36%

E 浅Ⅱ度，36%

13、脑卒中患者偏瘫侧肢体分期处于BrunnstromⅡ期，康复治疗措施正确得就是(A)

A 控制肌痉挛与异常运动模式，促进分离运动得出现

B 增强患侧肢体肌力、耐力训练

C 增强患侧肢体平衡与协调性训练

D 恢复提高肌张力，诱发主动运动

E 控制肌痉挛，促进选择性运动与速度运动更好得恢复

14、制动后多长时间肌肉重量下降最明显 ( C )

A 1~3天

B 3~5天

C 5~7 天

D 7~9 天

E 9~12 天

15、关于人体发育叙述正确得就是 ( E )

A 3 岁时已接近成人脑重

B 脊髓成熟得重要标志为髓鞘由下向上逐渐形成

C 小儿身高与体格明显增大出现在青春期

D 生长发育得不平衡性表现仅在青春期生长发育阶段

E 心里过程包括认知过程、情绪与情感过程以及意志过程

16、粗大运动得发育顺序正确得就是 ( C )

A 抬头、翻身、坐、爬、站、跑、走、跳跃

B 抬头、翻身、爬、坐、站、走、跑、跳跃

C 抬头、翻身、坐、爬、站、走、跑、跳跃

D 抬头、翻身、坐、爬、走、站、跑、跳跃

E 抬头、翻身、坐、站、爬、跑、走、跳跃

17、记忆类型中，出现最早得就是 ( A )

A 运动型记忆

B 情绪性记忆

C 形象性记忆

D 对比记忆

E 语词记忆

18、下肢烧伤后，若膝关节后侧烧伤，膝关节应保持 ( E )

A 微屈  $5^{\circ}\sim 10^{\circ}$  B 微屈  $10^{\circ}\sim 20^{\circ}$  C 屈曲  $20^{\circ}\sim 25^{\circ}$  D 屈曲  $25^{\circ}\sim 35^{\circ}$  E

伸直位

19、韦氏智力量表中，智商等级划分正确得就是 ( D )

A IQ 120~129 为极超常

B IQ 110~119 为超常

C IQ 90~109 为高于平常

D IQ 80~89 为低于平常

E IQ 70~79 为平常

20、根据实验观察，波长在 3cm 左右得微波主要被哪个组织吸收

( A )

A 表皮

B 脂肪

C 肌肉

D 骨骼

E 内脏器官

21、正常步态中足跟着地到足放平作用于膝关节得肌群主要就是

( B )

A 胫前肌

B 股四头肌

C 髂腰肌

D 臀大肌

E 腓绳肌

22、支撑相占步行周期得 ( D )

A 20%

B 40%

C 50%

D 60%

E 80%

23、穿衣失用属于 ( B )

A 空间定向失认

B 视觉定向失认

C 听觉失认

D 触觉失认

E 身体失认

24、大剂量紫外线可以使 DNA 严重受损，导致细胞得死亡，其最大得吸收光谱为 ( C )

A 313nm

B 280nm

C 297nm

D 302nm

E 253、7nm

25、身体得各部位对紫外线得敏感性不同，敏感性最低得部位就是 ( D )

A 肢体

B 手足

C 颈、面

D 胸、腹

E 腰、背

26、一个伤口肉芽新鲜得创面，为促进伤口愈合，紫外线得剂量 ( A )

A 亚红斑量

B 强红斑量

C 红斑量

D 超强红斑量

E 弱红斑量

27、言语功能恢复得高峰期失语症患者发病 ( C )

A 1~3 个月

B 2~4 个月

C 3~6 个月

D 4~7 个月

E 5~8 个月

28、常发生习惯性脱位得关节就是 ( A )

A 肩关节

B 膝关节

C 髋关节

D 腕关节

E 肘关节

29、患者，男，35 岁，建筑工人，半个月前不慎从高空摔伤，导

致 T12 骨折并双下肢截瘫，查体双下肢肌力 3 级，腱反射及踝反射活跃，肌张力高。用下列哪种电诊断方法能推测患者得预后（ B ）

A BAEP

B SEP

C VEP

D MCV

E SCV

30、临床上最常见得颈椎病类型（ B ）

A 脊髓型颈椎病

B 神经根型颈椎病

C 椎动脉型颈椎病

D 交感型颈椎病

E 混合型颈椎病

31、没有明确客观对象与具体观念内容得提心吊胆与恐惧不安得心情常见于下列哪种神经症

（ B ）

A 恐惧症

B 焦虑症

C 强迫症

D 疑病症

E 癔症

32、干扰电疗法最常用得治疗技术就是（ A ）

A 固定法

B 移动法

C 抽吸法

D 干扰电振动按摩法

E 虹吸法

33、某患者改良 Barthel 指数评分为 60 分，其意义为（ C ）

A 极其严重功能障碍

B 严重功能障碍

C 中度功能障碍

D 基本生活自理

E 完全生活自理

34、双下肢长度差异超过多少时，可出现跳跃步态（C）

A 2cm

B 3cm

C 4cm

D 5cm

E 6cm

35、听觉诱发电位得潜伏期范围就是多少秒（A）

A 0~4、5

B 0~5、5

C 4、5~9、5

D 5、5~10、5

E 1~5、0

36、国务院批准《五类残疾标准》不包括（C）

A 听力、语言残疾

B 视力残疾

C 内脏残疾

D 智力残疾

E 肢体残疾

37、运动性言语中枢位于优势半球得（A）

A 额下回

B 额上回

C 额中回

D 中央前回

E 中央后回

38、支配大腿内侧群肌肉得神经就是（A）

A 闭孔神经 B 坐骨神经 C 股神经 D 阴部神经 E 隐神经

39、听觉发育完善得年龄就是（C）



- A 2 岁
- B 3 岁
- C 4 岁
- D 5 岁
- E 8 岁

40、在超短波进行微热量治疗时，大功率治疗仪浅作用时电极皮肤间隙为（C）

- A 1~2cm
- B 2~3cm
- C 3~4cm
- D 4~5cm
- E 5~6cm

## 二、就是非题

1、力点位于阻力点与支点中间，主要作用就是传递动力与保持平衡，故称为平衡杠杆（×）

2、在导体中，电荷流动方向不随时间而改变得电流称为直流电（√）

3、频率高于 20kHz 得声波为超声波（√）

4、正常成人颈干角平均  $127^\circ$ （ $125^\circ \sim 130^\circ$ ）若大于此角为髋内翻（×）

5、手得良好功能位就是腕背屈  $40 \sim 45^\circ$ ，手指微屈（√）

6、康复医学工作模式就是专业化分工模式（×）

7、床向轮椅转移时，轮椅放在患者得患侧，轮椅与床尾呈  $30 \sim 45^\circ$ （×）

8、直流电疗法，成人治疗得电流密度为  $0.03 \sim 0.1 \text{mA/cm}^2$ （√）

9、癌痛 2 级需要肌内注射麻醉剂（×）

10、移动臂与构成关节得远端骨长轴平行（×）

11、肘关节屈得活动范围就是  $0 \sim 180^\circ$ （√）

12、在超声波疗法中，声头要用 75%得酒精消毒，然后放在声头

架上 (√)

13 烧伤最常见得死亡原因就是感染 (√)

14、视觉信息反馈处理阶段就是 7 个月以后 (×)

15、康复医学史以疾病为中心 (×)

16、肩关节外旋得正常关节活动范围就是 0~60° (×)

17、狭窄性腱鞘炎最常放生在手与腕部 (√)

18、伴有糖尿病或肾病得高血压患者降压目标值为 130/85mmHg 以下 (√)

19、脊柱韧带中，抗张力最强得就是前纵韧带 (√)

20、长波紫外线红斑反应得潜伏期为 6~8 小时 (√)

康复医学试题 (二)

一、单选题

1.联合国决定“国际残疾人年”为 (B)

A 1980 年

B 1981 年

C 1983 年

D 1985 年

E 1982 年

2、喉腔最狭窄得部位就是 (D)

A 喉口

B 前庭裂

C 喉中间腔

D 声门裂

E 声门下列

3、痉挛肌点刺激疗法得频率与波宽分别为 (A)

A 频率 0、66~1Hz，波宽 0、1~0、5ms

B 频率 1~100Hz，波宽 0、1~1ms

C 频率 0、66~1Hz，波宽 0、01~0、2ms

D 频率 0、66~1Hz，波宽 0、1~1ms

E 频率 2~160Hz，波宽 0、1~1ms

4、康复学科内团队不包括 ( E )

A 物理治疗师

B 作业治疗师

C 康复医师

D 运动医学医师

E 骨科医生

5、进行直流电或直流电离子导入时电极衬垫得厚度要求 ( A )

A > 1cm

B 0、3~0、4cm

C 0、5~0、6cm

D 0、7~0、8cm

E 0、8~1、0cm

6、小儿注意力不集中，容易疲劳，就是由于下列哪一项发育不全 ( C )

A 神经细胞

B 神经树突

C 神经髓鞘

D 神经皮质

E 神经轴突

7、直流电药物离子导入疗法中，有阴极导入得药物就是 ( E )

A 维生素 C

B 碘

C 氯

D 溴

E 以上都是

8、关于残疾得概念，错误得就是 ( A )

A 功能障碍就就是残疾

B 残疾可以就是由于身心疾病导致

C 残疾必然显著影响日常生活活动能力

D 残疾就是长期、持续或永久性得功能障碍

E 残疾得功能障碍往往不能通过单纯得临床治疗而痊愈

9、前交叉韧带最主要得作用就是 ( C )

A 增加膝关节得稳定性

B 缓冲外力得冲击

C 限制胫骨向前移位

D 限制胫骨旋转

E 限制胫骨向后移位

10、与脐平面得皮肤感觉区相对应得脊髓节段为 ( C )

A T6

B T8

C T10

D L1

E T12

11、患者，女性，50岁，脑卒中后右侧肢体偏瘫。目前患侧能捏及松开拇指，手指能半随意地小范围伸展，其Brunnstrom分期处于 ( D )

A 1期

B 2期

C 3期

D 4期

E 5期

12、丹毒又称为 ( D )

A 管状静脉炎

B 网状静脉炎

C 毛细血管炎

D 网状淋巴管炎

E 管状淋巴管炎

13、前臂旋前、旋后作业训练就是 ( E )

A 打字

B 书法

- C 下棋
- D 捏饺子
- E 拧水龙头

14 国内超短波治疗机得波长常用为 ( A )

- A 7、37m
- B 7、37cm
- C 7、37km
- D 7、37mm
- E 7、37nm

15、味觉发育得关键时期 ( A )

- A 4~5 个月
- B 出生后
- C 1~2 个月
- D 2~3 个月
- E 3~4 个月

16、最强大得脊柱伸肌就是 ( C )

- A 背阔肌
- B 斜方肌
- C 竖脊肌
- D 腰大肌
- E 腰方肌

17、鸭步常见于下列何种情况 ( B )

- A 臀大肌无力
- B 臀中肌无力
- C 股四头肌无力
- D 胫前肌无力
- E 以上皆有可能

18、让患者从不同场景、不同角度、与不同得人合影得照片中寻找她熟悉得人，属于 ( C )

- A 物品失认训练方法

- B 色彩失认训练方法
- C 面容失认训练方法
- D 听觉失认训练方法
- E 体觉失认训练方法

19、有一患者右踝关节扭伤 3 天，肿胀疼痛，现用超声波治疗，正确得操作治疗方法就是（D）

- A 固定法
- B 移动发
- C 接触法
- D 水下法
- E 旋转法

20、患者，女，15 岁，因车祸致右踝以下足严重损伤，骨科医生判断损伤部位组织无法修复存活，需要进行小腿截肢（B）

- A 右踝关节处
- B 小腿中下 1/3 处
- C 小腿 1/2 处
- D 小腿中上 1/3 处
- E 膝关节下 1/4 处

21、孤独症得核心症状为（D）

- A 局限得兴趣与行为
- B 沟通与交流障碍
- C 智能与认知障碍
- D 社会交往能力缺陷
- E 感觉异常

22、力与力臂得乘积在物理学中表示得就是（A）

- A 力矩
- B 应力
- C 变形
- D 应变
- E 阻力矩

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/718026006054006033>