

2024 甘肃省通渭县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题大全【能力提升】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于医师用药咨询的是

- A: 注射剂溶媒的正确选择
- B: 栓剂、气雾剂的正确使用方法
- C: 抗菌药物的合理应用
- D: 减肥、补钙、补充营养素

答案：C

2. 切忌直接静脉注射，应于临用前稀释，否则不仅会引起剧痛，且可致心脏停搏的药物是

- A: 两性霉素 B
- B: 氯化钾
- C: 青霉素
- D: 头孢曲松钠

答案：B

3. 药学服务是药师对患者的关怀和责任。下列人员中，属于药学服务的重要人群是

- A: 住院患者
- B: 门诊患者
- C: 过敏体质者
- D: 社区患者

答案：C

4. 能降 LDL 也降 HDL 的药物是

- A: 塞伐他汀
- B: 普罗布考
- C: 非诺贝特
- D: 烟酸

答案：B

5. 一般情况下，老年人应该控制总胆固醇测定值低于

- A: 5.2mmol / L
- B: 6.2mmol / L
- C: 5.1mmol / L
- D: 6.1mmol / L

答案：A

6. 关于他汀类和贝特类的联合使用，下列说法正确的是

- A: 早晚分别服用
- B: 早晨服用贝特类、而晚上服用他汀类
- C: 晚间服用
- D: 早晨服用

答案：B

7. (2016 年真题) 患者，男，46 岁，因心绞痛伴房颤，给予维拉帕米治疗。维拉帕米的禁忌症是 ()。

- A: 心力衰竭
- B: 双侧肾动脉狭窄
- C: 冠心病

D: 痛风

答案：A

8. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 500mol/L；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

A: 尼美舒利

B: 对乙酰氨基酚

C: 阿司匹林

D: 布洛芬

答案：B

9. 可引起体位性低血压，服用后，患者由卧而坐起或由坐而站起等从低位向高位的转换动作时均应缓慢，动作不能突然的药物是

A: 卡马西平

B: 左氧氟沙星

C: 特拉唑嗪

D: 头孢哌酮

答案：C

10. 与贝母枇杷糖浆不宜联用的药物是

A: 苯巴比妥

B: 氢氧化铝

C: 氨茶碱

D: 乳酶生

答案：C

11. 判别“大三阳”区别于“小三阳”的主要检查项目为

- A: 抗-HBe(+)
- B: HBeAg(+)
- C: 抗-HBs(+)
- D: 抗-HBc(+)

答案：B

12. 可提示轻度黄疸的是

- A: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- B: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$
- C: $>342 \mu\text{mol/L}$
- D: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

答案：A

13. 药物治疗的效果不以货币为单位表示，而是用其他量化的方法表达治疗目的的药物经济学评价方法是

- A: 最大成本法
- B: 成本-效果分析
- C: 成本-效益分析
- D: 最小成本法

答案：B

14. 检查栓剂 / 软膏剂的异嗅和散剂的气味属于

- A: 听觉试验
- B: 嗅觉试验
- C: 视觉试验
- D: 触觉试验

答案：B

15. 可引起驾驶员定向力障碍的药物是

- A: 苯噻啶
- B: 西咪替丁
- C: 阿托品
- D: 氨苯蝶啶

答案：B

16. 早晨因咳嗽和打喷嚏引起的头痛，提示可能是

- A: 脑肿瘤
- B: 脑膜炎
- C: 脑血管意外
- D: 动脉瘤

答案：A

17. 长期服用避孕药

- A: 可使驾驶员视物模糊或辨色困难
- B: 可使驾驶员出现眩晕和幻觉
- C: 可导致驾驶员多尿或多汗
- D: 可使驾驶员出现定向力障碍

答案：D

18. 心力衰竭的支气管哮喘禁用

- A: 强心苷
- B: β 受体阻断剂
- C: RAAS 抑制剂
- D: 利尿剂

答案：B

19. 支气管哮喘急性发作期(轻度)可选用的药物是

- A: 沙美特罗
- B: 孟鲁司特
- C: 沙丁胺醇
- D: 异丙托溴铵

答案: C

20. 患者李某，男，45 岁，近日感觉头痛、头晕、心悸，眼花、耳鸣、失眠、乏力等症状，血压为 160 / 100mmHg。

- A: ACEI
- B: 利尿剂
- C: β 受体阻断剂
- D: AR

答案: A

21. (新药 4 期临床评价的局限性) II 期临床试验很难发现"低于 1%发生频率"的不良反应，属于

- A: 考察不全面
- B: 管理漏洞
- C: 观察时间短
- D: 病例数量少

答案: D

22. 治疗胃食管反流病，莫沙必利的正确服药时间是

- A: 三餐前 30min
- B: 症状发作时、餐后 1.5h 和睡前
- C: 早餐前 30min
- D: 餐后、睡前

答案：A

23. 吸烟后延缓胃溃疡的愈合，而加重出的药物是

- A: 西咪替丁
- B: 胰岛素
- C: 呋塞米
- D: 氯丙嗪

答案：A

24. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

- A: 氯霉素
- B: 青霉素
- C: 红霉素
- D: 链霉素

答案：D

25. 关于药物作用相加或增加疗效的举例，磺胺甲噁唑 (SMZ) 抑制二氢叶酸合成酶，甲氧苄啶 (TMP) 抑制二氢叶酸还原酶，二者联用使细菌的叶酸代谢受到双重阻断，抗菌作用增强，是属于

- A: 保护药品免受破坏
- B: 促进机体的吸收利用
- C: 作用于不同的靶位
- D: 延缓或降低抗药性

答案：C

26. 运动员禁用药物中， β 受体阻断剂产生的危害是

- A: 诱发高血压、冠心病、心肌梗死、脑动脉硬化和脑血管破裂，以及引起肝癌、肾癌等疾患
- B: 长期使用后突然停药，则会引发心跳过速、心肌梗死，乃至突然死亡
- C: 易造成人体严重脱水、肾衰竭
- D: 能使伤口进一步恶化、导致呼吸困难和药物依赖

答案：B

27. 脑出血急性期的病死率为

- A: 10%~15%
- B: 20%~30%
- C: 40%~45%
- D: 30%~40%

答案：D

28. 在治疗痔疮的药物中，作为硬化剂或萎缩剂的是

- A: 九华膏
- B: 苯酚甘油-水溶液
- C: 草木犀流浸液片
- D: 地奥司明

答案：B

29. 合并闭角型青光眼的前列腺增生患者不宜选用的药物是()

- A: 非那雄胺
- B: 坦索罗辛
- C: 多沙唑嗪
- D: 托特罗定

答案：D

30. 患者，男，46 岁，拟行肠道手术，术前 1 天使用导泻药的方法是()

- A: 50%硫酸镁溶液口服
- B: 50%葡萄糖注射液湿敷
- C: 25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射
- D: 5%氯化钙注射液静脉滴注

答案：A

31. 患者，男，28 岁。咳嗽、咳痰，血常规提示白细胞及中性粒细胞正常，予阿奇霉素抗感染为

- A: 联合用药不适宜
- B: 无适应证用药
- C: 有禁忌证用药
- D: 过度治疗用药

答案：B

32. 美国食品药品监督管理局(FDA)根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别卡托普利在妊娠中晚期使用属于药物妊娠毒性分级

- A: B 级
- B: D 级
- C: C 级
- D: A 级

答案：B

33. 患者，男，50 岁，临床诊断为“焦虑障碍”，给予氟西汀 20mgqd 治疗。对该患者的用药指导，错误的是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 氟西汀应于睡前服用
- B: 不能突然停止服用氟西汀
- C: 服用氟西汀期间不能饮酒
- D: 不得随意自行调整氟西汀剂量

答案：A

34. 药师在进行药学服务时，经常查阅一些相关网站，获取一些有用信息} 中国药学会的网址是

- A: www. cm
- B: www. cp
- C: org. cn
- D: org. cn

答案：D

35. 患者，女，56 岁。患直肠癌，其粪外观可呈现

- A: 乳凝块便
- B: 细条便
- C: 白陶土样便
- D: 鲜血便

答案：B

36. 青霉素常采用的剂量单位是

- A: μg
- B: g
- C: mg
- D: IU

答案：D

37. 在现代社会，药学信息的收集已不困难，但很容易出现信息量大但杂乱无章和重复的现象。药师必须通过专业的药学信息检索，对众多良莠不齐的药物信息进行客观、合理的分析评价，去伪存真，挑出有专业证据的高质量信息，指导临床合理用药。

- A: 中国国家处方集
- B: 新编药物学
- C: 药物不良反应
- D: 国家基本药物处方集

答案：A

38. 对于围手术期抗菌药物的预防性应用原则，说法错误的是

- A: 应尽量选择单一抗菌药物预防用药，避免不必要的联合使用
- B: 对于清洁手术（Ⅰ类切口），通常不需预防用抗菌药物
- C: 若术前发现有耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）定植的可能或者该医疗机构 MRSA 发生率高，可选用氨曲南预防感染
- D: 针对革兰阴性杆菌可用氨曲南、磷霉素或氨基糖苷类

答案：C

39. 使用后不能饮酒或含酒精饮料，以免发生“双硫仑样反应”的药物是

- A: 西地碘含片
- B: 氯己定含漱液
- C: 甲硝唑含漱液
- D: 地塞米松粘贴片

答案：C

40. 与地西泮合用会影响其代谢导致镇静催眠作用增强的药物是()

- A: 伏立康唑

B: 铝碳酸镁

C: 维生素 B

D: 阿司匹林

答案：A

41. 博来霉素

A: 出血性膀胱炎

B: 溶血性尿毒症

C: 肺纤维化

D: 心脏毒性

答案：C

42. 服用抗结核药异烟肼时，不

A: 吸烟

B: 吃鱼

C: 饮酒

D: 喝茶

答案：B

43. (2018 年真题) 服用华法林期间应进行监测的指标是 ()

A: ALT

B: INR

C: RBC

D: APTT

答案：B

44. (2015 年真题) 下列药物属于肝药酶诱导剂的是 ()。

A: 卡马西平

- B: 氟康唑
- C: 胺碘酮
- D: 环丙沙星

答案：A

45. (2019 年真题) 用药时宜限制饮水的药物是

- A: 胶体果胶铋胶囊
- B: 利托那韦片
- C: 苯溴马隆胶囊
- D: 环丙沙星片

答案：A

46. 易经乳汁分泌的药物的特征是：

- A: 蛋白结合率高？
- B: 分子量大？
- C: 弱酸性？
- D: 脂溶性大？

答案：D

47. 患儿，男，5 个月，体重 9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有“乒乓球”感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

- A: 婴幼儿满 6 个月后，将户外活动时间逐渐增加至每天 1-2 小时
- B: 维生素 D3 中毒，无需停服奶制品
- C: 直接接受阳光照射
- D: 可整天户外活动

答案：A

48. 下列情况不宜选用的抗高血压药，直立性低血压不宜选用

- A: 非二氢吡啶类钙拮抗剂
- B: 哌唑嗪
- C: ACEI
- D: 利尿药

答案：B

49. (2017 年真题) 半衰期大于 24h 的药物通常选择 ()

- A: 静脉滴注给药
- B: 每日给药 1 次
- C: 每个半衰期给药 1 次
- D: 2~3 个半衰期给药 1 次

答案：B

50. 由美国卫生系统药师学会出版的三级文献是

- A: 《马丁代尔药物大典》
- B: 《美国医院处方集服务处：药物信息》
- C: 《美国药典药物信息》
- D: 《新编药物学》

答案：B

51. 患者，男，42 岁。患艾滋病，进行抗病毒治疗。以下药物不属于核苷酸类逆转录酶抑制剂的是

- A: 奈韦拉平
- B: 拉米夫定
- C: 替诺福韦
- D: 双脱氧胞苷

答案：A

52. 餐前服用，可以充分附着于胃壁粘膜的药品是

- A: 复方铝酸铋片
- B: 二甲双胍片
- C: 甲氧氯普胺片
- D: 瑞舒伐他汀片

答案：A

53. 国际标准化比值是血栓性疾病患者实施抗凝治疗的依据，其正常参考区间是

- A: <0.8
- B: $0.8 \sim 1.5$
- C: >1.5
- D: 2

答案：B

54. 某患者，男，65 岁，高血压病史 5 年，先后服用硝苯地平片和硝苯地平控释片控制血压，近日曾饮酒和饮用多种饮料，出现血压波动的情况，到医院就诊。

- A: 建议单独用于不稳定性心绞痛
- B: 可降低心源性死亡的危险
- C: 有明显的肝肾毒性
- D: 为第一代短效钙通道阻滞剂

答案：D

55. 《国家非处方药目录》收载的缓泻药不包括

- A: 聚乙二醇粉剂
- B: 硫酸镁

C: 比沙可啶

D: 替加色罗

答案: D

56. 要求冷链运输管理的药品是

A: 第一类精神药品

B: 麻醉药品

C: 生物制品

D: 高警示药品

答案: C

57. (2018 年真题) 由带状疱疹所致的严重后遗神经痛, 应选的药物是
()

A: 芬太尼透皮贴剂

B: 卡马西平片

C: 对乙酰氨基酚片

D: 羟考酮缓释片

答案: B

58. 抗抑郁药司来吉兰用于伴前列腺增生症患者, 应评判为

A: 过度治疗用药

B: 无正当理由超适应证用药

C: 有禁忌证用药

D: 联合用药不适宜

答案: C

59. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及嗝气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有一 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 左氧氟沙星 500mgqd+呋喃唑酮 100mgbid+四环素 500mgqid+枸橼酸铋钾 220mgbid，疗程 2 周

B: 四环素 500mg tid+甲硝唑 400mg tid+艾司奥美拉唑 20mgbid+枸橼酸铋钾 220mgbid，疗程 2 周

C: 阿莫西林 1000mgbid+克拉霉素 500mgbid+艾司奥美拉唑 20mgbid+枸橼酸铋钾 220mgbid，疗程 2 周

D: 克拉霉素 500mgbid+左氧氟沙星 200mgbid+甲硝唑 400mgqid+艾司奥美拉唑 20mgbid，疗程 2 周

答案：B

60. 具有肾毒性，需要大量输注时，需同时给予利尿药的是

A: 紫杉醇

B: 多柔比星

C: 氟氯地平

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 顺铂

答案：D

61. 以下所列药品中，进餐时服用可减少脂肪吸收的药品是

- A: 奥利司他（减肥药）
- B: 吉非贝齐
- C: 阿昔莫司
- D: 苯扎贝特

答案：A

62. 下列药物信息源中，归属于一级文献资料的是

- A: 中国药学年鉴
- B: 中国药学杂志
- C: 新编药理学
- D: 中国药学文摘

答案：B

63. 可作为急性胰腺炎的症状指标是

- A: 磷酸激酶降低？
- B: 血清淀粉酶降低？
- C: 血清淀粉酶升高？
- D: 磷酸激酶升高？

答案：C

64. 关于癌症疼痛患者止痛药使用原则的说法，错误的是（）

- A: 应个体化用药
- B: 提倡无创给药方式，尽量口服
- C: 按阶梯给药
- D: 疼痛时用药，不痛时无需用药

答案：D

65. 在药学信息咨询服务中，应用二级信息资料的最突出优势是

- A: 有的还能提供疾病与药物治疗的基本知识
- B: 对一个具体问题所提供的信息简明扼要
- C: 可以很方便地对所需要的一级文献信息进行筛选
- D: 读者能自己评价信息，免受他人观点影响

答案：C

66. 药库管理人员根据药品用量和库存情况提出购药计划，向指定的药品经营单位采购，必须持有

- A: 五专管理
- B: 防盗设施
- C: 印鉴卡
- D: 基数卡

答案：C

67. 药师应及时向患者交待有关用药的注意事项，以避免误用药物，减轻患者不必要的恐慌，提高用药依从性。根据患者用药情况，发药时药师应有针对性的提示患者各类药物的应用注意事项。

- A: 患者一？
- B: 患者二？
- C: 患者四？
- D: 患者三？

答案：A

68. 在指导合理用药时，应交代宜在睡前服用的药物是()

- A: 双磷酸盐
- B: 苯妥英钠

C: 辛伐他汀

D: 硫酸亚铁

答案: C

69. 李某，男，45 岁，近日感觉头痛、头晕、心悸，眼花、耳鸣、失眠、乏力等症状，血压为 160/100mmHg。

A: 心律失常

B: 高血压

C: 冠心病

D: 心力衰竭

答案: B

70. 口服用于肠道感染或肠道手术前准备的药物是

A: 庆大霉素

B: 异烟肼

C: 妥布霉素

D: 新霉素

答案: A

71. 因体内肝酶不足，易发生灰婴综合征

A: 氯霉素

B: 米诺环素

C: 阿奇霉素

D: 庆大霉素

答案: A

72. 患者，男，59 岁，高血压病史 5 年，因头痛伴有恶心、呕吐就诊，MRI 检查结果显示蛛网膜下腔出血。为防治脑血管痉挛，早期宜选用的药物（）

- A: 硝苯地平
- B: 缬沙坦
- C: 尼莫地平
- D: 氟氯地平

答案：C

73. 便秘可选用的非处方药是

- A: 莫沙必利
- B: 酚酞
- C: 盐酸小檗碱
- D: 乳果糖

答案：D

74. 与左旋多巴合用，可提高疗效的是（）

- A: 克拉维酸钾
- B: 奥美拉唑
- C: 叶酸
- D: 苧丝肼

答案：D

75. 在消化性溃疡形成中起到关键作用的因素为

- A: 胃酸
- B: Hp 感染
- C: 胃黏膜屏障的完整性
- D: 胃黏膜血流减少

答案：A

76. 下列情况的首选药物是，高 TG 血症

- A: 他汀类
- B: 弹性酶
- C: 胆酸螯合剂+贝特类
- D: 贝丁酸类

答案：D

77. 已知对乙酰氨基酚的成人剂量为一次 400mg。一个体重为 10kg 的 11 个月大的婴儿感冒发热，按体表面积计算该患儿的处方剂量应为

- A: 50mg
- B: 90mg
- C: 75mg
- D: 100mg

答案：D

78. 以下可提示“高度黄疸，完全梗阻性黄疸”的总胆红素检查结果是

- A: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- B: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$
- C: $>342 \mu\text{mol/L}$
- D: $<85.5 \mu\text{mol/L}$

答案：C

79. 严重肝功能减退病人常伴功能性肾功能不全，以致使“经肝肾两种途径清除”的药物的血药浓度很高，因此用药原则是

- A: 须谨慎使用，必要时减量给药
- B: 一般无须调整剂量

C: 必须减量应用

D: 尽可能避免使用

答案: C

80. (2018 年真题) 患者，男，72 岁，患有阿尔茨海默病，给予卡巴拉汀每日 3mg 治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是 ()

A: 每日清晨空腹口服

B: 每日早晚空腹口服

C: 每晚睡前口服

D: 每日早晚与食物同服

答案: D

81. 关于患者用药注意事项的说法错误的是 ()

A: 应定期监测地高辛血药浓度

B: 应注意观察是否有黑便

C: 在患者症状好转后,应立即停用比索洛尔

D: 应定期监测血压、心率

答案: C

82. 下列白细胞计数中，属于不正常的是

A: 成人 $4.3 \times 10^9 / L$

B: 新生儿 $15.0 \times 10^9 / L$

C: 成人 $3.5 \times 10^9 / L$

D: 成人 $5.0 \times 10^9 / L$

答案: C

83. 能够给予当即解答的就当即解答

A: 解释的技巧

- B: 及时回答不拖延
- C: 保护患者的隐私
- D: 特别关注特殊人群

答案：B

84. 在检查尿沉渣的项目中，最能提示是肾实质性病变的证据是

- A: 尿沉渣磷酸盐结晶
- B: 尿沉渣结晶
- C: 尿沉渣管型
- D: 尿沉渣白细胞

答案：C

85. 治疗胃病的药物

- A: 去氨加压素
- B: 胃黏膜保护剂
- C: 甘草合剂
- D: 硝酸甘油

答案：B

86. 填写具体；如患卵巢囊肿合并肺部感染注射头孢曲松引起不良反应，应填写肺部感染

- A: ADR / ADE 过程描述
- B: 用药起止时间
- C: 用药原因
- D: 不良反应 / 事件的结果

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

87. 孕妇服用过量可诱发新生儿产生坏血病的药品是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/718053113042007022>