

2023 年执业药师考试模拟试题与答案

2023 年执业药师考试模拟试题与答案[一]

根底知识

一、以下题每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最正确答案。

1. 新斯的明用于去神经的骨骼肌和眼那么出现

- A. 肌肉松弛，瞳孔扩大
- B. 肌肉松弛，瞳孔缩小
- C. 肌肉兴奋，瞳孔缩小
- D. 肌肉兴奋，瞳孔无变化
- E. 肌肉和瞳孔均无变化

答案：D

2. 手术后肠麻木常用

A. 毒扁豆碱 B. 新斯的明 C. 丙胺太林 D. 毛果芸香碱 E. 阿托品

答案：B

3. 某重症肌无力患者用新斯的明后，因过量出现腹痛、腹泻、流涎、出汗、瞳孔缩小、肌肉震颤和胆碱能危象。挽救药应是

A.阿托品 B. 新斯的明 C. 碘解磷定 D. 筒箭毒碱 E. 阿托品
+碘解磷定

答案：E

4. 重症肌无力的对因治疗药

A.糖皮质激素 B. 钙制剂 C. 新斯的明 D. 氯化钾 E. _____

答案：A

5. 重症肌无力患者有呼吸抑制和缺氧者禁用药除外

A.氨基糖苷类抗生素 B. 氯丙嗪 C. 吗啡 D. _____ E. 氯仿

答案：B

6. 患者有轻度重症肌无力应选用哪种药为宜

A.钙制剂 B. 新斯的明 C. 糖皮质激素 D. 氯化钾 E. _____

答案：B

7. 患者，男，36岁，患轻度震颤麻木，长期服用某药后肌僵直及运动缓慢的病症明显改善，但同时出现严重的消化道反响和体位性低血压。该病人服用的药物是

A.左旋多巴 B. 金刚烷胺 C. 卡比多巴 D. 司来吉兰 E. 苯海索

答案：A

8. 左旋多巴治疗震颤麻木的机制是

A.促使多巴胺释放

B. 补充脑中多巴胺

- C. 中枢抗胆碱作用
- D. 抑制外周多巴脱羧酶
- E. 直接冲动 DA受体

答案：B

9. 金刚烷胺治疗震颤麻木的作用机制除外

- A. 直接冲动 DA受体
- B. 抑制 DA的再摄取
- C. 促进多巴胺的释放
- D. 抗胆碱作用
- E. 在中枢转化为 DA而起作用

答案：E

10. 以下哪种结合用药治疗震颤麻木的方法是合理的最好的

- A. 左旋多巴+维生素 1
- B. 左旋多巴+卡比多巴
- C. 卡比多巴+维生素 B6
- D. 左旋多巴+维生素 B6+卡比多巴
- E. 多巴胺+苯海索

答案：D

11. 关于左旋多巴特点的表达哪项是错误的

- A. 疗效产生较慢

- B.对轻症效果好
- C.改善肌强直效果好
- D.缓解肌颤效果好
- E.运动缓慢效果好

答案：D

12. 服用左旋多巴治疗震颤麻木为进步疗效可同服

- A.维生素 B6 B.氯丙嗪 C.卡比多巴 D.利血平 E.单胺氧化酶 A抑制剂药

答案：C

13. 患者，女，20岁，因患癫痫大发作长期服用某药癫痫得到很好控制，但出现精神行为异常和齿龈增生，此药是

- A.苯巴比妥 B.卡马西平 C.苯妥英钠 D.扑痫灵 E.丙戊酸钠

答案：C

14. 癫痫小发作的首选药是

- A.____ B.丙戊酸钠 C.乙琥胺 D.卡马西平 E.苯妥英钠

答案：C

15. 某患者，有癫痫小发作合并大发作应选用的药是

- A.苯巴比妥 B.丙戊酸钠 C.苯妥英钠 D.卡马西平 E.乙琥胺

答案：B

16. 对癫痫大发作，小发作，精神运动性发作均有效的药物是

A. 苯妥英钠 B. 苯巴比妥 C. 丙戊酸钠 D. 卡马西平 E. 乙琥胺

答案：C

17. 治疗三叉神经痛应首选

A. 去痛片 B. 安定 C. 阿司匹林 D. 卡马西平 E. 苯妥英钠

答案：D

18. 治疗癫痫大发作或局限性发作，最有效的药物是

A. 安定 B. 乙琥胺 C. 苯妥英钠 D. 卡马西平 E. 丙戊酸钠

答案：D

19. 苯妥英钠不宜用于

A. 癫痫大发作 B. 癫痫持续状态 C. 癫痫小发作 D. 局限性发作 E. 精神运动性发作

答案：C

20. 属于阿片生物碱类药

A. 可待因 B. 哌替啶 C. 芬太尼 D. 美沙酮 E. 镇痛新

答案：A

21. 吗啡产生强大镇痛作用的机理是

A. 选择性抑制痛觉中枢

B. 镇静并产生欣快感

- C.模拟内性阿片肽的作用
- D.促进内性阿片肽的作用
- E.降低痛觉感受器的敏感性

答案：C

22. 以下哪项不是哌替啶的适应证

- A.创伤所引起的疼痛 B. 手术后疼痛 C. 晚期恶性肿瘤的疼痛
- D. 分娩止痛 E. 神经痛

答案：E

23. 吗啡用于其他镇痛药无效时的急性锐痛只是因为

- A.吗啡对于急性锐痛效力》对慢性钝痛的效力
- B.其成瘾性大
- C.吗啡治疗急性锐痛时，不产生副作用
- D.吗啡对急性锐痛有选择性作用 E. 达峰时间快，血药浓度高

答案：B

24. 心性哮喘可选用

- A.异丙肾上腺素 B. 阿托晶 C. 哌替啶 D. 肾上腺素 E. 地塞米松

答案：C

25. 雷尼替丁按化学构造是哪一类的 H₂受体拮抗剂

- A.咪唑 B. 呋喃 C. 噻唑 D. 吡啶 E. 哌嗪甲苯类

答案：B

26. 被列为非麻醉性镇痛药的是

A. 哌替啶 B. 可待因 C. 镇痛新 D. 芬太尼 E. 美沙酮

答案：C

27. 大剂量引起血压升高的镇痛药是

A. 吗啡 B. 镇痛新 C. 芬太尼 D. 哌替啶 E. 美沙酮

答案：B

28. 属于水杨酸类的药物

A. 吲哚美辛 B. 醋氨酚 C. 保泰松 D. 布洛芬 E. 阿司匹林

答案：E

29. 前列腺素合成酶抑制剂是

A. 美散痛 B. 氟哌啶醇 C. 阿司匹林 D. 氯丙嗪 E. 氢化可的松

答案：C

30. 患者，男，20岁，癫痫持续状态，作为首选. ____ 的最正确的给药途径是

A. 静脉注射 B. 口服 C. 肌肉注射 D. 皮下注射 E. 静脉点滴

答案：A

31. 能明显缩短快波睡眠的药物是

A. 苯巴比妥 B. ____ C. 氯丙嗪 D. 水合氯醛 E. 利眠宁

答案：A

32. 患者因腰肌劳损引起肌痉挛，临床上选用的中枢性骨骼肌松弛药是

A. 普鲁卡因 B. _____ C. 筒箭毒碱 D. 琥珀胆碱 E. 毒扁豆碱

答案：B

33. _____不具备以下哪项作用

A. 抗焦虑作用 B. 镇静，催眠 C. 抗抑郁作用 D. 抗惊厥作用 E. 中枢性肌肉松弛作用

答案：C

34. 常用的抗惊厥药除外

A. 苯巴比妥 B. 水合氯醛 C. 异戊巴比妥 D. _____ E. 口服硫酸镁

答案：E

35. 关于水合氯醛错误的表达是

A. 催眠作用迅速
B. 不缩短快波睡眠时相
C. 大剂量有抗惊厥作用
D. 平安范围比巴比妥类大
E. 用于顽固性失眠.

答案：D

36. 巴比妥类药物的用处哪项除外

A. 消除具有中枢兴奋作用药物所致的失眠

- B. 小儿高热惊厥
- C. 苯巴比妥常用于癫痫小发作
- D. 麻醉和麻醉前给药
- E. 苯巴比妥可用于高胆红素血症

答案：C

37. ____的临床应用哪项除外

- A. 治疗焦虑症 B. 治疗失眠症 C. 治疗癫痫 D. 夜惊和夜游症 E. 用于麻醉和麻醉前给药
- 答案：E
38. 吡格列酮是哪类构造的药物 A. 双胍类 B. 磺酰脲类 C. 噻唑烷二酮类 D. α - 葡萄糖苷酶抑制剂 E. 氢氯噻嗪类药物
- 答案：C

39. 炔雌醇的乙醇溶液与硝酸银试液产生白色是由于分子中有

- A. 羟基 B. 醇羟基 C. 乙炔基 D. 氟原子 E. 甲基酮

答案：C

40. 在合成唑类抗真菌药物的化学构造中，哪个基团是必需的

- A. 分子中至少含有一个羟基
- B. 分子中至少含有一个吡啶环
- C. 分子中至少含有一个咪唑或三氮唑环
- D. 分子中至少含有一个吡环
- E. 分子中至少含有一个哌嗪环

C

41. 氯丙嗪抗精神病作用机理是

- A. 阻断中脑-边缘系统通路和结节-漏斗通道的 DA受体
- B. 阻断中脑-边缘系统通路和中脑-皮质通路的 DA受体
- C. 阻断中脑-皮质通路和黑质-纹状体通路的 DA受体
- D. 阻断结节-漏斗通路和黑质-纹状体通路的 DA受体
- E. 中脑-边缘系统和黑质-纹状体通路的 DA受体

答案：B

42. 有癫痫史的精神分裂症患者的禁用药

- A. 氟哌啶醇 B. 三氟拉嗪 C. 氯丙嗪 D. 舒必利 E. 五氟利多

答案：C

43. 以下哪种情况下降温作用最

- A. 氯丙嗪+阿司匹林
- B. 氯丙嗪+哌替啶
- C. 氯丙嗪+异丙嗪
- D. 氯丙嗪+物理降温
- E. 氯丙嗪+地塞米松

答案：D

44. 有关氯丙嗪的药理作用，以下哪一项为哪一项正确的

- A. 阻断 α 受体及拟胆碱作用
- B. 过量可引起低血压，可用肾上腺素治疗

抑制促性腺素分泌，因此使催乳素分泌增加

D.抗精神病作用，不会产生耐受性 E. 大剂量可引起麻醉

答案：D

45. 氯丙嗪所引起的低血压可用

A.异丙肾上腺素 B. 肾上腺素 C. 后马托品 D. 去甲肾上腺素 E. 多巴胺

答案：D

46. 以下哪些不良反响对于丙米嗪是错误的

A.阿托品样副作用 B. 体位性低血压 C. 心律失常 D. 诱发消化道溃疡 E. 精神异常反响 答案：D

47. 丙咪嗪的作用特点哪项除外

A.抗抑郁作用起效慢
B.对精神分裂症的抑郁症明显
C.对正常人引起思睡乏力等
D.可用于单相型抑郁症
E.双相型抑郁症患者偶可促使抑郁转为躁狂

答案：B

48. 丙咪嗪主要用于治疗

A.躁狂症 B. 精神分裂症 C. 抑郁症 D. 焦虑症 E. 恐惧症

答案：C

49. 躁狂症的精神病患者，以下那组药全可选用

氯丙嗪、丙咪嗪、碳酸锂

B. 异丙嗪、丙咪嗪、碳酸锂

C. 氯丙嗪、碳酸锂、氟哌啶醇

D. 氟哌啶醇、丙咪嗪、_____ E. 氯丙嗪、碳酸锂、_____

答案：C

50. 吩噻嗪类药物锥体外系反响很小的药物

A. 氯丙嗪 B. 硫利哒嗪 C. 奋乃静 D. 三氟拉嗪 E. 氟奋乃静

答案：B

51. 关于舒必利描绘错误的选项是哪一项

A. 对纹状体的多巴胺受体作用不明显

B. 镇吐作用不明显

C. 不良反响少

D. 可用于治疗抑郁症

E. 亦可用于溃疡病

答案：B

52. 抗焦虑新药丁螺环酮的作用特点哪项除外

A. 低于镇静剂量既有明显抗焦虑作用

B. 大剂量有抗惊厥作用

C. 增强中枢抑制药作用不明显

D. 起效慢，但疗效与苯二氮卓类相当

E. 不良反响少

B

53. 叶酸用于治疗

- A. 溶血性贫血
- B. 自身免疫性贫血
- C. 巨幼红细胞性贫血
- D. 小细胞低色素性贫血
- E. 缺铁性贫血

答案：C

54. 新生儿出血应选用

- A. 安络血 B. 氨甲苯酸 C. 维生素 K D. 双香豆素 E. 抑肽酶

答案：C

55. 香豆素类的抗凝机制是

- A. 对抗 Ca^{2+}
- B. 抑制凝血酶的形成
- C. 对抗维生素 K
- D. 抗血小板聚集
- E. 抑制纤维蛋白的形成

答案：C

56. 香豆素类的特点哪一项为哪一项错误的

- A. 可口服 B. 起效慢 C. 作用持久 D. 体内有抗凝作用 E. 过量也不易引起出血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/718072115126006132>