

病理学(医学高级)《诊断学基础考试答案》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题: 下列关于瞳孔的叙述, 错误的是 ()。A. 正常的瞳孔双侧等圆、等大
B. 青光眼, 瞳孔可呈椭圆形
C. 虹膜粘连时形状可不规则
D. 婴幼儿瞳孔较大
E. 进入老年瞳孔大小变化不大
- 2、单项选择题: 女性, 20 岁, 自幼有轻伤后出血不止, 伴有关节肿痛, 反复鼻出血、牙龈出血 1 年余, 常见皮肤黏膜出血点, 自诉月经量过多。首选的治疗措施为 ()。A. 输血小板悬液
B. 输注凝血因子
C. 应用免疫抑制剂
D. 应用免疫球蛋白
E. 大剂量维生素 C
- 3、单项选择题: 呕吐伴眩晕、眼球震颤最可能是 ()。A. 急性胃肠炎
B. 前庭器官疾病
C. 青光眼
D. 脑膜炎
E. 肾绞痛
- 4、多项选择题: 最大自主通气量可用来评估 ()。A. 胸廓弹性和呼吸肌的力量
B. 肺总量
C. 肺组织弹性
D. 气道阻力
E. 肺血流
- 5、单项选择题: 正常精液液化时间小于 ()。A. 10 分钟
B. 20 分钟
C. 30 分钟
D. 40 分钟
E. 50 分钟
- 6、单项选择题: 男, 60 岁, 主诉近 2 天头晕、胸闷、心悸, 来院就诊。如患者是高血压, 其最可能出现的心音改变是 ()。A. A2 增强
B. A2 减弱
C. P2 增强

- D. P2 减弱
E. P2 分裂
- 7、多项选择题：II度I型窦房传导阻滞的心电图表现是（ ）。
A. P-P 间距逐渐缩短至脱漏
B. 间歇后的 P-P 时间小于两个短的 P-P 间距
C. 间歇后的 P-P 时间大于两个短的 P-P 间距
D. 间歇后的 P-P 间距大于间歇前的 P-P 间距
E. P-P 间距逐渐延长至 QRS 脱漏
- 8、单项选择题：肝脏肿大患者，医生用手压迫肝脏时出现颈静脉怒张更明显，称为肝颈静脉回流征阳性，是下列哪一种疾病的征象（ ）。
A. 右心衰竭肝淤血症
B. 肝硬化门静脉高压症
C. 上腔静脉阻塞综合征
D. 下腔静脉阻塞综合征
E. 肝静脉阻塞综合征
- 9、单项选择题：风心病二尖瓣狭窄的典型面容是（ ）。
A. 面色灰暗，双颊发红，口唇发绀
B. 面色苍白，表情疲惫
C. 面色灰褐，额部有褐色色素沉着
D. 面容惊愕，目光闪亮
E. 表情淡漠，反应迟钝
- 10、单项选择题：有关 apoB 错误的是（ ）。
A. 是 LDL 中含量最多的蛋白质
B. 其作用成分是 apoB-100
C. 可直接反映 HDL 水平
D. 与冠心病发病率呈正相关
E. 可用于评价降脂治疗效果
- 11、单项选择题：有诊断价值的外周血异常血小板比值应大于（ ）。
A. 2%
B. 5%
C. 7%
D. 10%
E. 15%
- 12、多项选择题：易通过血脑屏障的是（ ）。
A. 镁离子
B. 氯
C. 胆固醇
D. 钙离子
E. 葡萄糖
- 13、单项选择题：颈动脉窦综合征的特点（ ）。
A. 可伴有抽搐
B. 在体位骤变时发生晕厥
C. 晕厥于咳嗽时发生
D. 心率明显加快
E. 血压升高
- 14、单项选择题：临床最常用的血小板聚集试验的方法是（ ）。
A. 全血阻抗法
B. 光散射比浊法
C. 微量反应板法
D. PRP 透射比浊法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/718121136003006066>