

## 临床医学题库习题库及答案

### 一、单选题(共90题, 每题1分, 共90分)

1、哪项不是慢性砷化物中毒表现()

- A、肝大黄疸溶血
- B、皮肤色素沉着
- C、多发性神经炎
- D、四肢麻木感觉异常
- E、皮肤角化过度

正确答案: A

2、男, 23岁。间断脓血便2年, 大便成形或糊状, 每日1~3次, 有时里急后重, 抗菌素治疗无效。治疗中不宜先考虑应用

- A、灭滴灵
- B、柳氮磺胺吡啶
- C、强的松
- D、痢特灵
- E、5-氨基水杨酸

正确答案: C

3、小儿肺炎应用抗生素治疗, 一般停药时间为: ()

- A、体温正常后5~7天, 临床症状体征基本消失后3天
- B、体温正常后5~7天, 症状消失
- C、体温正常后2周, 肺部体征消失
- D、体温正常, 咳嗽消失
- E、体温正常后3~4天, 症状消失

正确答案: A

4、原发性肾病患儿, 尿蛋白+++ , 全身高度水肿, 血浆白蛋白为25g/L, 为明确其临床分型, 下列哪种检查非必须: ()

- A、血压测定
- B、多次尿常规检查
- C、尿培养
- D、C3 测定

E、BUN 测定

正确答案: C

5、21世纪人人享有卫生保健的价值基础是:

- A、健康权、发展权、公平、性别观

- B、健康权、发展权、公平、伦理、性别观
- C、健康权、发展权、性别观、伦理
- D、健康权、发展权、公平、伦理
- E、健康权、性别权、公平、伦理

正确答案: E

6、小儿原发性肺结核, 哪项不常见()

- A、发热
- B、X线示肺门淋巴结肿大
- C、肺部中小水泡音
- D、PPD试验阳性
- E、食欲减退, 乏力, 盗汗

正确答案: C

7、新生儿病理性黄疸最常见的原因是()

- A、肝细胞内YZ 蛋白含量不足
- B、母婴血型不合
- C、胆红素排泄差
- D、肝酶发育不完善
- E、红细胞不成熟, 易被破坏

正确答案: B

8、作假设检验时, 下列哪项叙述是正确的()

- A、有统计意义时, 可能也有实际意义
- B、有统计意义时, 则一定有实际意义
- C、无统计意义时, 也一定无实际意义
- D、有实际意义时, 则一定得出有统计意义
- E、无实际意义时, 也一定无统计意义

正确答案: A

9、患者女性, 发现二尖瓣狭窄20年, 夜间阵发性呼吸困难。下肢浮肿10年, 腹胀, 右上腹胀痛半年。1周前开始咳嗽, 咳黄痰。需高枕卧位, 颈静脉怒张, 双肺底有少量湿啰音, 肝肋下2指, 质中, 压痛, 下肢可凹性浮肿。首先考虑

- A、全心衰竭
- B、心功能III级
- C、左心功能不全
- D、右心功能不全

E、心功能IV级

正确答案: A

10、构成大气污染的主要来源是()

- A、交通工具排放的尾气\
- B、工业企业生产过程排放的尾气
- C、居民采暖锅炉排放的废气
- D、火山爆发或森林火灾
- E、农药和化肥的污染

正确答案: B

11、一婴儿腹泻, 体重7kg, 中度脱水, 经第一阶段输液失水纠正后, 在继续补液过程中出现精神萎靡、嗜睡, 心率140 次/分, 心音低钝, 腹胀, 肠鸣音减弱, 膝反射未引出。应选用何种治疗()

- A、3:2:1液体80ml/kg 静脉输入
- B、1.4%碳酸氢钠20ml/kg静滴
- C、10%氯化钾注射液2~3ml/kg, 以小于0.3%浓度加入液体中静滴
- D、10%葡萄糖酸钙10ml 稀释后缓慢静注
- E、2:1等张含钠液20ml/kg静注

正确答案: C

12、肾病患者泼尼松短程疗法的总疗程为: ()

- A、6个月
- B、8~12周
- C、4~8周
- D、9~12个月
- E、6~9个月

正确答案: B

13、关于新生儿Rh 溶血病, 下列哪项是错误的()

- A、在Rh 血型不合妊娠中, 需大量抗原才可使母亲致敏
- B、Rh 溶血病患儿的临床表现随胎次增加而加重
- C、一般Rh 溶血病较 ABO 溶血病症状重
- D、Rh 血型不合溶血病多在第二胎发病
- E、Rh(D)阳性母亲的胎儿亦可发生溶血病

正确答案: A

14、新生儿轻度窒息, Apgar评分为()

- A、10分

- B、4~7分
- C、0~3分
- D、2~4分
- E、7~10分

正确答案: B

15、亚硝胺引起动物最多见的肿瘤是

- A、胃癌
- B、直肠癌
- C、食道癌
- D、肝癌
- E、肺癌

正确答案: D

16、哪项不属于恶性肿瘤预防措施

- A、加强环境保护
- B、加强防癌健康教育
- C、积极治疗肿瘤病人
- D、注意饮食卫生
- E、加强卫生监督管理

正确答案: C

17、假丝酵母菌性阴道炎的诱发因素，下列哪项不正确()

- A、月经来潮
- B、长期使用激素类药物
- C、糖尿病
- D、长期使用抗生素
- E、妊娠

正确答案: A

18、一患儿生后即有特殊外貌，眼距宽，鼻梁平，舌常伸出口外，通贯掌，合并先天性心脏病。最可能的诊断为()

- A、13—三体综合征
- B、苯丙酮尿症
- C、18—三体综合征
- D、21—三体综合征
- E、先天性甲状腺功能减低症

正确答案: D

19、肝硬化患者腹泻后出现昏迷，查血钾 $2.6\text{mmol/L}$ ，血钠 $136\text{mmol/L}$ ，血氯化物 $110\text{mmol/L}$ ，血氨 $146.7\mu\text{mol/L}$ ，血 $\text{pH}7.35$ 。宜选用的药物是

- A、左旋多巴
- B、谷氨酸
- C、盐酸精氨酸
- D、乙酰谷氨酰胺
- E、谷氨酸钠

正确答案： E

20、 人体脂肪在哪一时期是增加高峰期()

- A、更年期
- B、青春期
- C、儿童期
- D、哺乳期
- E、妊娠期

正确答案： B

21、 我国人民维生素A 最主要来源是()

- A、水果
- B、鸡蛋
- C、羊肉
- D、猪肉
- E、蔬菜

正确答案： E

22、 1 岁女孩，急起高热，流涎，厌食，查体：咽部充血，咽腭悬雍垂、软腭等处可见 $2\sim 4\text{mm}$ 大小的疱疹，心肺(-)，最可能的诊断是()

- A、急性咽炎
- B、疱疹性咽峡炎
- C、鹅口疮
- D、咽结合膜热
- E、猩红热

正确答案： B

23、 下列哪项是轻型 $\beta$ -地贫患者Hb 电泳的特点()

- A、HbA 正常，HbA<sub>2</sub> $>0.4$ ，HbF  $0.035\text{--}0.060$  小儿结核病容易： 186. 187. 188. 189. 普通： 190. 191. 192. 193. 194. 195. 较难： 196. 197. 198. 199. 200困难： 201. 202. 203

- B、HbA 0.035-0.060, HbA2 正常, HbF 正常
- C、HbA 0.035-0.060, HbA2 正常, HbF>0.40
- D、HbA 正常, HbA2 0.035-0.060, HbF 正常
- E、HbA 正常, HbA2 正常, HbF 0.035-0.060

正确答案: D

24、10个月小儿,低热,睡眠不安7天,时有呕吐咳嗽,家中无结核病人。体查:烦躁不安,前囟稍隆起,颈有抵抗,心肺无异常,肝脾轻度肿大。脑脊液:外观清亮, WBC 250x10<sup>6</sup>/L, N 30%, L 70%, 潘氏试验(+), 氯化物 95.8mmol/L, 糖1.63mmol/L。OT 试验(-)。最可能的诊断是: ()

- A、病毒性脑炎
- B、隐球菌性脑膜炎
- C、化脓性脑膜炎
- D、中毒性脑病
- E、结核性脑膜炎

正确答案: E

25、4岁小儿,因水肿、尿少两周就诊。查:尿 RBC6~8个/HP,尿 WBC0~5个/HP,24小时尿蛋白定量为1.8g,血浆白蛋白 30g/L, Ch6.8mmol/L, C31000mg/L, BUN9mmol/L, 血压 15/10KPa (113/75mmHg)。最可能的诊断是: ()

- A、肾炎性肾病
- B、单纯性肾病
- C、急性肾功能衰竭
- D、急性肾炎
- E、急进性肾炎

正确答案: A

26、哪些不是肉毒梭状芽胞杆菌菌体特点 ()

- A、芽胞具强耐热性
- B、适宜生长温度5~10℃
- C、革兰阴性厌氧杆菌
- D、有芽胞荚膜
- E、能产生不耐热肉毒毒素

正确答案: B

27、男,23岁。间断脓血便2年,大便成形或糊状,每日1~3次,有时里急后重,抗菌素治疗无效。最可能的诊断是

- A、溃疡性结肠炎
- B、阿米巴肠炎
- C、慢性细菌性痢疾
- D、Crohn 病
- E、肠结核

正确答案: A

28、 哪项不属于急性砷中毒临床表现()

- A、剧烈呕吐
- B、心慌气短
- C、潜伏期短
- D、心律不齐昏迷休克
- E、末梢乃至全身青紫

正确答案: E

29、 患者，25 岁，因病切除子宫，病理检查见滋养细胞成片高度增生，广泛侵入子宫肌层，，肿瘤中不含间质和血管，该病人诊断为()

- A、侵蚀性葡萄胎
- B、绒癌
- C、葡萄胎
- D、子宫内膜异位症
- E、宫内膜癌

正确答案: A

30、 典型苯丙酮尿症最为关键的治疗()

- A、5-羟色氨酸
- B、二氢生物蝶呤
- C、低苯丙氨酸饮食
- D、左旋多巴
- E、四氢生物蝶呤

正确答案: C

31、 8岁小儿，高热4天。查体：急性热病容，咽部及双眼结膜充血，眼睑微肿胀，心、肺、腹(一)，查外周血 WBC $4.0 \times 10^9/L$ ，请考虑最可能的病原体是( )

- A、呼吸道合胞病毒
- B、鼻病毒
- C、腺病毒

- D、肠道病毒
- E、副流感病毒

正确答案: C

32、当前影响我国居民健康的下列因素中最主要的是

- A、自然灾害
- B、遗传因素
- C、卫生服务
- D、生活方式
- E、环境因素

正确答案: E

33、妊娠期卵巢的变化下列哪项正确()

- A、妊娠黄体的功能于孕10周后由胎盘取代
- B、卵泡仍不断发育
- C、卵巢滤泡囊肿形成
- D、双侧可见妊娠黄体
- E、卵巢大小正常

正确答案: A

34、直接接触传染病不包括

- A、艾滋病
- B、以上都是
- C、痢疾
- D、淋病
- E、梅毒

正确答案: C

35、流行病学实验研究的特点是

- A、前瞻性
- B、回顾性
- C、以上均不完全正确
- D、随机化分组
- E、设立对照

正确答案: B

36、6岁患儿，查体发现胸骨左缘2、3肋间闻及II级收缩期杂音，P2 固定分裂。如果此患儿作右心导管检查，诊断房间隔缺损的可靠依据是()

- A、导管从右心房进入左心室

- B、右心房血氧含量增高
- C、右心房压力增高
- D、右心室血氧含量减低
- E、肺动脉压力增高

正确答案: B

37、确诊21-三体综合征应选用哪项检查()

- A、脑电图
- B、血红蛋白电泳
- C、染色体检查
- D、骨骼X线摄片
- E、血清T3、T4、TSH测定

正确答案: C

38、21-三体综合征,不可能的核型是()

- A、46, XX(或XY), -14, +t(14q21q)
- B、部分细胞为46, XX(或XY), 部分细胞为47, XX(或XY), +21
- C、46, XX(或XY), -21, +t(21q21q)
- D、45, XX(或XY), +21
- E、47, XX(或XY), +21

正确答案: D

39、妊娠期高血压疾病最常见的并发症是()

- A、视网膜剥离
- B、急性肾功能衰竭
- C、胎盘早剥
- D、心脏病
- E、HELLP综合征

正确答案: C

40、小儿白细胞分类中,粒细胞与淋巴细胞的交叉发生于()

- A、4—6天, 4—6岁
- B、4—6周, 4—6岁
- C、7天, 1岁
- D、4—6天, 4—6周
- E、1岁, 6岁

正确答案: A

41、孕31周早产儿,体重1400g,生后不久发生呼吸窘迫、暂停头罩吸氧

后血气结果为 PH7.20 PaO<sub>2</sub>45mmHg PaCO<sub>2</sub>68mmHgBE -3。以下哪项处理最正确（）

- A、加大头罩给氧浓度8L/分
- B、鼻塞 CPAP
- C、用氨茶碱兴奋呼吸
- D、5%碳酸氢钠纠正酸中毒
- E、机械通气

正确答案： E

42、1 岁小儿，仍不会坐、立，不能认识熟人和陌生人，平素多动，曾有惊厥 2 次，尿有鼠尿臭味。查体：皮肤白，头发浅黄，肌张力稍高，腱反射活跃。为明确诊断，首先应进行的检查是（）

- A、尿三氯化铁试验
- B、血糖测定
- C、头颅CT
- D、24 小时脑电图监测
- E、心电图

正确答案： A

43、结核性脑膜炎伴颅高压，可选用下列措施减轻脑水肿，但除外：（）

- A、静注20%甘露醇
- B、立刻腰穿放脑脊液
- C、静注速尿
- D、必要时行侧脑室引流
- E、地塞米松静脉注射

正确答案： B

44、男，18 岁学生。淋雨后寒战、发热、右胸痛1 周就诊。查、体：T39.6℃,P108次/分，R28 次/分，BP90/60mmHg。神智恍惚，烦躁不安，右肺呼吸音减弱，语颤增强，可闻及管状呼吸音。心率110 次/分，节律齐，心音稍低。该患者最可能的诊断是

- A、金黄色葡萄球菌肺炎
- B、肺炎克雷白杆菌肺炎
- C、肺炎球菌肺炎
- D、肺炎支原体肺炎
- E、军团菌肺炎

正确答案： C

45、生物间物质转换和能量传递的形式为()

- A、新陈代谢
- B、食物链
- C、以上均不对
- D、生物代谢
- E、生物转化

正确答案: B

46、维生素A 中毒不表现有()

- A、视物模糊
- B、剧烈头痛
- C、剧烈呕吐
- D、皮炎皮疹
- E、多尿腹泻

正确答案: E

47、儿童血容量约占体重的()

- A、20%
- B、15%
- C、8%—10%
- D、5%
- E、6%—8%

正确答案: C

48、哪项不属于冠心病时间分布特征

- A、死亡率冬季最高
- B、夏季发病较少
- C、气温骤降发病增高
- D、心梗多发于子夜和白天
- E、病情恶化多在冬季

正确答案: D

49、两样本均数比较时, 需进行 t 检验, 若两样本的含量均为 n, 则由 t 界值表查P 值时, 其自由度应为()

- A、2n
- B、2n-1
- C、n
- D、2n-2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/718140005123006036>