

2023 年执业医师资格证之临床助理医师真题练习试 卷 B 卷附答案

单选题（共 60 题）

1、10 岁男孩，近 8 天来食欲不振，恶心、呕吐、乏力、尿色黄来院就诊。病前 2 周曾注射丙种球蛋白 1 支。检查：巩膜黄染，肝肋下 3cm、脾未触及。化验：ALT500U，胆红素 $85.5 \mu\text{mol/L}$ ，抗-HAVIgM(+)，抗-HAVIgG(+)，HBsAg(+), HBeAg(+), 抗-HBcIgM (+)。应诊断为

- A. 急性甲型肝炎，乙肝病毒携带者
- B. 急性乙型肝炎，既往感染过甲型肝炎
- C. 急性甲型肝炎，乙型肝炎
- D. 被动获得甲肝抗体，急性甲型肝炎，乙肝病毒携带者
- E. 被动获得甲肝抗体，急性乙型肝炎

【答案】 C

2、医疗机构对限于设备或者技术条件不能诊治的危重病人，应当已发采取的措施是

- A. 立即抢救
- B. 及时转诊
- C. 继续观察
- D. 提请上级医院派人会诊
- E. 请示当地卫生局依法处理

【答案】 B

3、下列疾病中，最常发生 II 型呼吸衰竭的是（ ）。

- A. 肺炎

- B. 慢性阻塞性肺疾病
- C. 结核性腹膜炎
- D. 肺血栓栓塞
- E. 间质性肺疾病

【答案】 B

4、患者，女，25岁。近来发现牙齿松动，刷牙时常出血。检查发现牙龈肿胀，大腿外侧有皮下出血瘀斑。患者最可能缺乏的维生素是

- A. 维生素 A
- B. 烟酸
- C. 维生素 C
- D. 维生素 B
- E. 维生素 B

【答案】 C

5、用人单位开展就业前健康检查的主要目的是

- A. 及时发现就业禁忌证
- B. 便于安排工人从事特殊作业
- C. 全面掌握工人的健康状况
- D. 确定工作岗位及转岗
- E. 便于人事部门对工人的管理

【答案】 A

6、女性，16岁。低热、咳嗽1个月，查体：消瘦。右颈部可触及数个绿豆大小淋巴结。稍硬、活动、无压痛，右肺呼吸音稍减弱。胸片见右上肺斑片状阴影。右肺门淋巴结肿大。诊断首先考虑的是

- A. 原发型肺结核
- B. 浸润型肺结核
- C. 血行播散型肺结核
- D. 结核性渗出性胸膜炎
- E. 慢性纤维空洞型肺结核

【答案】 A

7、为探索新生儿缺氧缺血性脑病（HIE）的病因，选择200例确诊的HIE病例和同期同医院出生的正常新生儿200例，然后对母亲孕期病史及分娩情况进行回顾性分析，调查HIE相关的危险因素，这种研究方法是

- A. 病例对照研究
- B. 实验研究
- C. 现况研究
- D. 临床随访研究
- E. 前瞻性研究

【答案】 A

8、女性，42岁，咳嗽，胸闷，气短4个月，胸片左肺上叶前段反复出现片状阴影，白细胞 $10 \times 10^9 / L$ ，痰结核菌涂片3次（-）。经用青霉素治疗病情好转，但肺部阴影消散不完全，为确定诊断最重要的检查是

- A. 痰化脓菌培养及药物敏感试验
- B. 继续查痰结核菌
- C. 胸部CT检查

D. 纤维支气管镜检查

E. 结核菌素试验

【答案】 D

9、能促进促胰液素分泌的胃液成分是

A. 碳酸氢盐

B. 内因子

C. 盐酸

D. 胃蛋白酶

E. 黏液

【答案】 C

10、下列指标中用于鉴别原发性与继发性甲状腺功能减退症的是

A. TSH

B. TT

C. TT

D. FT

E. FT

【答案】 A

11、患者男，67岁。3周前无明显诱因出现咳嗽，咳黄白痰带血丝，经抗生素治疗效果不佳。体检：体温37.8℃，血压正常，右上肺呼吸音稍弱伴少许湿啰音。血象：WBC $14 \times 10^9/L$

A. 胸部B超

B. 肺动脉造影

- C. 痰培养+药敏
- D. 支气管镜检
- E. 胸腔镜

【答案】 D

12、肾癌最常见的病理类型是

- A. 嫌色细胞癌
- B. 透明细胞癌
- C. 未分类肾细胞癌
- D. 乳头状肾细胞癌
- E. 肾集合管癌

【答案】 B

13、内痔早期的典型症状是

- A. 痔块脱出
- B. 无痛性间歇性便后出血
- C. 疼痛伴血便
- D. 肛门常有黏液分泌物
- E. 肛门瘙痒

【答案】 B

14、女，55岁。间断腹泻5年，黏液脓血便3~4次/天，伴左下腹部疼痛，口服甲硝唑及左氧氟沙星（利复星）治疗无明显好转。查体：左下腹部压痛（+），最可能的诊断是

- A. 克罗恩病

- B. 慢性细菌性痢疾
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 结肠癌
- E. 缺血性肠病

【答案】 C

15、患者，女，33岁。2年来反复腹痛、腹泻，初为糊状便，每日排便2~3次，严重时排黏液脓血便伴里急后重。经当地医院抗炎治疗无效。近1月来腹痛明显，有疼痛-便意-便后缓解的规律。查体：体温39.6℃，腹平软，下腹压痛，肠鸣音亢进。

- A. 细菌性痢疾
- B. 肠道菌群失调
- C. 肠易激综合征
- D. 溃疡性结肠炎
- E. 结肠癌

【答案】 D

16、中年男性患者，近两周来出现头晕乏力，鼻腔出血等症，查体：颈部浅表淋巴结肿大，下肢少许瘀斑。白细胞 $16.6 \times 10^9/L$ ，原始细胞0.60，血红蛋白80g/L，血小板 $34 \times 10^9/L$ 。

- A. 睑结膜苍白
- B. 胸骨压痛
- C. 心脏杂音
- D. 皮肤出血点
- E. 浅表淋巴结肿大

【答案】 B

17、下列关于医师良心的叙述，错误的是

- A. 是一种道德责任感和自我评价能力
- B. 是对他人医疗行为的评价能力
- C. 是医德情感的深化
- D. 是对履行道德义务的满足和欣慰
- E. 是对没有履行道德义务的惭愧和悔恨

【答案】 B

18、男性，29岁。腹胀呕吐已半年，多于午后发作，吐出隔夜食物，吐量较大，吐后舒服，由于长期呕吐除脱水外还会造成

- A. 低氯、低钾血症
- B. 低氯、低钾性酸中毒
- C. 低氯、高钾血性酸中毒
- D. 低氯、低钾性碱中毒
- E. 低氯、低钾血症

【答案】 D

19、常见阴道流血的原因有

- A. 内分泌功能失调
- B. 生殖器炎症、肿瘤
- C. 妊娠相关
- D. 以上都是
- E. 损伤

【答案】 D

20、血清中常规检查检测不到的 HBV 标志物是

- A. HBsAg
- B. HBeAg
- C. HBcAg
- D. 抗- HBe
- E. 抗- HBc

【答案】 C

21、再生障碍性贫血

- A. 贫血和出血程度一致
- B. 贫血和出血程度不一致
- C. 有贫血而无出血
- D. 无贫血而有出血
- E. 无贫血也无出血

【答案】 B

22、女，25岁，1型糖尿病病人。近日来食欲减退、多饮、烦渴、多尿。身高160cm，体重41kg，皮肤弹性差。空腹血糖22.2mmol/L，尿糖(+++)，酮体强阳性。应采用下列何组治疗方案

- A. 饮食控制
- B. 饮食控制+磺脲类药物
- C. 饮食控制+双胍类药物
- D. 小剂量普通胰岛素静脉滴注+静脉补充生理盐水

E. 大剂量普通胰岛素静脉滴注+静脉补充生理盐水

【答案】 D

23、一名溺水游客被救出水后，神志不清，呼吸停止，口唇发绀，行口对口人工呼吸的先决条件是

A. 清除口咽分泌物和异物保持呼吸道通畅

B. 将病人置于仰卧位

C. 确定心跳停止

D. 每次吹入 800ml 气体

E. 每分钟吹气几次

【答案】 A

24、男孩，3岁。自幼人工喂养，食欲极差，有时腹泻，身高85cm，体重7.5kg，皮肤干燥、苍白，腹部皮下脂肪厚度约0.3cm，脉搏缓慢，心音较低钝。某清晨此患儿突然面色苍白、神志不清、体温不升、呼吸暂停。首先应考虑最可能的原因是

A. 急性心力衰竭

B. 低钙血症引起喉痉挛

C. 低钾血症引起呼吸肌麻痹

D. 自发性低血糖

E. 脱水引起休克

【答案】 D

25、某民师欲采用横断面调查研究的方法，调查高血压病在人群中的分布情况，选择最合适的指标为

A. 病死率

- B. 发病率
- C. 死亡率
- D. 患病率
- E. 二代发病率

【答案】 D

26、男性，57岁，因急性下壁心肌梗死入院。检查 BP80/50mmHg, 心率 32 次/分，律齐，最可能的心律失常是

- A. 心房颤动
- B. 房性期前收缩
- C. 室性心动过速
- D. 房室传导阻滞
- E. 室上性心动过速

【答案】 D

27、麻疹早期诊断最有意义的症状、体征为

- A. 耳后及枕部淋巴结肿大
- B. 接触麻疹患者 10~14 天后，体温上升
- C. Koplik 斑
- D. 耳后、发际出现红色斑丘疹
- E. 发热、流涕、结膜充血、畏光

【答案】 C

28、能通过胎盘进入胎儿血中者为

- A. IgA
- B. IgD
- C. IgE
- D. IgG
- E. IgM

【答案】 D

29、患者，女，38岁。近3天来白带增多，量大，呈白色稠厚豆渣样。最可能的诊断是

- A. 外阴阴道假丝酵母菌病
- B. 滴虫阴道炎
- C. 慢性宫颈炎
- D. 子宫内膜炎
- E. 盆腔炎

【答案】 A

30、女，50岁。因子宫肌瘤行子宫切除术，术中医生发现患者左侧卵巢有病变应切除，在未征得患者及其家属同意的情况下，将左侧卵巢与子宫一并切除，术中患者恢复良好，该患例中，医生违背的临床诊疗伦理原则是

- A. 最优化原则
- B. 知情同意原则
- C. 守信原则
- D. 保密原则
- E. 患者至上原则

【答案】 B

31、可促进胰液、胆汁、小肠液分泌的胃液成分是

- A. 胃酸
- B. 胃蛋白酶
- C. 内因子
- D. 黏液
- E. 无机盐

【答案】 A

32、胰腺癌时能直接观察十二指肠壁和壶腹有无癌肿浸润，并可收集胰液做细胞学检查及壶腹部活检的影像学检查是

- A. CT
- B. B 型超声
- C. 内镜超声
- D. ERCP
- E. B 超下经皮细针穿刺

【答案】 D

33、54 岁女性，绝经 3 年，不规则少量阴道流血 1 个月，5 年前体检发现子宫肌瘤。患高血压、糖尿病 5?6 年，妇科检查：子宫如孕 10 周，不规则，软硬不均，轻压痛。宫颈轻度糜烂，B 型超声显示子宫壁间 5cm×6cm×6cm 低回声，内膜厚 1.1cm，不均质。

- A. 黏膜下肌瘤
- B. 子宫内膜癌
- C. 宫颈癌

- D. 子宫肉瘤
- E. 子宫内膜息肉

【答案】 B

34、男性，40岁，上腹饥饿性隐痛反复发作10年，伴反酸、嗝气，进食和服用抗酸剂可缓解。

- A. 急性胰腺炎并发出血坏死
- B. 胰腺癌并发肠梗阻
- C. 胃癌并发幽门梗阻
- D. 消化性溃疡并发急性穿孔
- E. 急性胆囊炎并发胆汁性腹膜炎

【答案】 D

35、男，58岁。慢性咳嗽10年，近半月来出现阵发性干咳，持续痰中带血。X线胸片显示左肺下叶不张。为明确诊断，最有意义的检查方法为

- A. 纤维支气管镜检查
- B. 痰细菌培养
- C. 结核菌素试验
- D. 肺功能测定
- E. 血清癌胚抗原测定

【答案】 A

36、能反馈抑制自身分泌的胃液成分是

- A. 碳酸氢盐
- B. 内因子

- C. 盐酸
- D. 胃蛋白酶
- E. 黏液

【答案】 C

37、脾大最显著的疾病是

- A. 慢性粒细胞白血病
- B. 急性淋巴细胞白血病
- C. 急性单核细胞白血病
- D. 急性粒细胞白血病
- E. 慢性淋巴细胞白血病

【答案】 A

38、在下列各项中，属于医德评价方式的是

- A. 医德教育
- B. 客观效果
- C. 传统习俗
- D. 道德修养
- E. 主观动机

【答案】 C

39、3岁男孩，自生后6个月开始出现发绀，有杵状指。胸部X线检查示靴形心，肺血减少。最可能的诊断是

- A. 肺动脉狭窄

- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 艾森门格综合征

【答案】 D

40、P-R 间期固定，但部分 P 波后无 QRS 波群的是

- A. 第一度房室传导阻滞
- B. 第二度 I 型房室传导阻滞
- C. 第二度 II 型房室传导阻滞
- D. 第三度房室传导阻滞
- E. 高度房室传导阻滞

【答案】 C

41、58 岁，绝经 8 年，不规则阴道流血 2 周，5 年前普查发现子宫肌瘤，高血压 10 余年治疗中，查体肥胖。妇检：子宫如妊娠 8 周，稍软，轻压痛。宫颈轻度糜烂，B 型超声显示子宫内膜厚而不规则。

- A. 宫颈活检
- B. 阴道镜检查
- C. 分段诊刮
- D. 腹腔镜检查
- E. 血清肿瘤标志物测定

【答案】 C

42、上消化道出血的特征性表现是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/725101032013011132>