

2023-24 年江西省西湖区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库及答案【全国使用】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 可用于慢性消耗性疾病的蛋白同化激素是

- A: 司坦唑醇
- B: 甲羟孕酮
- C: 依普黄酮
- D: 他莫昔芬

答案：A

2. 口服铁剂宜选用

- A: 4 价铁
- B: 1 价铁
- C: 2 价铁
- D: 3 价铁

答案：C

3. 患者女 45 岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片 25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片 20mgbid，甲硝唑片 0.4gbid，克拉霉素片 50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊 0.6gbid。

- A: 甲硝唑片
- B: 枸橼酸铋钾胶囊
- C: 克拉霉素片

D: 埃索美拉唑镁肠溶片

答案：C

4. 冠心病患者同时伴有阵发性和持续性房颤，为维持其窦性心律，应首选的药物是

A: 索他洛尔

B: 普罗帕酮

C: 多非利特

D: 胺碘酮

答案：D

5. 高血压合并心肌梗死首选（）

A: 特拉唑嗪

B: 卡托普利

C: 硫酸镁

D: 氢氯噻嗪

答案：B

6. 患者，女，25 岁，痛经，应选用的药物是（）

A: 布洛芬

B: 卡马西平

C: 山莨菪碱

D: 麦角胺咖啡因

答案：A

7. “头孢-”的药名词干缩写是

A: #NAME?

B: #NAME?

C: eef-

D: #NAME?

答案：C

8. 促进肾小管对钠的重吸收，引起高血压的药物是

A: 糖皮质激素

B: 伪麻黄碱

C: 咖啡因

D: 重组人促红细胞生成素

答案：A

9. 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

A: 对乙酰氨基酚

B: 美洛昔康

C: 双氯芬酸钠

D: 尼美舒利

答案：A

10. 抗血小板药

A: 华法林

B: 肝素

C: 利伐沙班

D: 氯吡格雷

答案：D

11. 有幻觉副作用，不宜与右美沙芬合用的药物是

- A: 匹伐他汀
- B: 多奈哌齐
- C: 美金刚
- D: 铝碳酸镁

答案：C

12. 患老年高血压并发心力衰竭，宜选用的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 美托洛尔
- C: 缬沙坦
- D: 非洛地平

答案：A

13. 吸烟后使平喘作用减退、维持时间缩短的药物是

- A: 氯丙嗪
- B: 呋塞米
- C: 西咪替丁
- D: 胰岛素

答案：B

14. 可升高红细胞，用于肾性及非肾性贫血的是

- A: 重组人促红素
- B: 非格司亭
- C: 硫酸亚铁
- D: 维生素 B12

答案：A

15. 患者，女，68 岁，体重 45kg，因发热、咳嗽咳痰入院治疗，临床诊断为社区获得性肺炎。化验结果：白细胞计数 $11.76 \times 10^9/L$ ，肌酐清除率 18ml/min。该患者使用下列抗菌药物治疗时不需要减量的是（）

- A: 阿莫西林
- B: 头孢噻肟钠
- C: 左氧氟沙星
- D: 莫西沙星

答案：D

16. 患者，女，61 岁，有痛风病史。间歇期服用别嘌醇、丙磺舒治疗时，又出现一次急性发作，此时应采取的治疗方法是

- A: 减少别嘌醇、丙磺舒剂量，加服秋水仙碱
- B: 加大别嘌醇、丙磺舒剂量，加服秋水仙碱
- C: 停用别嘌醇、丙磺舒，改用秋水仙碱
- D: 加大别嘌醇、丙磺舒剂量，加服对乙酰氨基酚

答案：A

17. 营养性巨幼细胞性贫血只要因为缺乏（）

- A: 鞣酸
- B: 白细胞
- C: 叶酸和（或）维生素 B12
- D: 维生素 C

答案：C

18. （2016 年真题）下列药物中服用后可在乳汁中分泌较多的是（）。

- A: 地西泮
- B: 华法林
- C: 青霉素 G

D: 头孢呋辛

答案：A

19. 抗菌药物适宜

A: 清晨服用

B: 餐中服用

C: 餐后服用

D: 餐前服用

答案：D

20. 10 岁以上的儿童 2 型糖尿病患者适宜选择的降糖药是

A: 二甲双胍

B: 胰岛素

C: 格列美脲

D: 瑞格列奈

答案：A

21. 患者，男，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 莫西沙星对非典型病原体无效

B: 莫西沙星属于氟喹诺酮类

C: 莫西沙星可覆盖社区获得性肺炎的常见病原体

D: 莫西沙星对厌氧菌无效

答案：A

22. 关于微生态制剂，下列说法不正确的是

- A: 补充人体正常生理细菌
- B: 调节肠道菌群平衡
- C: 清除对人体具有潜在危害的细菌
- D: 对促进营养物质的吸收没有帮助

答案：D

23. 肾脏的功能主要是分泌和排泄尿液、废物、毒物和药物，调节和维持体内环境的平衡。变态反应、感染、肾血管病变、代谢异常、先天性疾病、全身循环和代谢性疾病、药物、毒素对肾脏的损害均可影响肾功能。

- A: $53\sim 97\ \mu\text{mol/L}$
- B: $45\sim 84\ \mu\text{mol/L}$
- C: $27\sim 62\ \mu\text{mol/L}$
- D: $18\sim 35\ \mu\text{mol/L}$

答案：D

24. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

- A: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停
- B: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病
- C: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强
- D: 慢乙酰化者服异烟肼半衰期延长至 $2\sim 4.5\text{h}$

答案：B

25. 下列白细胞计数检查结果中，属于不正常的是

- A: 成人 $8.0\times 10^9/\text{L}$

- B: 成人 $4.3 \times 10^9 / L$
- C: 成人 $3.0 \times 10^9 / L$
- D: 新生儿 $16.0 \times 10^9 / L$

答案：C

26. 最容易吸湿的药品是

- A: 甘油
- B: 叶酸
- C: 鱼肝油乳
- D: 乙醇

答案：A

27. 预激综合征伴房颤患者，控制心室率时须慎用的药物为

- A: 利伐沙班
- B: 胺碘酮
- C: 去乙酰毛花苷
- D: 硝苯地平

答案：C

28. 能与胃蛋白酶、胰酶、淀粉酶中的蛋白结合，减弱其助消化药效的是

- A: 茶叶中的鞣酸
- B: 酒中的乙醇
- C: 食醋中的醋酸
- D: 食盐中的氯化钠

答案：A

29. 可沉淀大部分有机物及无机物的是

- A: 1%氯化钠溶液
- B: 药用炭混悬液
- C: 3%~5%鞣酸溶液
- D: 鸡蛋白

答案：C

30. 在妊娠期可致颅骨和面部畸形、腭裂的药是

- A: 雄激素
- B: 沙立度胺
- C: 孕激素
- D: 叶酸拮抗剂

答案：D

31. 育龄期妇女癫痫可酌情选用（）

- A: 卡马西平
- B: 丙戊酸钠
- C: 乙琥胺
- D: 托吡酯

答案：A

32. 制定新药新知识培训制度，归属

- A: 知识培训
- B: 环境与流程的优化与持续改进
- C: 科学发展
- D: 管理规范到位

答案：A

33. 中成药麻杏止咳片具有镇咳、祛痰、平喘的功效，与其合用可增加对心脏的毒性，引起心律失常的药物是。

- A: 甲氧氯普胺
- B: 复方利血平
- C: 地高辛
- D: 氯苯那敏

答案：C

34. 患者，男，60 岁，坏死性胰腺炎剖腹探查术术后 2 年，恢复良好。进食油炸食品后出现轻度腹泻。宜选用的药物是（）

- A: 干酵母片
- B: 蒙脱石散
- C: 复方阿嗪米特肠溶片
- D: 奥美拉唑肠溶胶囊

答案：C

35. 对于铁剂的使用，正确的为（）

- A: 口服铁剂宜选用三价铁
- B: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收
- C: 待血红蛋白恢复正常后，仍需继续服 3~4 个月
- D: 需要快速补铁的情况下，可以选择口服治疗

答案：B

36. 最常用的解热镇痛药为

- A: 塞来昔布
- B: 谷维素
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 阿司匹林

答案：C

37. 有关抗菌药物的局部应用，说法错误的是

- A: 青霉素类、头孢菌素类药物不适宜局部应用
- B: 眼部感染应首选眼药水滴定治疗
- C: 对于全身给药难以到达的感染部位，可局部加用抗菌药物
- D: 耳部革兰阴性菌感染应首选氨基糖苷类药物局部滴耳

答案：D

38. V 级临床研究的结论或任何级别多个研究有矛盾或不确定的结论属于循证医学证据推荐强度的

- A: B 级
- B: E 级
- C: D 级
- D: C 级

答案：C

39. 脑梗死的治疗药物，溶栓治疗

- A: 普通肝素
- B: 阿替普酶
- C: 阿司匹林
- D: 甘露醇

答案：B

40. 对 5 岁以下儿童高热时紧急退热，应该选用的药品是

- A: 20% 安乃近溶液滴鼻
- B: 20% 阿司匹林溶液滴鼻
- C: 布洛芬混悬液

D: 贝诺酯混悬液

答案: A

41. (2019 年真题) 儿童退热的用药选择和单次用量, 正确的是

- A: 阿司匹林 30~60mg/kg
- B: 对乙酰氨基酚 10~15mg/kg
- C: 布洛芬 0.4-0.6g (12 岁以上儿童)
- D: 对乙酰氨基酚 25~50mg/kg

答案: B

42. 给失眠患者开具地西泮, 医师应采用的处方纸是

- A: 白色、右上角有标识处方纸
- B: 淡黄色处方纸
- C: 白色、右上角无标识处方纸
- D: 淡绿色处方纸

答案: A

43. 患者, 男, 78 岁, 体检发现血清尿素氮升高、血肌酐升高, 其他生化指标正常, 该患者最可能患有

- A: 心脏疾病
- B: 肝脏疾病
- C: 血液疾病
- D: 肾脏疾病

答案: D

44. 临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径, 半衰期 12h 的药物通常选择()

- A: 每日给药 1 次

B: 2~3 个半衰期给药 1 次

C: 每个半衰期给药 1 次

D: 静脉滴注给药

答案: C

45. 5%葡萄糖注射液 500ml 含有葡萄糖的克数是()

A: 30

B: 25

C: 33.3

D: 10

答案: B

46. 吸烟后易出现头晕、嗜睡、疲乏等不良反应的药物是

A: 呋塞米

B: 氯丙嗪

C: 西咪替丁

D: 胰岛素

答案: B

47. 肠外营养 1g 氮能提供的热量是

A: 7kcal

B: 4kcal

C: 3kcal

D: 9kcal

答案: B

48. 睡前服用，可使抑制肝脏合成胆固醇效果更好的药品是

A: 甲氧氯普胺片

- B: 瑞舒伐他汀片
- C: 二甲双胍片
- D: 复方铝酸铋片

答案：B

49. 急性感染、急性化学药物中毒如汞中毒可呈现

- A: 淋巴细胞增多
- B: 红细胞计数减少
- C: 白细胞增多
- D: 血小板减少

答案：C

50. 糖尿病患者应慎用的强效利尿剂是

- A: 阿米洛利
- B: 甘露醇
- C: 呋塞米
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

51. 急性缺血性脑卒中抗血小板药物治疗的时机为（）

- A: 溶栓 12h 前
- B: 溶栓的同时
- C: 溶栓 24h 后
- D: 溶栓 12h 后

答案：C

52. 患者，男，56 岁，以发热、左侧胸廓剧痛就诊。查体：体温 38.8℃，左侧沿第四肋走向有簇集性水疱。

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 阿米替林
- C: 卡马西平
- D: 普瑞巴林

答案：C

53. 女，30 岁。G2P1 既往月经规律，月经量少，身体健康，要求长期采取避孕措施。

- A: 宫内节育器
- B: 安全期避孕
- C: 紧急避孕药
- D: 长效口服避孕药

答案：A

54. （2019 年真题）患者，男，68 岁，既往体健，因受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天入院。查体：体温 39.1℃，血压 138/80mmHg，心率 102 次/分，呼吸 32 次/分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 X 线左肺下叶浸润性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

- A: 肺炎链球菌
- B: 铜绿假单胞菌
- C: 衣原体
- D: 支原体

答案：B

55. (2018 年真题) 患者, 女, 30 岁, 妊娠 7 个月, 既往有磺胺药过敏史。近日双眼沙眼症状加剧, 发痒、分泌物多, 有烧灼感。去年曾用酞丁安滴眼液治疗相似症状, 疗效较好, 今天到药店想再次购买该药。药师给予的用药建议是 ()

- A: 硫酸锌滴眼液
- B: 磺胺醋酸钠滴眼液
- C: 酞丁安滴眼液
- D: 利巴韦林滴眼液

答案: A

56. 患者, 女, 24 岁, 患有缺铁性贫血并伴有慢性腹泻, 实验室检查: Hb55g/L, 血清铁 $12 \mu\text{g/L}$, 首选的治疗方案是 ()

- A: 雄性激素治疗
- B: 注射维生素 B
- C: 口服铁剂及维生素 C
- D: 静脉滴注铁剂

答案: D

57. 患者, 女, 68 岁, 既往有高血压, 双侧肾动脉狭窄, 因水肿复诊, 体检和实验室检查: 血压 $172 / 96\text{mmHg}$, 尿蛋白 $>29 / 24\text{h}$ (正常值 $<150\text{mg} / 24\text{h}$), 血尿酸 $416 \mu\text{mol} / \text{L}$ (正常值 $180 \sim 440\text{mmol} / \text{L}$), 血钾 $6.1\text{mmol} / \text{L}$ (正常值 $3.5 \sim 5.5\text{mmol} / \text{L}$)。在已经服用氨氯地平的基础上, 应考虑联合应用的抗血压药品是

- A: 螺内酯
- B: 依那普利
- C: 卡托普利
- D: 呋塞米

答案: D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

58. 消化性溃疡抗 Hp 的四联疗法正确的是

- A: 雷尼替丁+阿莫西林+胶体次碳酸铋+甲硝唑
- B: 奥美拉唑+甲硝唑+阿奇霉素+胶体次碳酸铋
- C: 兰索拉唑+阿莫西林+克拉霉素+胶体次碳酸铋
- D: 西咪替丁+胶体次碳酸铋+哌仑西平+替硝唑

答案：C

59. 肾上腺皮质激素可能引起

- A: 尿液隐血
- B: 尿葡萄糖
- C: 尿蛋白
- D: 尿胆红素

答案：B

60. 竞争自肾小管排泄、延长半衰期的是

- A: 青霉素+丙磺舒
- B: 西咪替丁+格列本脲
- C: 四环素+硫酸亚铁
- D: 多潘立酮+维生素 C

答案：A

61. 使用前应用青霉素进行皮试的药物是

- A: 注射用阿莫西林
- B: 阿奇霉素片
- C: 注射用头孢曲松钠
- D: 左氧氟沙星片

答案：A

62. 影响人类寿命的因素中，医疗占

- A: 0.1
- B: 0.07
- C: 0.08
- D: 0.15

答案：C

63.（2016 年真题）患者，女，55 岁，因“反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸，胃灼热，间断积食”而就诊。食管测压提示食管下括约肌（LES）压力 $< 6\text{mmHg}$ ，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgbid 强化抑酸治疗。

- A: 戒烟酒
- B: 避免高脂饮食
- C: 控制体重
- D: 餐中多饮水

答案：D

64. 应在餐前服用的药物是（）

- A: 吡罗昔康片
- B: 呋塞米片
- C: 氨茶碱片
- D: 胶体果胶铋胶囊

答案：D

65.（2018 年真题）患者，男，65 岁，因腹胀，呕吐就诊，医生处方，甲氧氯普胺片 20mg tid po 该处方属于（）

- A: 有配伍禁忌
- B: 有禁忌证用药
- C: 无适应证用药

D: 用法、用量不适宜

答案：D

66. 癌症患者化疗出现腹泻合并中性粒细胞核左移时，需给予的预防性治疗药物是

A: 洛哌丁胺

B: 广谱抗生素

C: 药用炭

D: 莫沙必利

答案：B

67. 哺乳期妇女使用，可致男婴乳房增大的药物是（）

A: 复方炔诺酮

B: 依那普利

C: 复方磺胺甲噁唑

D: 胰岛素

答案：A

68. 关于血清天门冬氨酸氨基转移酶的叙述正确的是

A: 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）与谷丙转氨酶（GPT）是同一概念

B: 在慢性肝炎尤其是肝硬化时，AST 升高的幅度不如 ALT

C: 天门冬氨酸氨基转移酶主要存在于心肌、肝肾、骨骼肌、胰腺等组织细胞中，同时也存在于正常人的血浆、胆汁、脑脊液及唾液中

D: 天门冬氨酸氨基转移酶的测定值只反映肝脏的功能

答案：C

69. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。体检：身高 160cm，体重 78kg。实验室检查：空腹血糖 8.7mmol/L，白细胞 $8.0 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0-10.0 \times 10^9/L$ ），红细胞 $4.0 \times 10^{12}/L$ （参考值 $3.55-5.0 \times 10^{12}/L$ ），总胆固醇 6.0mmol/L（参考值 $<5.2 \text{ mmol/L}$ ）。经饮食控制，规律锻炼，血糖控制仍未达到理想水平。

- A: 阿卡波糖
- B: 格列齐特
- C: 二甲双胍
- D: 胰岛素

答案：C

70. 表现为疲劳、软弱、全身不适、颅内压增高、皮肤干燥瘙痒、四肢痛为哪种维生素滥用的危害

- A: 维生素 B
- B: 维生素 C
- C: 维生素 A
- D: 维生素 D

答案：C

71. 饮用含葡萄柚汁的饮料可能影响一些药物的药动学的机制是

- A: 诱导 CYP3A4
- B: 抑制 CYP3A4
- C: 抑制 CYP2C9
- D: 抑制 CYP1A2

答案：B

72. 人体的生物钟规律即指在人体内调控某些生化、生理和行为现象有节奏地出现的生理机制，很多药物的作用和毒性、不良反应与人体的

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

生物节律(生物钟)有着极其密切的关系，同一种药物在同等剂量可因给药时间不同而产生不同的作用和疗效。

- A: 抗过敏药
- B: 调节血脂药
- C: 抗抑郁药
- D: 平喘药

答案：C

73. 偶可引起接触性皮炎

- A: 氯己定
- B: 硼酸甘油
- C: 甲硝唑含漱制剂
- D: 地塞米松粘贴片

答案：A

74. (2015 年真题) 过量服用维生素 D 所发生中毒的典型临床表现是 ()。

- A: 骨骼发育不良或骨软化
- B: 横纹肌溶解或肌痛
- C: 骨质疏松症或骨折
- D: 间质性肾炎或肾结石

答案：D

75. 用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药物是

- A: 吡嗪酰胺
- B: 链霉素
- C: 利福平
- D: 乙胺丁醇

答案：D

76. 药师应具备的素质中，贯穿于药学服务全过程的是（）。

- A: 高尚的职业道德
- B: 良好的教育背景
- C: 交流沟通能力
- D: 药历制订、修改

答案：D

77. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

- A: 氯霉素在新生儿体内蓄积呈现灰婴综合征
- B: 口服避孕药致阿米替林清除率下降
- C: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等
- D: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎

答案：B

78. （2015 年真题）患者，女，51 岁，体检时发现血压 160/105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol/L（参考范围 <7.8mmol/L），甘油三酯 1.52mmol/L（参考范围 0.56~1.70mmol/L），总胆固醇 6.26mmol/L（参考范围 <5.2mmol/L），低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol/L（参考范围 2.1~3.1mmol/L），高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol/L（参考范围 1.2~1.65mmol/L），肌酐 60 μmol/L（参考范围 45~84 μmol/L），蛋白尿：++。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 特拉唑嗪
- B: 氢氯噻嗪
- C: 复方利血平

D: 依那普利

答案: D

79. 一般不会出现中性粒细胞增多的中毒事例是

A: 汞中毒

B: 铅中毒

C: 催眠药中毒

D: 乙醇中毒

答案: D

80. 淋巴细胞正常参考区间是

A: 0~0.01

B: 0.005~0.05

C: 0.03~0.08

D: 0.20~0.40

答案: D

81. 患者，女，65 岁，间断腹胀、纳差 6 年，因病情加重伴精神恍惚 3 天为主诉入院，实验室检查:ALT200UL，AST320UL，诊断为肝硬化失代偿期、肝性脑病。患者乙肝病史 20 年，间断服用中药（具体不详）治疗。糖尿病史 10 年，便秘多年，3~4 天排便一次。

A: 辅酶 A

B: 维生素 B1

C: 多烯磷脂酰胆碱

D: 水溶性维生素

答案: C

82. 1 类手术切口应用第三代头孢菌素，应评判为

- A: 有禁忌证用药
- B: 联合用药不适宜
- C: 过度治疗用药
- D: 无适应证用药

答案：D

83. 服药期间饮酒可引起低血糖反应的是

- A: 维生素
- B: 格列本脲
- C: 硫酸亚铁
- D: 西咪替丁

答案：B

84. （2019 年真题）长期应用糖皮质激素后的实验室检查结果常会出现

- A: 嗜酸性粒细胞增多
- B: 淋巴细胞增多
- C: 淋巴细胞减少
- D: 中性粒细胞减少

答案：C

85. （2018 年真题）患者突发心前区压榨性疼痛，立即取出硝酸甘油片，
正确的使用方法是（）

- A: 舌下含服
- B: 清晨服用
- C: 用温水调服
- D: 应同时碱化尿液

答案：A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/725130002131012033>