

学习及考试资料整理汇编

——备考冲刺篇——

（考点或配套习题突击训练专用）

2020 年外科主治医师考试——《相关专业知识》试卷及答案解析

一、A1

1. 上腔静脉阻塞综合征最常见于

- A. 纵隔肿瘤
- B. 肺癌局部扩展引起
- C. 胸骨后甲状腺肿
- D. 肺尖部结核
- E. 慢性缩窄性心包炎

【正确答案】 B

【答案解析】 近年来，肺癌已成为上腔静脉阻塞综合征的最常见病因，表现上肢、颈面部水肿和胸壁静脉曲张。

2. 中央型肺癌是指

- A. 肺鳞癌
- B. 起源于支气管的肺癌
- C. 起源于肺段支气管以上的肺癌
- D. 已有纵隔淋巴结转移的肺癌
- E. 发生于 50 岁以上男性的肺癌

【正确答案】 C

【答案解析】 肺癌大多数都起源于支气管黏膜上皮，也称支气管肺癌。起源于主支气管、叶支气管的肺癌，位置靠近肺门者称为中央型肺癌；起源于肺段支气管以远的肺癌，位于肺周围部分者称周围型肺癌。

3. 近年来脓胸最常见的致病菌是

- A. 肺炎链球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 溶血性链球菌
- D. 结核菌
- E. 真菌

【正确答案】 B

【答案解析】 青霉素问世以前，脓胸多为肺炎链球菌及溶血性链球菌，近年来尽管结核菌及真菌引起脓胸有所增加，但仍以金黄色葡萄球菌最为常见。

4.关于肋骨骨折的描述，不恰当的是

- A. 较易发生骨折的是第 4~7 肋骨
- B. 反常呼吸运动可以引起纵隔扑动
- C. 血胸和气胸是肋骨骨折的常见伴发病
- D. 直接暴力所致骨折多不引起肺损伤
- E. 反常呼吸运动可以采用正压机械通气的方法治疗

【正确答案】 D

【答案解析】 直接暴力所致骨折可以引起肺部的肺挫伤等情况，严重可导致肺部出现通气障碍，引起呼吸衰竭。

5.下列有关颈椎病的诊断治疗哪项是错误的

- A. 各种类型颈椎病均可行推拿牵引治疗
- B. 一过性脑缺血症状有时是由颈椎病所致
- C. 颈椎病可有视物模糊、复视、耳鸣、心前区疼痛等症状
- D. 颈椎病是颈椎骨质增生所致，常伴有上肢放射痛及感觉障碍
- E. 颈椎病均应行颈椎病 X 线检查

【正确答案】 A

【答案解析】 颈椎病可行按摩手法，以利于改善局部血运，松弛肌肉痉挛，解除疼痛，但脊髓型颈椎病禁用按摩。另外，牵引治疗主要适用于神经根型，以缓解对神经根的刺激，改善症状。对脊髓颈椎病均不适用。

6.人工髋关节置换术后股骨骨折以哪型最多见

- A. 股骨粗隆区
- B. 股骨粗隆区和人工股骨柄之间
- C. 人工股骨柄远端

- D. 混合型
- E. 对侧股骨

【正确答案】 C

【答案解析】 人工髋关节置换术后股骨骨折多发生在人工股骨柄远端。

7. 肱骨干中段骨折反复手法复位导致

- A. 桡神经损伤
- B. 正中神经损伤
- C. 尺神经损伤
- D. 腋神经损伤
- E. 肌皮神经损伤

【正确答案】 A

【答案解析】 肱骨干中段后侧有桡神经沟，桡神经走行于沟内，紧贴肱骨。所以该段骨折易伤及桡神经，反复手法复位，更易伤及。

8. 骨折急救处理中，哪项错误

- A. 凡有骨折可疑的病人，均按骨折处理
- B. 复位已戳出创口的骨折端
- C. 创口包扎，止血
- D. 妥善固定患肢
- E. 迅速运往医院

【正确答案】 B

【答案解析】 戳出创口的骨折端已被污染，急救复位时，可将污染带至伤口深部，所以不恰当。应待清创术时将污染清理后再行复位。

9. 关于骨折的合并症，下列哪项不对

- A. 肱骨中下1/3段骨折，可伤及桡神经
- B. 肱骨内上髁骨折，可伤及肱动脉
- C. 腓骨小头和颈部骨折，可伤及腓总神经

- D. 下胸壁肋骨骨折，可同时发生肝或脾破裂
- E. 股骨颈骨折，可致股骨头缺血性骨坏死

【正确答案】 B

【答案解析】 肱骨内上髁为前臂屈肌群附着处，其骨折为撕脱骨折，解剖部位距肱动脉较远，一般不引起肱动脉损伤。易伤及肱动脉的骨折是肱骨髁上骨折伸直型，两者不要混淆。

10. 下列哪一项不是导致骨折愈合或不愈合的因素

- A. 感染
- B. 软组织嵌入
- C. 反复多次复位
- D. 糖尿病
- E. 没有达到解剖复位

【正确答案】 E

【答案解析】 骨折后复位达到功能复位即愈合，ABCD均是导致骨折延迟愈合或不愈合的因素。

11. 关于小腿慢性溃疡发病原因描述错误的是

- A. 创伤
- B. 静脉淤血
- C. 动脉病变
- D. 糖尿病
- E. 局部受压

【正确答案】 E

【答案解析】 考查小腿慢性溃疡的发病原因。创伤、静脉淤血、动脉病变、糖尿病、失神精营养等均为发病原因。

12. 关于小腿慢性溃疡，说法不正确的是

- A. 溃疡一般单个存在，表浅，边缘整齐
- B. 静脉曲张型溃疡主要由于静脉曲张引起，一般较易愈合

- C. 静脉炎性溃疡一般难以自愈
- D. 溃疡周围皮肤常有色素沉着
- E. 小腿慢性溃疡通常与静脉曲张同时存在

【正确答案】 B

【答案解析】 小腿慢性溃疡常与静脉曲张同时存在，但是单纯由于静脉曲张引起的溃疡容易愈合，而静脉曲张型溃疡和静脉炎性溃疡常由于深静脉栓塞引起，不易愈合。

13.关于压疮的防治原则正确的是

- A. 积极治疗原发病是防治压疮的根本
- B. 压疮一旦形成不能自愈，必须手术
- C. 压疮一旦形成，防止继发感染是最有效的措施
- D. 应用抗生素和加强换药是首选
- E. 压疮应以预防为主，防治结合

【正确答案】 E

【答案解析】 大部分压疮可以预防，所以必须防治结合，治疗是不得已的手段。小的浅表压疮通过护理可以自愈，创面大或较深的压疮单纯抗感染和换药不能治愈，必须手术。

14.手外伤中皮肤缺损的处理原则是

- A. 凡是皮肤软组织损伤后必须用皮瓣修复
- B. 凡是有骨、神经、血管、肌腱外露者均需皮瓣修复
- C. 凡是皮肤软组织损伤后均可用植皮处理
- D. 凡是表皮缺损者须用植皮术修复
- E. 凡是晚期有深部组织修复任务者可用皮片移植覆盖创面

【正确答案】 B

【答案解析】 皮肤缺损严重，并有骨、肌腱神经、血管外露者不适合于游离植皮者，可考虑用带蒂皮瓣移植。其他选项不正确。

15.化学烧伤表现为

- A. 创面界限分明，渗出少，水肿轻

- B. 创面由于组织脱水而形成硬焦痂
- C. 皮损有一定的潜伏期，发展缓慢而后果严重
- D. 创面渗出多，早期不会形成焦痂
- E. 创面呈黄色

【正确答案】 A

【答案解析】 强酸与皮肤接触后，由于组织蛋白凝固后形成一层痂壳，创面界限分明，渗出少，水肿轻。

16. 碎石颗粒成分分析为磷酸镁铵结石，为预防结石的复发哪一项是错的

- A. 抗感染治疗
- B. 碱化尿液
- C. 酸化尿液
- D. 限制食物中磷酸的摄入
- E. 口服氯化铵

【正确答案】 B

【答案解析】 磷酸镁铵结石的形成往往与尿路感染有关，通常在碱性尿液中容易生成尿路结石，在治疗中抗感染和酸化尿液是常规治疗方法。口服氯化铵可以起到酸化尿液的作用，而碱化尿液则起到相反的作用。

17. 用中国九分法计算成人烧伤面积，以下哪一项是正确的

- A. 躯干前侧为 18%
- B. 躯干后侧为 18%
- C. 双下肢为 36%
- D. 手为 1%
- E. 头、面、颈部各为 3%

【正确答案】 E

【答案解析】 按中国九分法计算躯干前侧、后侧各为 13%，双下肢为 41%。手是 1.25%，头、面、颈部各为 3%。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/72521400043011221>