

# 2024 年护师类之主管护师全真模拟考试试卷 B 卷含答案

## 单选题（共 40 题）

1、患者，男性 40 岁，饱餐后出现上腹剧痛，伴恶心、呕吐、腹胀 2h，来院急诊。查血，淀粉酶 2000 温氏单位，尿淀粉酶 80 温氏单位。卜列哪项可不作观察重点

- A. 生命体征
- B. 人便次数
- C. 尿量、意识
- D. 咖气分析，血、尿淀粉酶结果
- E. 腹胀腹痛，肠鸣音

【答案】 B

2、下列哪项说明胎儿不成熟

- A. 卵磷脂/鞘磷脂 $>2$
- B. 磷脂酰甘油阳性
- C. 肌酐 $>1.8\sim 2\text{mg}$
- D. 脂肪细胞 $<10\%$
- E. 胆红素 $<0.02$

【答案】 D

3、肺结核病患者衣物的消毒宜采用（ ）。

- A. 食醋熏蒸
- B. 阳光照射

- C. 煮沸
- D. 过氧乙酸溶液浸泡
- E. 漂白粉溶液浸泡

【答案】 B

4、胎儿产时感染发病在（ ）。

- A. 生后 1 天以内
- B. 生后 2 天以内
- C. 生后 3 天以内
- D. 生后 4 天以内
- E. 生后 5 天以内

【答案】 C

5、男性病人，食管癌切除、食管胃吻合术后第 5 天，进食后突然出现高热、寒战、呼吸困难、胸痛，白细胞  $20 \times 10^9$

- A. 肺炎、肺不张
- B. 吻合口瘘
- C. 吻合口狭窄
- D. 乳糜胸
- E. 出血

【答案】 B

6、痢疾杆菌

- A. 在流通空气中或阳光下 30 分钟失活

- B. 不耐酸和热，对乙醚敏感
- C. 在室温中 2~3 天失去传染性
- D. 在食物和食具上可生活 1~2 周
- E. 在痰和渗出物中可存活数周

【答案】 D

7、妊娠期妇女子宫生理变化正确的是

- A. 子宫增大变软，孕 8 周后超出盆腔
- B. 孕 20 周起出现 Braxton Hicks 收缩
- C. 足月子宫容量约 1000ml
- D. 妊娠晚期大多数子宫略左旋
- E. 妊娠足月时子宫体积约为 30cm×20cm×15cm

【答案】 B

8、水肿“++”指

- A. 水肿限于踝部和小腿
- B. 全身水肿或伴腹水
- C. 水肿延及大腿
- D. 水肿延及外阴和腹部
- E. 水肿仅限于踝部

【答案】 C

9、急性淋病的治疗，首选治疗药物是

- A. 红霉素+链霉素

- B. 头孢曲松钠+红霉素
- C. 庆大霉素+甲硝唑
- D. 阿米卡星
- E. 青霉素+四环素

【答案】 B

10、病人女性，45岁，肝炎病史13年。2年来出现乏力，腹胀，尿量减少，偶有牙出血和鼻出血。1天前，劳累后突然出现恶心，呕新鲜血含有血块，共约1000ml。查体：BP85/45mmHg，P110次/分，神志淡漠。

- A. 钡餐透视
- B. 血管造影
- C. 胃镜
- D. 上腹部超声
- E. 上腹部增强CT

【答案】 C

11、患者，男性，12岁，无明显诱因出现头晕，卧床休息不能缓解，后出现昏迷，意识丧失，牙关紧闭，四肢抽动，口唇青紫，小便失禁，口吐白沫，此过程约4分钟。此后患者四肢松弛，逐渐清醒。清醒后患者感觉头痛，对抽搐的过程无记忆。

- A. 患者抽搐发作时，需专人守护，观察和记录全过程
- B. 对再次发作者要防止跌伤
- C. 立即解开衣服和腰带，迅速将压舌板置于患者一侧上、下臼齿间，以防咬伤舌
- D. 强行按压或捆扎肢体，以防患者受伤
- E. 将患者的头侧向一边，及时吸出呼吸道分泌物和呕吐物并吸氧

【答案】 D

12、手术后病人并发血栓性静脉炎时禁忌（ ）。

- A. 抬高患肢，制动
- B. 局部按摩
- C. 局部热敷
- D. 理疗
- E. 全身使用抗生素

【答案】 B

13、良性葡萄胎恶变率是（ ）。

- A. 10%以下
- B. 10%~20%
- C. 20%~30%
- D. 30%~40%
- E. 40%以上

【答案】 B

14、为了解社区中年人对健康生活方式认识的程度，社区护士可首选的方法是（ ）。

- A. 查阅文献
- B. 实地考察
- C. 人物访谈
- D. 参与性观察

E. 问卷调查

【答案】 C

15、男性，56 岁，头痛 4 个月，多见于清晨，常出现癫痫发作，经检查诊断为颅内占位性病变、颅内压增高，拟行开颅手术。

A. 给氧

B. 保持呼吸道通畅

C. 使用脱水剂

D. 密切观察病情

E. 立即进行术前准备

【答案】 C

16、患者女性，19 岁，患 1 型糖尿病 2 年，每日注射胰岛素，平均 40U，近 1 周因胰岛素用完，而停用胰岛素治疗。因乏力 3 天，昏迷 4 小时入院。以下哪种处理是错误的

A. 立即抽血查血糖、血酮体

B. 立即建立静脉通道

C. 立即做血气分析

D. 立即输入 10%葡萄糖

E. 立即测尿糖，血酮体

【答案】 D

17、绒癌脑转移患者行腰穿治疗时，下列护理措施中错误的是

A. 腰穿 4 小时后可下地活动

B. 腰穿前要协助患者取侧卧位，背齐床边，手抱双膝

- C. 颅内压高的患者要先进行降颅压治疗再行腰穿
- D. 放脑脊液的速度不可过快
- E. 治疗后要注意观察病人有无头疼等症状

【答案】 A

18、为心跳呼吸骤停的病人行心肺复苏时首先应

- A. 心脏按压
- B. 心内注射
- C. 心前区叩击
- D. 清理呼吸道
- E. 口对口人工呼吸

【答案】 A

19、初产妇，子宫下段到临产时长为

- A. 4~5cm
- B. 7~10cm
- C. 11~12cm
- D. 6~7cm
- E. 2~3cm

【答案】 B

20、男性，25岁。因挤压伤后10小时急诊入院。伤后无尿，经补液，利尿无效，血BUN25mmol/L，Cr560ummol/L。CO

- A. 外源性毒素

- B. 内源性毒素
- C. 有效循环容量不足
- D. 肾脏灌注不足
- E. 肾小管堵塞

【答案】 A

21、女，出生 20 天。上腭见一白色乳凝块状物，不易擦去，不影响吃奶。应怎样消毒该患儿使用的奶具

- A. 用 5%碳酸氢钠液浸泡 30 分钟洗净后再煮沸消毒
- B. 洗净后高压蒸汽灭菌
- C. 用高锰酸钾溶液浸泡 30 分钟后洗净再煮沸消毒
- D. 用新苯扎氯铵洗净后再煮沸消毒
- E. 用 5%苯扎溴铵溶液浸泡 30 分钟再煮沸消毒

【答案】 A

22、关于食管癌术前患者的健康教育，错误的是（ ）。

- A. 戒烟
- B. 避免感冒
- C. 鼓励病人深呼吸
- D. 术前一周进食流质，术前 3 日禁食
- E. 术前 1 日晚给予生理盐水经胃管洗胃

【答案】 D

23、将呼吸系统分为上、下呼吸道的标记是

- A. 甲状软骨
- B. 会厌软骨
- C. 环状软骨
- D. 锁骨
- E. 胸骨

【答案】 C

24、营养性巨幼红细胞性贫血治疗首选（ ）。

- A. 硫酸亚铁
- B. 丙酸睾酮
- C. 维生素 B12
- D. 糖皮质激素
- E. 维生素 E

【答案】 C

25、患者，女性，30 岁。外阴瘙痒 1 周，阴道分泌物增多、色黄。妇科检查：阴道散在出血点，灰白稀薄泡沫状阴道分泌物。

- A. 青霉素
- B. 甲硝唑
- C. 红霉素
- D. 庆大霉素
- E. 头孢类药物

【答案】 B

26、某产妇，第一胎，孕 38 周。双胎，第一胎儿臀位，行臀位牵引娩出。第二胎儿头位娩出，产后 20 分钟突然阴道流血 200mL。胎盘尚无剥离现象。此时正确的处理措施是（ ）。

- A. 输液，静脉注射麦角新碱
- B. 牵引脐带，按压宫底，迫使胎盘娩出
- C. 徒手剥离胎盘预防产后出血
- D. 使用阴道拉钩检查宫颈是否撕裂
- E. 观察胎盘剥离迹象，协助胎盘娩出

【答案】 C

27、对居家的老年痴呆患者不适宜采取的护理措施是（ ）。

- A. 尽量不要让患者一个人单独外出
- B. 患者活动的空间不放置危险物品
- C. 代替患者完成力所能及之事
- D. 用正面语句和惯用语与患者沟通
- E. 尽量让患者处于相对固定的环境

【答案】 C

28、男性，25 岁，因高热 2 日未能进食，自述口渴、口干、尿少色黄。查体：口唇、舌干燥，皮肤弹性差，眼窝凹陷。实验室检查：尿比重 1.028，血清钠浓度为 155mmol/L。考虑病人出现

- A. 等渗性脱水
- B. 低渗性脱水
- C. 轻度高渗性脱水
- D. 中度高渗性脱水

E. 重度高渗性脱水

【答案】 D

29、患者，男性，48 岁，有肝硬化病史 8 年，6 个月来出现腹水。4 天前开始解黑便，今天因淡漠少言、反应迟钝就诊，怀疑有肝性脑病可能。

A. 增加糖的供给，保护肝

B. 导泻

C. 抑制肠道细菌繁殖

D. 改变肠道 pH

E. 抑制血氨形成

【答案】 D

30、关于产后正常恶露的描述，正确的是（ ）。

A. 浆液性恶露约持续 3 周

B. 正常恶露大约持续 2~4 周

C. 血性恶露约持续 1~2 天

D. 产后第 3 天，恶露中含有较多血液

E. 血性恶露中含有大量的坏死蜕膜组织

【答案】 D

31、早期常用的诊断肺结核的方法是

A. 血液检查

B. 痰结核菌检查

C. 胸部 X 线检查

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/725244314012011302>