

## 2024 年广东省惠来县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题真题题库【满分必刷】

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2018 年真题）关于孟鲁司特钠临床使用注意事项的说法，正确的是（）

- A: 孟鲁司特钠可单独用于哮喘治疗
- B: 12 岁以下儿童禁用孟鲁司特钠
- C: 孟鲁司特钠使用后可能会导致嗜酸性粒细胞增多
- D: 孟鲁司特钠起效快，适用于哮喘急性发作

答案：C

2. 不宜与三环类抗抑郁药合用的是（）

- A: 羟甲唑啉
- B: 赛洛唑啉
- C: 麻黄碱
- D: 酚甘油滴耳液

答案：C

3. （2018 年真题）属于短效胰岛素或短效胰岛素类似物的是（）

- A: 甘精胰岛素
- B: 低精蛋白锌胰岛素
- C: 普通胰岛素
- D: 地特胰岛素

答案：C

4. (2018 年真题) 属于胆固醇吸收抑制剂的调节血脂药是 ( )

- A: 辛伐他汀
- B: 烟酸
- C: 依折麦布
- D: 非诺贝特

**答案: C**

5. 伊曲康唑属于 ( )

- A: 唑类抗真菌药
- B: 多烯类抗真菌药
- C: 丙烯胺类抗真菌药
- D: 棘白菌素类抗真菌药

**答案: A**

6. 属于核苷(酸)类抗肝炎病毒药的是

- A: 阿昔洛韦
- B: 恩替卡韦
- C: 司他夫定
- D: 奥司他韦

**答案: B**

7. 最易引起严重二重感染的药物是 ( )

- A: 庆大霉素
- B: 诺氟沙星
- C: 四环素
- D: 青霉素

**答案: C**

8. 淋巴细胞白血病采用

- A: 抗结核病药与糖皮质激素合用
- B: 糖皮质激素大剂量冲击疗法
- C: 糖皮质激素小剂量代替疗法
- D: 糖皮质激素一般剂量长期疗法

**答案：D**

9. (2020 年真题) 关于非那雄胺作用特点的说法，错误的是

- A: 易引起直立性低血压
- B: 小剂量可促进头发生长，用于治疗源性脱发
- C: 可抑制酮在前列腺内转化为双氢睾酮
- D: 能降低血清前列腺特异性抗原 (PSA) 水平

**答案：A**

10. 下述利尿药中，可导致血钾升高的是()

- A: 氨苯蝶啶
- B: 乙酰唑胺
- C: 氢氯噻嗪
- D: 呋塞米

**答案：A**

11. 关于双嘧达莫的描述，不正确的是

- A: 抑制血小板、上皮细胞和红细胞摄取周围腺苷
- B: 使血小板内环磷酸腺苷 (cAMP) 减少
- C: 常用于肾病综合征的抗凝治疗
- D: 使血小板内环磷酸腺苷 (cAMP) 增多

**答案：B**

12. 2~3 分钟起效，5 分钟达最大效应的硝酸酯类药物是

- A: 硝苯地平
- B: 硝酸甘油
- C: 哌唑嗪
- D: 普萘洛尔

**答案：B**

13. 下列属于短效糖皮质激素的是

- A: 泼尼松龙
- B: 甲泼尼龙
- C: 氢化可的松
- D: 泼尼松

**答案：C**

14. 青霉素 G

- A: 对支原体有效
- B: 对 G<sup>+</sup>、G<sup>-</sup>球菌及螺旋体等有效
- C: 抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效
- D: 对 G<sup>+</sup>、G<sup>-</sup>球菌，特别是对 G<sup>-</sup>杆菌有效

**答案：B**

15. （2019 年真题）用于治疗水肿性疾病，当起始治疗剂量未达到满意的治疗效果时，可追加剂量，每日最大剂量可达 600mg，但一般应控制在 100mg 以内的利尿剂是（）

- A: 依他尼酸
- B: 布美他尼
- C: 呋塞米

D: 托拉塞米

**答案: C**

16. 不具有磺酰胺基结构，更容易引起耳毒性的药物是

A: 托拉塞米

B: 布美他尼

C: 依他尼酸

D: 呋塞米

**答案: C**

17. 急性化脓性中耳炎的局部治疗方案正确的是

A: 鼓膜穿孔前可使用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道，鼓膜穿孔后可用 2%酚甘油滴耳，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗

B: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后可先用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗

C: 鼓膜穿孔前用无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，鼓膜穿孔后可先用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用 2%酚甘油滴耳序贯治疗

D: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后先以无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，再用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道以防止进一步感染

**答案: B**

18. 属于抗流感病毒药的是

A: 司他夫定

B: 奥司他韦

C: 恩替卡韦

D: 阿昔洛韦

**答案: B**

19. 患者女，59 岁，既往高脂血症病史 5 年，心功能 II 级。因发现血压升高 7 天入院。入院查体血压 172/95mmHg，心率 62 次 / 分。该患者目前服用的药物除抗高血压药外有辛伐他汀。

- A: 洛伐他汀
- B: 辛伐他汀
- C: 普伐他汀
- D: 阿托伐他汀

**答案：D**

20. 精神紧张、情绪恐惧所致的失眠

- A: 夸西泮
- B: 氟西泮
- C: 谷维素
- D: 氯美扎酮

**答案：D**

21. 关于铂类药物的描述，下列说法错误的是

- A: 细胞增殖周期非特异性抑制剂
- B: 顺铂是结、直肠癌的首选药之一
- C: 作用机制是破坏 DNA 的结构和功能
- D: 广谱抗肿瘤药物

**答案：B**

22. 治疗阵发性室上性心动过速的最佳药物是()

- A: 奎尼丁
- B: 普鲁卡因胺
- C: 维拉帕米
- D: 苯妥英钠

**答案：C**

23. 人体主要的热能来源是

- A: 维生素
- B: 葡萄糖
- C: 氨基酸
- D: 果糖

**答案：B**

24. 抑制碳酸酐酶的药物是

- A: 呋塞米
- B: 氢氯噻嗪
- C: 乙酰唑胺
- D: 氨苯蝶啶

**答案：C**

25. 癫痫、帕金森病及精神疾病患者慎用的是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 吲哚美辛
- C: 布洛芬
- D: 塞来昔布

**答案：B**

26. (2015 年真题) 患者，男，56 岁。有高血压病史 4 年。体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。该患者若长期服用依那普利片，除应监测血压、心、肾功能外。还应监测的指标是 ( )。

- A: 血钙

B: 血钠

C: 血氯

D: 血钾

**答案：D**

27.（2019 年真题）与体内过氧化物和自由基结合，保护细胞中含巯基的蛋白质和酶，参与多种有毒物质解毒反应的药物是（）

A: 甘草酸二铵

B: 还原型谷胱甘肽

C: 葡醛内酯

D: 多烯磷脂酸胆碱

**答案：B**

28.（2018 年真题）碳酸钙用于肾衰竭患者降低血磷时，适宜的服药时间是（）

A: 清晨或睡前

B: 餐后 2h

C: 餐中

D: 餐前即刻

**答案：C**

29. 四环素联用抗凝药需要

A: 口服吸收减少

B: 增加麦角中毒的风险

C: 调整抗凝血药的剂量

D: 肝毒性增加

**答案：C**

30. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38.8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞  $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82.1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0.59，每 6 小时一次。

- A: 定期复查血常规、肝肾功能
- B: 侵袭性真菌感染疗程较长，患者出院后仍需口服氟康唑
- C: 出院后如发生过敏症状，可使用抗过敏药特非那定
- D: 如发生转氨酶升高，应考虑氟康唑的肝毒性

**答案：C**

31. 患者，男，56 岁，有高血压病史 4 年，体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。

- A: 干咳
- B: 光过敏
- C: 水肿
- D: 低血糖

**答案：A**

32. 青霉素用于()

- A: 钩端螺旋体病
- B: 伤寒、副伤寒
- C: 布鲁菌病
- D: 鼠疫、土拉菌病

**答案：A**

33. (2020 年真题) 哮喘急性发作首选的药物是

- A: 孟鲁司特片
- B: 布地奈德福莫特罗吸入剂
- C: 羧甲司坦口服液
- D: 沙丁胺醇气雾剂

**答案: D**

34. 哺乳期妇女应用沙丁胺醇时，早产儿会出现

- A: 耐药性
- B: 暂时性低血糖
- C: 头痛
- D: 支气管痉挛

**答案: B**

35. 属于促动力药的是()

- A: 胶体果胶铋
- B: 奥美拉唑
- C: 胃蛋白酶
- D: 莫沙必利

**答案: D**

36. 下列哪项不是血管紧张素转化酶抑制药的主要临床应用()

- A: 高血压
- B: 心律失常
- C: 充血性心力衰竭
- D: 心肌梗死

**答案: B**

37. (2021 年真题) 有关甲氨蝶呤药物相互作用的说法，错误的是 ( )

- A: 阿司匹林会减慢甲氨蝶呤的肾排泄
- B: 与顺铂等肾毒性药物合用，可能减慢甲氨蝶呤的肾排泄
- C: 碳酸氢钠会减慢甲氨蝶呤的肾排泄
- D: 丙磺舒会减慢甲氨蝶呤的肾排泄

**答案：C**

38. 治疗各种类型的癫痫选用

- A: 布桂嗪
- B: 多奈哌齐
- C: 佐匹克隆
- D: 丙戊酸钠

**答案：D**

39. 糖尿病合并发热、感染者可选用 ( )

- A: 格列吡嗪
- B: 格列喹酮
- C: 胰岛素
- D: 格列齐特

**答案：C**

40. 偶发失眠和暂时失眠可使用

- A: 卡马西平
- B: 唑吡坦
- C: 地西泮
- D: 苯巴比妥

**答案：B**

41. 属于 I c 类抗心律失常药的是()

- A: 奎尼丁
- B: 普鲁卡因胺
- C: 胺碘酮
- D: 普罗帕酮

**答案: D**

42. 喷托维林为中枢性镇咳药。

- A: 噻托溴铵
- B: 喷托维林
- C: 沙丁胺醇
- D: 氨溴索

**答案: B**

43. (2021 年真题) 渗透性强，可透过甲板，属于吡啶酮类的抗真菌药物是()

- A: 环吡酮胺
- B: 克霉唑
- C: 特比萘芬
- D: 米卡芬净

**答案: A**

44. 眼底散瞳检查宜选用

- A: 碘苷滴眼剂
- B: 拉坦前列素滴眼剂
- C: 氯霉素滴眼剂
- D: 托吡卡胺滴眼剂

**答案: D**

45. 作用于对青霉素敏感的革兰阳性菌以及部分革兰阴性杆菌的药物是  
( )

- A: 克拉维酸
- B: 氨曲南
- C: 亚胺培南
- D: 阿莫西林

**答案：D**

46. (2015 年真题) 治疗单纯疱疹性角膜炎不宜选用的药品是 ( )。

- A: 碘苷滴眼液
- B: 四环素可的松滴眼液
- C: 更昔洛韦滴眼液
- D: 利巴韦林滴眼液

**答案：B**

47. 伐昔洛韦口服后在肝脏水解为

- A: 阿昔洛韦
- B: 更昔洛韦
- C: 喷昔洛韦
- D: 西多福韦

**答案：A**

48. 分泌盐皮质激素的是

- A: 网状带
- B: 束状带
- C: 束状带和网状带
- D: 球状带

**答案：D**

49. 以下关于睾酮替代治疗的描述，错误的是

- A: 在补充雄激素前，应常规进行前列腺直肠指检
- B: 最好选择能模拟睾酮生理分泌节律的药物
- C: 丙酸睾酮应采用静脉注射
- D: 长期应用高剂量雄激素注意监测电解质、心功能与肝功能

**答案：C**

50. 以下关于 PPI 用法用量的描述，错误的是

- A: 艾司奥美拉唑口服用于 Hp 根除时，一次 40mg，一日 2 次
- B: 奥美拉唑口服用于 Hp 根除时，一次 40mg，一日 2 次
- C: 泮托拉唑口服用于 Hp 根除时，一次 40mg，一日 2 次
- D: 泮托拉唑静脉给药用于急性上消化道出血时，一次 40mg~80mg，每日 1~2 次

**答案：B**

51. (2019 年真题) 关于外用糖皮质激素类药物的说法，错误的是 ( )

- A: 外用糖皮质激素具有抗炎、抗过敏等作用
- B: 外用糖皮质激素不应长期、大面积应用
- C: 治疗全身性或严重过敏疾病时，不宜合用口服抗过敏药
- D: 外用糖皮质激素可增加感染风险

**答案：C**

52. 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的是 ( )。

- A: 依折麦布
- B: 非诺贝特
- C: 阿昔莫司

D: 阿托伐他汀

**答案：D**

53. 对地高辛中毒出现异位心律者可静脉注射

A: 利尿剂

B: 苯妥英钠

C: 氯化钾、葡萄糖注射液

D: 阿托品

**答案：B**

54. （2015 年真题）降糖作用迅速，被称为“餐时血糖调节剂”的降糖药是（ ）。

A: 普萘洛尔

B: 二甲双胍

C: 格列美脲

D: 瑞格列奈

**答案：D**

55. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式（控制饮食，增强运动）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片治疗。

A: CK

B: BUN

C: Cr

D: Hcy

**答案：A**

56. 男性，68 岁，发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠，气急，近 2 天全身散在出血点及瘀斑，血压 60/40mmHg，血红蛋白 120g/L，白细胞  $12 \times 10^9/L$

- A: 低分子肝素
- B: 鱼精蛋白
- C: 维生素 K
- D: 维生素 C

**答案：B**

57. 不可用于降低眼压的药物是

- A: 卡替洛尔滴眼剂
- B: 毛果芸香碱滴眼剂
- C: 利福平滴眼剂
- D: 拉坦前列素滴眼剂

**答案：C**

58. 肝素过量所致出血的解救药物是()

- A: 鱼精蛋白
- B: 酚磺乙胺
- C: 蛇毒血凝酶
- D: 维生素 K

**答案：A**

59. (2019 年真题) 有些药品的不良反应源于药物制剂的辅料，紫杉醇注射液中可能引起过敏反应的辅料是 ( )

- A: 聚乙烯醇蓖麻油
- B: 邻苯二甲酸二辛酯
- C: 乙醇
- D: 聚氯乙烯

**答案：A**

60. 起效缓慢,可增加心力衰竭和女性骨折风险的口服抗糖尿病药物是  
( )

- A: 利拉鲁肽
- B: 艾塞那肽
- C: 瑞格列奈
- D: 罗格列酮

**答案：D**

61. 可使维生素 B

- A: 雌激素
- B: 异烟肼
- C: 丙磺舒
- D: 糖皮质激素

**答案：A**

62. 下列关于胺碘酮的叙述错误的是

- A: 适用于合并器质性心脏病的心率失常
- B: 促心率失常反应少
- C: 可以用于窦房传导阻滞
- D: 对室上性和室性心律失常均有效

**答案：C**

63. 关于唑吡坦作用特点的说法,错误的是()

- A: 唑吡坦属于  $\gamma$ -氨基丁酸 A 型受体激动剂
- B: 唑吡坦血浆蛋白结合率高
- C: 唑吡坦具有镇静催眠作用,抗焦虑作用

D: 口服唑吡坦后消化道吸收迅速

**答案：C**

64. 叶酸主要用于治疗

A: 缺铁性贫血

B: 妊娠期巨幼红细胞性贫血

C: 溶血性贫血

D: 再生障碍性贫血

**答案：B**

65. 某患者，突发高热、呕吐、惊厥，数小时后出现面色苍白、四肢厥冷、脉搏细速、血压下降至休克水平。经实验室检查诊断为暴发型流脑所致的感染中毒性休克，应采取的抗休克药物为()

A: 糖皮质激素

B: 酚妥拉明

C: 阿托品

D: 右旋糖酐

**答案：A**

66. 以下关于制霉菌素的描述中，错误的是

A: 对念珠菌属抗菌活性较高，但易产生耐药性

B: 局部外用治疗浅表真菌感染

C: 作用机制与两性霉素 B 相似

D: 口服吸收很少

**答案：A**

67. 患者，男性，46 岁，经常头痛，头晕近 8 年。2 天来头痛加重，伴有恶心、呕吐送往急诊。查体：神志模糊，血压 230 / 120mmHg。尿蛋白(++)，尿糖(+)。入院治疗，经处理，血压仍为 202 / 120mmHg，且气急不能平卧，心率 108 次 / 分，早搏 3 次 / 分。两肺底有湿啰音。

- A: 硫氰酸盐不超过 50  $\mu\text{g} / \text{ml}$ ，氰化物不超过 2  $\mu\text{mol} / \text{ml}$
- B: 硫氰酸盐不超过 200  $\mu\text{g} / \text{ml}$ ，氰化物不超过 4  $\mu\text{mol} / \text{ml}$
- C: 硫氰酸盐不超过 100  $\mu\text{g} / \text{ml}$ ，氰化物不超过 3  $\mu\text{mol} / \text{ml}$
- D: 硫氰酸盐不超过 20  $\mu\text{g} / \text{ml}$ ，氰化物不超过 1  $\mu\text{mol} / \text{ml}$

**答案：C**

68. 不可用于降低眼压的药物是()

- A: 毛果芸香碱滴眼液
- B: 卡替洛尔滴眼剂
- C: 利福平滴眼剂
- D: 拉坦前列素滴眼剂

**答案：C**

69. 临床首选用于治疗土拉菌病和鼠疫的抗生素为()

- A: 奈替米星
- B: 链霉素
- C: 阿米卡星
- D: 异帕米星

**答案：B**

70. 某患儿高烧就医，诊断为重症流感，医生对患儿进行治疗的同时，建议与患儿有密切接触的家属预防服用奥司他韦。关于奥司他韦预防用药的说法，正确的建（）

- A: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 75mg

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

B: 应于密切接触流感患的 2 天以内预防服用，每急日两次，每次 75mg

C: 应于密切接触流感患儿的 3 天以内预防服用，每日两次，每次 150mg

D: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 150mg

**答案：A**

71. 可导致新生儿的戒断症状和呼吸抑制的是

A: 沙丁胺醇

B: 氨茶碱

C: 布地奈德

D: 可待因

**答案：D**

72. 属于 P-糖蛋白的底物，提高辛伐他汀发生横纹肌溶解危险性的是

A: 利福平

B: 地高辛

C: 红霉素

D: 烟酸

**答案：B**

73. 胰岛素对代谢的作用叙述错误的是

A: 抑制脂肪的合成

B: 抑制糖原分解

C: 促进糖原合成

D: 减少酮体生成

**答案：A**

74. 抗菌谱极窄，仅对细胞外的结核分枝杆菌有抑制作用的是

- A: 对氨基水杨酸
- B: 红霉素
- C: 氟曲南
- D: 克拉霉素

**答案：A**

75. 为强心苷中极性最低，且口服可完全吸收的药物是()

- A: 洋地黄毒苷
- B: 地高辛
- C: 去乙酰毛花苷丙
- D: 毛花苷丙

**答案：A**

76. 氨基糖苷类的作用特点是

- A: 在酸性环境中抗菌作用增强
- B: 日剂量一次给药可达到满意杀菌效果
- C: 只对繁殖期细菌有杀菌作用
- D: 口服给药可治疗全身性感染

**答案：B**

77. 袢利尿药中，结构中不含有磺酰胺基，可以用于对磺胺过敏者的是()

- A: 托拉塞米
- B: 呋塞米
- C: 依他尼酸
- D: 布美他尼

**答案：C**

78. 可导致红绿色盲的是

- A: 吡嗪酰胺
- B: 乙胺丁醇
- C: 异烟肼
- D: 红霉素

**答案：B**

79. 治疗儿童癫痫，对认知功能和行为影响较小的药物是（）

- A: 卡马西平
- B: 丙戊酸钠
- C: 苯巴比妥
- D: 乙酰胺

**答案：A**

80. （2020 年真题）患者，女，45 岁。诊断为高血压合并甲状腺功能亢进，心率过快，宜选用的抗高血压药是

- A: 吲达帕胺
- B: 赖诺普利
- C: 氨氯地平
- D: 普萘洛尔

**答案：D**

81. 糖皮质激素的抗炎作用是

- A: 提高机体对细菌内毒素的耐受力
- B: 抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理
- C: 抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶
- D: 提高中枢神经系统的兴奋性

**答案：C**

82. 患者，女，45 岁，因强直性脊柱炎住院，同时伴有胃溃疡、高血压及糖尿病，药师审核医嘱，发现应当禁用的药品是

- A: 双氯芬酸
- B: 硝苯地平
- C: 格列齐特
- D: 雷尼替丁

**答案：A**

83. 袢利尿药可增强强心苷对心脏的毒性，这是因为袢利尿药可以造成

- A: 低镁血症
- B: 低血压
- C: 低钠血症
- D: 低钾血症

**答案：D**

84. 干扰核酸生物合成的药物是()

- A: 顺铂
- B: 氟尿嘧啶
- C: 高三尖杉酯碱
- D: 多柔比星

**答案：B**

85. 口服难吸收，用于治疗溃疡性结肠炎的药物()

- A: 磺胺嘧啶
- B: 磺胺甲噁唑
- C: 柳氮磺吡啶

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

D: 磺胺米隆

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/725310240122012033>