专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024河北省平山县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背200题题库带答案（巩固）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.多黏菌素B的抗菌机制是

A：影响胞浆膜的通透性

B：抑制蛋白质合成的全过程

C：抑制细菌细胞壁的合成

D：影响叶酸代谢

答案：A

2.治疗侵袭性曲霉菌病首选()

A：氟胞嘧啶

B：灰黄霉素

C：伏立康唑

D：氟康唑

答案：C

3.毛果芸香碱的作用特点不包括

A：术后以抵消睫状肌麻痹剂或散瞳药的作用

B：减少房水生成

C：用于白内障人工晶状体植人手术中缩瞳

D：收防止激光手术后的反应性眼压升高

答案：B

4.（2021年真题）促进尿酸排泄的抗痛风药物是（）

A：秋水仙碱

B：双氯芬酸

C：苯溴马隆

D：双醋瑞因

答案：C

5.关于达比加群酯的描述，错误的是

A：胺碘酮可使达比加群酯血浆浓度提高50%

B：与阿司匹林联用不会增加出血风险

C：应用期间不能口服奎尼丁类药物

D：用药期间应监测凝血功能、肝功能

答案：B

6.大剂量可导致Q-Tc间期延长的是

A：多潘立酮

B：西沙必利

C：莫沙必利

D：甲氧氯普胺

答案：B

7.老年人对苯二氮（艹卓）类药较为敏感，用药后可致平衡功能失调，觉醒后可发生步履蹒跚、思维迟缓等症状，在临床上称为

A：老年期痴呆

B：戒断综合征

C：震颤麻痹综合征

D：“宿醉”现象

答案：D

8.（2016年真题）华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是

A：维生素B2

B：依诺肝素

C：维生素B1

D：维生素B12

答案：B

9.与长春新碱合用可增强神经毒性

A：替尼泊苷

B：非格司亭

C：异烟肼

D：铂类

答案：A

10.以下哪项不是糖皮质激素的不良反应

A：电解质紊乱

B：诱发癫痫

C：伤口愈合缓慢

D：心律失常

答案：D

11.口服首过消除明显，常舌下给药的是

A：胍乙啶

B：普萘洛尔

C：阿昔莫司

D：硝酸甘油

答案：D

12.作用机制是有丝分裂抑制剂的是

A：巯嘌呤

B：紫杉醇

C：吉非替尼

D：枸橼酸他莫昔芬

答案：B

13.顺铂作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗

A：慢性淋巴细胞性白血病

B：非小细胞肺癌

C：纤维瘤

D：恶性淋巴瘤

答案：B

14.用于单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的2型糖尿病的降糖药物是

A：格列本脲

B：二甲双胍

C：罗格列酮

D：阿卡波糖

答案：B

15.属于胰岛素增敏剂的是

A：艾塞那肽

B：阿卡波糖

C：瑞格列奈

D：罗格列酮

答案：D

16.加重洋地黄中毒的易感因素为

A：伴有房颤的心功能不全

B：低钾血症

C：甲状腺功能减退症

D：低镁血症

答案：C

17.防治血栓性疾病如心肌梗死、脑梗死的药物是()

A：维生素K

B：非格司亭

C：氨甲环酸

D：香豆素类

答案：D

18.恶性贫血可选用

A：肝素

B：维生素K

C：维生素B

D：香豆素类

答案：C

19.可以引起低钾血症和低镁血症，增加洋地黄中毒危险的是

A：克拉霉素

B：胺碘酮

C：硫酸镁

D：呋塞米

答案：D

20.与脊髓上水平的中枢镇痛、欣快感和依赖性有关的受体

A：K受体

B：μ2受体

C：μ1受体

D：δ 受体

答案：C

21.（2017年真题）可以引起耳蜗神经、肾损害的药物是（）

A：多西环素

B：甲砜霉素

C：加替沙星

D：庆大霉素

答案：D

22.复方左炔诺孕酮片、复方孕二烯酮片均含有的成份是

A：炔雌醇

B：去氧孕烯

C：雌二醇

D：维生素B6

答案：A

23.需要皮下注射的糖尿病治疗药物是

A：艾塞那肽

B：那格列奈

C：阿卡波糖

D：二甲双胍

答案：A

24.以多酶或辅酶形式参与体内新陈代谢及重要的生化反应的是

A：葡萄糖

B：维生素

C：果糖

D：脂肪乳

答案：B

25.糖尿病合并轻度肾功能不全患者宜选用

A：二甲双胍

B：格列喹酮

C：普通胰岛素

D：低精蛋白锌胰岛素

答案：B

26.阿米卡星与万古霉素合用()

A：不良反应叠加

B：药理作用拮抗

C：后者血药浓度下降，药效降低

D：后者血药浓度升高，不良反应增加

答案：A

27.抑制Na

A：呋塞米

B：氢氯噻嗪

C：乙酰唑胺

D：氨苯蝶啶

答案：B

28.同用可抵消降钙素对高钙血症疗效的是

A：双膦酸盐类骨吸收抑制剂

B：钙剂

C：维生素D

D：铁剂

答案：C

29.（2017年真题）属于DPP-4抑制剂的药物是（）

A：伏格列波糖

B：那格列奈

C：利拉鲁肽

D：阿格列汀

答案：D

30.下述药物中不可用于治疗深部真菌感染的是

A：伊曲康唑

B：两性霉素

C：制霉菌素

D：灰黄霉素

答案：D

31.患者。男，42岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

A：1

B：10%~30%

C：30%~90%

D：大于90%

答案：D

32.为高分子聚合物，通过增加局部渗透压软化大便，对肠道pH没有影响的是

A：开塞露

B：乳果糖

C：聚乙二醇4000

D：酚酞

答案：C

33.用于成人非瓣性房颤患者的卒中和全身栓塞，治疗深静脉血栓形成，解救药可用艾达司珠单抗的是

A：肝素

B：依达肝素

C：达比加群酯

D：华法林

答案：C

34.（2016年真题）属于羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂的是

A：阿昔莫司

B：非诺贝特

C：阿托伐他汀

D：依折麦布

答案：C

35.可使磷酰化胆碱酯酶复活的药物

A：匹鲁卡品

B: 碘解磷定

C: 毒扁豆碱

D: 阿托品

答案：B

36.适用于各种类型疟疾的症状控制，尤其是对抗氯喹恶性及凶险型疟疾有较好疗效的药物是

A: 乙胺嘧啶

B: 蒿甲醚

C: 双氢青蒿素

D: 奎宁

答案：C

37.（2021年真题）乙内酰脲类药通过减少钠离子内流而使神经细胞稳定，限制Na+通道介导的发作性放电的扩散，属于该类的抗癫痫药物是（）

A: 苯妥英钠

B: 卡马西平

C: 左乙拉西坦

D: 加巴喷丁

答案：A

38.作用于DNA拓扑异构酶Ⅰ的生物碱是

A: 来曲唑

B: 卡莫氟

C: 甲氨蝶呤

D: 喜树碱

答案：D

39.哌拉西林

A：脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

B：口服，肌内注射或静脉注射均可用于全身感染

C：肾毒性较大

D：与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

答案：D

40.长期使用应定期检查甲状腺功能的药物是

A：索他洛尔

B：普罗帕酮

C：胺碘酮

D：利多卡因

答案：C

41.关于阿奇霉素使用的叙述，错误的是

A：治疗儿童中耳炎、肺炎时，阿奇霉素首次剂量为后续剂量的3倍

B：若需服含铝或镁的抗酸药，阿奇霉素应在服用上述药物前1小时或后2小时给予

C：治疗儿童中耳炎、肺炎时，阿奇霉素的疗程为5天

D：阿奇霉素一天一次口服即可

答案：A

42.作用机制是竞争雌激素受体的是

A：枸橼酸他莫昔芬

B：吉非替尼

C：紫杉醇

D：巯嘌呤

答案：A

43.患者,女75岁,既往有2型糖尿病史18年,有青霉素过敏史,因车祸导致左下肢开放性骨折,术后发生骨髓炎,给予克林霉素治疗10余天,临床应关注的典型不良反应是

A: 抗生素相关性腹泻

B: 肌肉震颤

C: 红人综合征

D: 急性溶血性贫血

答案：A

44.下列不属于治疗前列腺增生的药物是

A: 西地那非

B: 坦洛新

C: 非那雄胺

D: 特拉唑嗪

答案：A

45.硝酸酯类药物舒张血管的作用机制是

A: 产生NO，激活乌苷酸环化酶，使细胞内cGMP升高

B: 激动血管平滑肌上的β2受体，使血管扩张

C: 抑制磷酸二酯酶

D: 产生NO，激活腺苷酸环化酶，使细胞内cAMP升高

答案：A

46.可作为心血管不良事件一级和二级预防的药物是()

A: 塞来昔布

B: 对乙酰氨基酚

C：双氯芬酸

D：阿司匹林

答案：D

47.有心肌梗死、脑梗死病史患者可以使用

A：水杨酸类

B：芳基乙酸类

C：选择性COX-2抑制剂

D：芳基丙酸类

答案：A

48.铜绿假单胞菌感染首选的抗菌药物是()。

A：罗红霉素

B：头孢他啶

C：利奈唑胺

D：头孢曲松

答案：B

49.作用于外周多巴胺受体，神经系统副作用罕见的是

A：甲氧氯普胺

B：莫沙必利

C：西沙必利

D：多潘立酮

答案：D

50.治疗系统性红斑狼疮选用

A：甲苯咪唑

B：吡喹酮

C: 氯喹

D: 甲硝唑

答案：C

51.司坦唑醇的禁忌证不包括

A: 严重心功能不全

B: 男性乳腺癌

C: 肾炎

D: 前列腺增生

答案：A

52.下列不属于雌激素禁忌证的是

A: 儿童禁用

B: 乳腺癌

C: 急慢性肝功能不全

D: 生殖系统恶性肿瘤

答案：A

53.可能引起高铁血红蛋白血症的抗高血压药是

A: 阿托普利

B: 硝普钠

C: 阿利克仑（阿利吉仑）

D: 氨氯地平

答案：B

54.抗阿米巴原虫药的药物是()。

A: 伯氨喹

B: 奎宁

C: 氯喹

D: 甲硝唑

答案：D

55.属于抗胆碱药的是()

A: 奥美拉唑

B: 哌仑西平

C: 氢氧化铝

D: 雷尼替丁

答案：B

56.硝酸酯类药物舒张血管的作用机制是

A: 促进前列环素的生成

B: 直接作用于血管平滑肌

C: 阻断 β 受体

D: 释放一氧化氮

答案：D

57.需要1周才起效的是

A: 氟西汀

B: 文拉法辛

C: 吡拉西坦

D: 吗氯贝胺

答案：B

58.复方氨基酸注射液出现发热、头痛、心悸、寒战等反应，主要是因为

A: 含有过敏原

B：患者的个体差异

C：含有的氨基酸种类太多

D：静脉滴注速度过快

答案：D

59.喷托维林为中枢性镇咳药。

A：氨溴索

B：喷托维林

C：沙丁胺醇

D：噻托溴铵

答案：B

60.（2016年真题）属于α1受体阻断剂的抗良性前列腺增生症的药品是

A：酚妥拉明

B：度他雄胺

C：普适秦

D：特拉唑嗪

答案：D

61.服用时必须坐位或立位、空腹、服后30分钟内不宜进食和卧床的药品是

A：依普黄酮

B：依降钙素

C：阿仑膦酸钠

D：雷洛昔芬

答案：C

62.氯霉素与剂量和疗程无关的严重不良反应是()

A：可逆的性骨髓抑制

B：二重感染

C：灰婴综合征

D：严重的再生障碍性贫血

答案：D

63.下述药物中属于鼻腔减充血剂的是

A：色甘酸钠溶剂

B：链霉素溶剂

C：盐酸麻黄碱溶剂

D：布地奈德气雾剂

答案：C

64.可作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌和肠杆菌作用的药物是

A：亚胺培南

B：氨曲南

C：克拉维酸

D：阿莫西林

答案：B

65.氯沙坦的降压作用机制是()

A：阻断 α 受体

B：阻断AT

C：阻断 β 受体

D：阻断AT

答案：D

66.口服用于肠道感染或肠道手术前准备的药物是

A：新霉素

B：妥布霉素

C：庆大霉素

D：异烟肼

答案：C

67.引起妇女面部和躯体的多毛症，男性若长期应用，可表现为男子女性乳房的是()

A：特拉唑嗪

B：十一酸睾酮

C：非那雄胺

D：普适泰

答案：B

68.神经毒性是剂量依赖性的是()

A：亚叶酸钙

B：顺铂

C：卡铂

D：奥沙利铂

答案：D

69.可用于骨和关节感染的药物是()

A：青霉素

B：万古霉素

C：四环素

D：林可霉素

答案：D

70.适用于治疗精神分裂症、躁狂症的药物是

A：氯氮平

B：阿立哌唑

C：利培酮

D：碳酸锂

答案：A

71.关于达比加群酯的描述，错误的是

A：与阿司匹林联用不会增加出血风险

B：为直接凝血酶的抑制剂

C：用药期间应监测凝血功能、肝功能

D：长期口服安全性较好

答案：A

72.（2018年真题）具有强大的抗凝血因子Xa功能及微弱的抗凝血酶作用,可用于预防深静脉血栓形成的药物是（）

A：华法林

B：那屈肝素钙

C：阿加曲班

D：尿激酶

答案：B

73.糖尿病酮症酸中毒患者宜选用

A：正规胰岛素

B：珠蛋白锌胰岛素

C：格列喹酮

D：二甲双胍

答案：A

74.可使洋地黄化时发生心脏传导阻滞，尤其是同时静脉注射钙盐时，该药物是

A：克拉霉素

B：硫酸镁

C：胺碘酮

D：呋塞米

答案：B

75.吡嗪酰胺联用丙磺舒使

A：月经不规则

B：吸收减少

C：肝毒性增加

D：疗效减弱

答案：D

76.通过与敏感需氧革兰阴性菌细胞膜上PBP3的高度亲合而发挥杀菌作用，仅对需氧革兰阴性菌包括铜绿假单胞菌具有良好抗菌活性，对革兰阳性菌和厌氧菌作用差的是

A：头孢他啶

B：头孢美唑

C：头孢噻肟

D：氨曲南

答案：D

77.卡替洛尔的副作用不包括

A：结膜充血

B：可产生暗黑感

C：眼底黄斑部水肿

D：近视化倾向

答案：A

78.有机磷酸酯中毒的解救宜选用

A：阿托品

B：纳洛酮

C：多潘立酮

D：鱼精蛋白

答案：A

79.罗格列酮的降糖作用机制是

A：刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

B：直接补充胰岛素

C：提高靶组织对胰岛素的敏感性

D：竞争性抑制 a 葡萄糖苷酶

答案：C

80.调节酸平衡药中，临床上最常用的碱性药是()

A：碳酸氢钠

B：乳酸钠

C：氯化铵

D：氯化钠

答案：A

81.鲑降钙素对骨质疏松症进行治疗期间．为防继发性甲状旁腺功能亢进需要补充

A：阿仑膦酸钠

B：钙剂

C：维生素D

D：铁剂

答案：B

82.通过阻断血管紧张素Ⅱ受体而逆转心肌肥厚，减轻心力衰竭的药物是

A：氯沙坦

B：氨力农

C：地高辛

D：美托洛尔

答案：A

83.茶碱浓度15-20ug/ml时可出现

A：心动过速、心律失常

B：恶心、呕吐、失眠

C：为有效的治疗浓度

D：呼吸、心跳停止

答案：B

84.主要用于解热镇痛，但几乎没有抗炎作用的药物是

A：阿司匹林

B：对乙酰氨基酚

C：吲哚美辛

D：塞来昔布

答案：B

85.下列硝酸酯类药物起效最快的是

A: 戊四醇酯

B: 硝酸甘油

C: 硝酸异山梨酯

D: 单硝酸异山梨酯

答案：B

86.1～5岁儿童甲状腺功能减退症，左甲状腺素每日完全替代剂量为

A: 25μg

B: 5μg/kg

C: 4μg/kg

D: 6μg/kg

答案：B

87.可用于治疗重度痤疮，但妊娠期妇女避免使用的药物是

A: 异维A酸

B: 特比萘芬

C: 克罗米通

D: 克拉霉素

答案：A

88.促消化的药物应()

A: 空腹内服

B: 睡前内服

C: 定时内服

D: 饭前内服

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/725312333114012033