

外科护理学期末考试试卷试题+答案

1. 患儿, 男, 3 岁。在家独自一人玩耍时, 右上肢被开水烫伤, 检查发现右上肢有大小水疱, 疱壁较厚, 基底苍白与潮红相间, 痛觉迟钝, 其深 II 度烧伤局部损伤的深度达 ()

- A. 表皮层
- B. 真皮浅层
- C. 真皮深层(正确答案)
- D. 皮下组织
- E. 肌层

2 选择非手术治疗的泌尿系结石患者, 其结石的直径应小于 ()

- A、0.6cm(正确答案)
- B、1.2cm
- C、1.6cm
- D、2.2cm
- E、2.5cm

3. 患者, 男, 46 岁。因嵌顿性疝急诊入院, 1 小时前接受手法复位后回到病房, 作为责任护士应重点观察 ()

- A. 生命征
- B. 神志变化
- C. 腹痛、腹部体征(正确答案)
- D. 呕吐腹胀
- E. 肛门排气

4、甲状腺次全切除术后呼吸困难和窒息的常见原因不包括 ()

- A. 喉头水肿
- B. 出血
- C. 气管塌陷

D. 痰液堵塞

E. 双侧喉上神经损伤(正确答案)

5. 疝内容物与疝囊壁发生粘连而不能完全回纳入腹腔的疝是 ()

A. 易复性疝

B. 滑动性疝

C. 难复性疝(正确答案)

D. 嵌顿性疝

E. 绞窄性疝

6. 患者，女，40岁。诊断为原发性甲亢，清晨未起床前测其脉率115次/分，血压137/75mmHg，估计该患者甲亢的程度为 ()

B. 中度

A. 轻度

C. 重度(正确答案)

D. 不能明确

E. 特重

7. 抗休克时应用血管扩张剂的前提是 ()

A. 与血管收缩剂交替使用(正确答案)

B. 舒张压 >60 mmHg

C. 心功能正常

D. 血容量补足

E. 收缩压 <100 mmHg

8. 患者，女，30岁。因疲乏无力、怕热多汗、体重减轻，爱发脾气，诊断为甲状腺功能亢进。护士为其进行饮食指导时，应告诉患者避免食用 ()

A. 高热量、高蛋白食物

B. 含碘丰富的食物(正确答案)

C. 低纤维素食物

D. 富含钾、钙的食物

E. 豆腐、豆浆等豆制品

9. 给予休克患者吸氧, 适宜的氧流量为 ()

- A. 2-4L/min
- B. 4-6L/min
- C. 6~8L/min(正确答案)
- D. 8-10L/min
- E. 10-12L/min

10. 患者, 女, 55 岁。甲状腺功能亢进病史 7 年, 经内科治疗效果不佳, 入院拟行甲状腺大部分切除术。术前为抑制甲状腺素的释放, 并使腺体缩小变硬, 常用的药物是 ()

- A. 复方碘化钾溶液(正确答案)
- B. 普萘洛尔
- C. 甲硫氧密呢
- D. 丙硫氧密呢
- E. 地西洋

11. 患者, 男, 40 岁。因腹股沟直疝行修补术后 5 天, 在为患者进行出院前健康教育, 应告知术后避免重体力劳动 ()

- A. 15 天
- B. 1 个月
- C. 2 个月
- D. 3 个月(正确答案)
- E. 半年

12. 患者, 男, 34 岁。塌方事故中发生骨盆、左股骨及胫腓骨多处骨折, 最可能引起的并发症是 ()

- A. 休克(正确答案)
- B. 脂肪栓塞
- C. 骨筋膜室综合征
- D. 骨折部位感染
- E. 缺血性肌挛缩

13. 门静脉高压症最凶险的并发症是 ()

- A. 感染
- B. 贫血
- C. 上消化道大出血(正确答案)
- D. 肝昏迷
- E. 低蛋白血症

14. 患者, 男, 38 岁。头部碰撞发生颈椎骨折, 行颅骨牵引时应采取的体位是 ()

- A. 俯卧位
- B. 头低足高位
- C. 头高足低位(正确答案)
- D. 侧卧位
- E. 中凹卧位

15. 易在碱性尿中形成的结石是 ()

- A、尿酸结石
- B、胱氨酸结石
- C、磷酸钙结石(正确答案)
- D、草酸钙结石
- E、混合型结石

16. 患者, 男、20 岁。消防员, 体重 80kg, 因救火时全身被火焰烧伤, II—III 度烧伤总面积为 60%, 7 天后患者不幸死亡, 其主要致死原因可能是 ()

- A. 休克
- B. 心功能不全
- C. 脓毒症(正确答案)
- D. 急性肾衰竭
- E 水、电解质紊乱

17. 患者, 男, 56 岁。行腹部手术后第 6 天出现顽固性呃逆, 应警惕 ()

- A. 切口感染

B. 肺不张

C. 急性胃扩张

D. 膈下感染(正确答案)

E. 肠梗阻

18. 膀胱结石的典型症状 ()

A、肉眼血尿

B、腹部绞痛

C、排尿中断(正确答案)

D、恶心呕吐

19. 患者，男性，34岁。高处坠落致颈椎骨折合并脊髓损伤，其早期可能出现 ()

A、脂肪栓塞

B、四肢肌萎缩

C、四肢畸形

D、呼吸困难(正确答案)

20. 为预防结石的复发，每日至少饮水 ()

A、1000ml

B、1500ml

C、2000ml

D、2500ml

E、3000ml(正确答案)

21. 心搏、呼吸骤停后，耐受缺血缺氧能力最差的器官是 ()

A. 肾

B. 脑(正确答案)

C. 心

D. 肝

E. 肺

22. 尿酸结石者应限制食用 ()

A、肉类

B、豆制品

C、动物内脏(正确答案)

D、水果

23. 肾损伤的主要临床表现为 ()

A、腰部疼痛

B、肉眼血尿或镜下血尿(正确答案)

C、腰部肿块

D、发热

E、不易纠正的严重休克

24. 用新九分法评估成人的烧伤面积, 错误的是 ()

A. 头、面、颈部各为 3%

B. 双上臂为 6%(正确答案)

C. 躯干为 27%

D. 双臂为 5%

E. 双前臂为 6%

25. 患者, 女, 52 岁。因严重创伤后, 血压降低, 脉搏细速, 面色苍白, 尿量减少, 诊断为休克。抢救时首先输入的是 ()

A. 5%葡萄糖溶液

B. 0.9%氯化钠溶液

C. 5%碳酸氢钠溶液

D. 平衡盐溶液(正确答案)

E. 20%甘露醇溶液

26. 患者, 男, 32 岁。因脊椎骨折行躯体石膏固定。固定后患者出现持续性恶心, 反复呕吐, 腹胀及腹痛, 可能为 ()

A. 急性阑尾炎

B. 急性肠梗阻

C. 骨筋膜室综合征

D. 石膏综合征(正确答案)

E. 急性胃肠炎

27. 患者, 男, 22 岁因火灾致面部烧伤入院。体检发现, 患者声音嘶哑, 口鼻处有黑色分泌物, 鼻毛烧焦。该患者目前最主要危险是 ()

A. 呼吸衰竭

B. 肺部感染

C. 肺水肿

D. 窒息(正确答案)

E 呼吸性碱中毒

28. 多根多处肋骨骨折最严重的病理生理改变是 ()

A. 胸部疼痛, 呼吸运动减弱

B. 出血休克

C. 咳嗽, 血痰

D 胸壁软化, 反常呼吸(正确答案)

E 严重皮下气肿

29. 患者, 女, 22 岁, 因车祸致胸部损伤, 轻度胸痛, 但无明显呼吸困难, X 线检查示有少量气胸, 其肺受压萎陷不超过 ()

A. 10%

B. 20%

C. 30%(正确答案)

D. 40%

E. 50%

30. 患者, 男, 50 岁。在腰麻下行膀胱切开取石术, 术毕返回病房后。患者诉头痛, 引起患者头痛的主要原因是 ()

A. 术中出血

B. 迷走神经亢进

C. 颅内压增高

D. 脑脊液外漏(正确答案)

E. 精神紧张

31. 口对口人工呼吸有效的标志是 ()

A. 腹部起伏

B. 胸廓上抬(正确答案)

C. 吹气通畅

D. 有气流呼出

E. 大动脉搏动

32. 患者，男，25岁。车祸致腹部损伤，入院X线检查见下游离气体，下述不可能发生的是 ()

A. 肝破裂(正确答案)

B. 十二指肠破裂

C. 胃破裂

D. 结肠破裂

E. 小肠破裂

33. 患者，女，44岁。胃溃疡穿孔合并急性弥漫性腹膜炎，行胃大部切除术后，为预防并发膈下脓肿，术后最常用的有效措施是 ()

A. 早期下床活动

B. 大剂量抗生素

C. 半卧位(正确答案)

D. 禁食

E. 胃肠减压

34. 患者，男，40岁。因急性腹膜炎入院，拟行手术治疗，手术指征除外 ()

A. 腹部体征已减轻，但担心病变严重(正确答案)

B. 非手术治疗6小时后，腹膜炎症状及体征不缓解

C. 怀疑腹腔内原发病严重

D. 出现肠麻痹、休克表现

E. 腹膜炎病因不明，且无局限趋势

35. 患者，男，45岁。患腹膜炎，术后第6天，T38℃，排便次数增多，里急后重，黏液血便，应考虑（）

- A. 细菌性痢疾
- B. 合并肠炎
- C. 膈下脓肿
- D. 肠粘连
- E. 盆腔脓肿(正确答案)

36. 骨折和脱位共有的专有体征是 A()

- A. 畸形(正确答案)
- B. 异常活动
- C. 疼痛、肿胀、功能障碍
- D. 骨擦音、骨擦感
- E. 弹性固定

37. 患者，女，30岁III期内痔，行手术治疗作为巡回护士的你，应给该患者采取何种手术体位（）

- A. 仰卧位
- B. 俯卧位
- C. 侧卧位
- D. 膀胱截石位(正确答案)
- E. 头低足高位

38. 张力性气胸急救时首先应（）

- A 胸腔穿刺排气(正确答案)
- B. 迅速封闭胸壁伤口
- C 清创
- D 气管切开
- E 加压吸氧

39. 患者，男，60岁。股骨颈骨折行牵引术，患者卧床期间，为预防泌尿系结石应（）

- A. 使用利尿剂
- B. 应用钙剂
- C. 多饮水(正确答案)
- D. 膀胱按摩
- E. 使用抗生素

40. 患者男, 42 岁, 建筑工人。右上臂被转块击伤 1 时。查体: 右上臂肿胀, 有异常活动, 拇指、腕及掌指关节不能背伸、垂腕, 可能是骨折损伤了 ()

- A. 肱动脉
- B. 桡神经
- C. 正中神经(正确答案)
- D. 尺神经
- E. 桡动脉

41. 硬膜外麻醉最严重的并发症是 ()

- A. 血压下降
- B. 神经损伤
- C. 硬膜外血肿
- D. 硬膜外腔感染
- E. 全脊髓麻醉(正确答案)

42 患者, 男, 18 岁。胸外伤后出现严重皮下气肿和极度呼吸困难首先应考虑为 ()

- A. 肋骨骨折
- B. 张力性气胸(正确答案)
- C. 血胸
- D. 肺挫伤
- E. 创伤性窒息

43. 患者, 男, 22 岁。胸部损伤后出现胸痛, 呼吸困难。查体: 血压 80/60mmHg, 气管向健侧移位, 伤侧胸部叩诊浊音, 呼吸音减弱等。胸膜腔穿刺抽及不凝固血液。护士在护理胸腔闭式引流时, 下列不正确的是 ()

- A. 为保持管道密闭,水封瓶的长管应置于液面下 3--4cm
- B. 保持引流管通畅
- C. 引流瓶放置应低于胸腔引流口 60cm 以上
- D. 鼓励患者经常深呼吸与咳嗽
- E. 24 小时引流液少于 100ml,可拔除引流管(正确答案)

44. 下列哪项是原发性腹膜炎的病因 ()

- A. 手术时腹腔被污染
- B. 病原菌经血行播散到腹腔(正确答案)
- C. 阑尾炎症扩散
- D. 胃肠道穿孔
- E. 肝破裂

45. 患者,男,21岁。因突发剑突下钻顶样剧烈疼痛而入院,自诉疼痛呈间歇性,发作时疼痛剧烈,大汗淋漓,可突然自行缓解,缓解期无任何症状,体检。剑突下有轻度压痛,白细胞 11.5×10^9 。考虑为胆道蛔虫病,血常规检查可见 ()

- A. 嗜碱粒细胞比例升高
- B. 嗜酸粒细胞比例升高(正确答案)
- C. 中性粒细胞比例升高
- D. 淋巴细胞升高

46. 患者,女,38岁。大面积烧伤后 5 小时入院心率 120 次/分、血压 70/50mmHg,尿少发生上述状况最可能的原因 ()

- A. 大量红细胞丧失造成肺换气障碍
- B 大量水分蒸发造成脱水
- C 疼痛导致的生理反应
- D. 大量体液从血管内渗出引起低血容量性休克(正确答案)
- E. 创面细菌感染造成感染性休克

47. 患者,男,20岁。大面积烧伤合并有血红蛋白尿,应保持每小时尿量不能少于 ()

- A. 10ml

- B. 20ml
- C. 30ml
- D. 40m
- E. 50ml (正确答案)

48. 患者，男，65岁。突发心搏骤停，抢救的最佳时间应该在（）

- A. 1~2分钟内
- B. 2~3分钟内
- C. 3~4分钟内
- D. 4~6分钟内(正确答案)
- E. 6~8分钟内

49. 胰头癌的典型表现是（）

- A. 腹痛、腹胀
- B. 进行性黄痕(正确答案)
- C. 食欲缺乏
- D. 消化不良
- E. 乏力、消瘦

50. 患者，男，46岁体重60kg。II度烧伤面积50%，需大量补液。第一天补液总量应为（）

- A. 4500ml
- B. 5400ml
- C. 6000ml
- D. 6500ml(正确答案)
- E. 8000ml

51. 乳腺癌患者局部皮肤出现“酒窝征”的原因是（）

- A. 皮肤与肿瘤粘连
- B. 肿物压迫
- C. 并发炎症
- D. 癌肿侵及Cooper韧带(正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/726014030144010045>