

超声波医学与技术(主管技师)《肝脏和脾脏考试资料》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题: 下列不属于急性肝炎胆囊征象的有()。A. 胆囊壁增厚

- B. 胆囊壁呈三层结构
- C. 胆囊腔内见异常沉积性回声点
- D. 上述异常多发生于肝炎早期
- E. 胆囊各径线增大

2、单项选择题: 超声对多发性肝囊肿与 Caroli 病(先天性肝内胆管扩张)鉴别诊断的主要依据在于()。A. 囊肿形态的差异

- B. 囊肿与胆管是否相互连通
- C. 囊肿大小的不同
- D. 后方声增强效应的程度
- E. 两者病灶的数目

3、单项选择题: 患者, 男性, 27 岁, 体检发现肝内 1.7cm×1.6cm 大小单发高回声结节, 边界清晰, 后方回声轻度增强, 其内及周边无明显血流信号, 最可能的诊断是()。A. 肝硬化结节

- B. 局限性脂肪肝
- C. 肝转移癌
- D. 原发性肝癌
- E. 血管瘤

4、单项选择题: 患者, 32 岁, 车祸后 3 小时, 左侧肋骨骨折, 血压正常。

该患者首选的治疗方案是()。A. 剖腹探查术

- B. 脾修补
- C. 脾栓塞
- D. 在密切观察下采取非手术治疗
- E. 不能采取非手术治疗

5、单项选择题: 患者女性, 60 岁, 多饮、多尿、消瘦 9 年, 畏寒发热 4 天入院, 经检查确诊为糖尿病。行超声检查, 超声可见肝右叶增大, 肝右前叶可见 64mm×85mm 形态不规则混合回声区, 内部为多发不规则液性暗区, 囊液透声不好, 后方回声增强, 最可能的诊断是()。A. 肝脓肿

- B. 肝棘球蚴病
- C. 肝转移癌
- D. 肝囊腺瘤

E. 肝囊肿合并感染

6、单项选择题：男性，45岁，消瘦，腹泻，HbsAg(+)，AFP正常。肿块大小为32mm×31mm，周边见细窄晕，可见侧方声影，最可能的诊断是()。A. 结节型肝癌

B. 肝良性腺瘤

C. 肝硬化结节

D. 肝腺瘤样增生

E. 肝转移癌

7、单项选择题：患者，男，45岁。有牧区生活史，超声检查肝右叶胆囊旁可见一8cm×9cm的囊性包块，边界清楚，壁厚而回声高，内为无回声，囊液中有细小的点状回声呈飘雪征

可能的诊断是()。A. 肝脓肿

B. 肝囊肿

C. 肝胆管囊肿

D. 肝棘球蚴囊肿

E. 肝恶性肿瘤中心液化

8、单项选择题：肝脓肿()。A. 肝脏有圆形孤立性薄壁无回声区，后方回声增强

B. 肝脏布满大小不等的无回声区呈蜂窝状，囊与囊之间的肝实质回声增强

C. 肝脏有圆形孤立性无回声区，壁厚呈双层结构，后方回声增强

D. 肝脏满布大小不等的无回声区呈蜂窝状，囊壁不规则，囊肿与胆管相连

E. 肝脏有不规则形囊性占位，壁较厚，内透声不好，可见较高回声的点状或斑片状回声

9、单项选择题：关于肝脏炎性假瘤，不正确的说法是()。A. 弱回声结节

B. 病变可缩小或消失

C. 中心回声强，边缘回声低

D. 弱回声中有散在的强回声点

E. CDFI显示放射状分布的血流信号

10、单项选择题：下面哪一项不是肝血管瘤的病理分型()。A. 海绵状血管瘤

B. 硬化型血管瘤

C. 血管内皮细胞瘤

D. 毛细血管瘤

E. 血管内皮细胞肉瘤

11、单项选择题：儿童最常见的肝脏恶性肿瘤是()。A. 肝畸胎瘤

B. 肝母细胞瘤

C. 肝错构瘤

D. 肝脂肪瘤

E. 肝血管瘤

12、单项选择题：关于门静脉高压侧支循环形成，说法错误的是()。A. 脐静脉开放

B. 胃底食管静脉曲张

C. 脾-肾静脉支增宽增多

D. 肠系膜上静脉-痔静脉支增宽增多

E. 腹壁静脉曲张

13、单项选择题：符合门静脉血栓声像图表现的是()。A. 门静脉内等回声团，其与管壁间血流变细，局部门静脉管壁规整清晰

B. 门静脉内稍强回声团，门静脉管壁残缺或不清楚

- C. 门静脉主干为条索样强回声，周围可显示网络状管道，可见门静脉血流
- D. 肝实质内纺锤形或卵圆球状无回声，与门静脉相通，内可见门静脉血流

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/726123050131010133>