

2024 湖北省天门市《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题通关秘籍题库【精练】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 阿托品用于全麻前给药的目的是()

- A: 增强麻醉效果
- B: 预防心动过缓
- C: 减少麻醉药的用量
- D: 减少呼吸道腺体分泌

答案：D

2. 布美他尼属于下列哪类利尿药

- A: 中效利尿药
- B: 强效利尿药
- C: 保钾利尿药
- D: 碳酸酐酶抑制药

答案：B

3. 主要用于疟疾的预防，也可用于治疗弓形虫病的药物是

- A: 乙胺嘧啶
- B: 双氢青蒿素
- C: 蒿甲醚
- D: 奎宁

答案：A

4. 患者女，59 岁，既往高脂血症病史 5 年，心功能 II 级。因发现血压升高 7 天入院。入院查体血压 172/95mmHg，心率 62 次 / 分。该患者目前服用的药物除抗高血压药外有辛伐他汀。

- A: 氢氯噻嗪
- B: 双氯芬酸
- C: 美托洛尔
- D: 特拉唑嗪

答案：A

5. 治疗良性前列腺增生症宜选用

- A: 坦洛新
- B: 利血平
- C: 托特罗定
- D: 尼莫地平

答案：A

6. 关于应对顺铂所致肾毒性的措施，下列说法错误的是

- A: 肾功能不全者可以使用
- B: 定期监测电解质、肾功能
- C: 必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇
- D: 使用时应充分水化，并及时给予利尿剂

答案：A

7. 患者，女，36 岁，近期经常上腹灼烧痛、反酸，疼痛多出现在上午 10 点及下午 4 点，有时夜间痛醒。食后缓解，X 线钡餐诊断为十二指肠溃疡，该患者宜使用的治疗药物是（）

- A: 甲氧氯普胺
- B: 奥美拉唑

C: 多潘立酮

D: 颠茄

答案: B

8. 存在中度致吐风险的抗肿瘤药物是

A: 泼尼松

B: 顺铂

C: 奥沙利铂

D: 吉西他滨

答案: C

9. 去乙酰毛花苷在体内失去葡萄糖基和乙酸转化为

A: 毛花苷丙（西地兰 C）

B: 洋地黄毒苷

C: 去乙酰毛花苷（西地兰 D）

D: 地高辛

答案: D

10. 头孢菌素为时间依赖性抗菌药物，血浆半衰期较短，几乎无抗生素后效应，抗菌活性与细菌接触药物的时间长短密切相关，头孢菌素显示满意的杀菌效果需 $\%T > MIC$ 至少达到

A: 30%~40%

B: 60%~70%

C: 50%~60%

D: 40%~50%

答案: B

11. 下述属于非依赖型中枢性镇咳药的是

- A: 苯丙哌林
- B: 可待因
- C: 右美沙芬
- D: 氨溴索

答案：C

12. 麻黄碱滴鼻剂的适应证是

- A: 萎缩性鼻炎
- B: 过敏性鼻炎
- C: 药物性鼻炎
- D: 鼻黏膜充血

答案：D

13. 6~12 个月婴儿甲状腺功能减退症，左甲状腺素每日完全替代剂量为

- A: 25 μg
- B: 4 $\mu\text{g} / \text{kg}$
- C: 6 $\mu\text{g} / \text{kg}$
- D: 5 $\mu\text{g} / \text{kg}$

答案：C

14. 下述利尿药中，可导致血钾升高的是()

- A: 乙酰唑胺
- B: 呋塞米
- C: 氨苯蝶啶
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

15. 可能发生不可逆性骨髓功能抑制，应避免重复疗程使用的药物是()

- A: 四环素
- B: 青霉素
- C: 多西环素
- D: 氯霉素

答案：D

16. 下列药物中不用于抗心律失常的是

- A: 单硝酸异山梨酯
- B: 比索洛尔
- C: 胺碘酮
- D: 美西律

答案：A

17. 糖尿病酮症酸中毒患者选用()

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 胰岛素
- C: 二甲双胍
- D: 格列本脲

答案：B

18. 需尽快建立一个肠道正常菌群，宜用

- A: 地芬诺酯
- B: 双歧杆菌
- C: 酪酸菌
- D: 双歧三联活菌胶囊

答案：D

19. 具有耳毒性的是()

- A: 呋塞米
- B: 螺内酯
- C: 氢氯噻嗪
- D: 氨苯蝶啶

答案：A

20. 对女性能促进和维持黄体功能使黄体合成孕激素，对男性能使垂体功能不足者的睾丸产生雄激素，促使睾丸下降和男性第二性征的发育，从妊娠期妇女尿中提取的促性腺激素类药物是

- A: 戈那瑞林
- B: 绒促性素
- C: 双炔失碳酯
- D: 溴隐亭

答案：B

21. 洋地黄中毒时的信号为

- A: 胃肠道症状
- B: 眩晕
- C: 定向力丧失
- D: 色觉障碍

答案：A

22. 可使后者疗效显著下降的是

- A: 维生素 C
- B: 他莫昔芬
- C: 红霉素
- D: 氯丙嗪

答案：A

23. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的是

- A: 普萘洛尔
- B: 硝苯地平
- C: 氯沙坦
- D: 卡托普利

答案：C

24. （2016 年真题）那于 GLP-1 受体激动剂的是

- A: 艾塞那肽
- B: 那格列奈
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

答案：A

25. 可用于缓解绝经后更年期症状的药品是（）。

- A: 依普黄酮
- B: 地屈孕酮
- C: 他莫昔芬
- D: 戊酸雌二醇

答案：D

26. （2021 年真题）属于浓度依赖型抗菌药物，通常铜绿假单胞菌对其敏感的药物是（）

- A: 氨曲南
- B: 氨苄西林
- C: 阿米卡星

D: 头孢他啶

答案：C

27. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

A: 静脉注射时宜用葡萄糖注射液稀释

B: 静脉用药剂量为口服的 1 / 2 时即可达到同样疗效

C: 应用前应询问药物过敏史，对磺胺药过敏者不宜使用

D: 肠道外用药宜静脉给药，不主张肌肉注射

答案：A

28. 下列关于抗酸剂的描述，正确的是()

A: 碳酸氢钠是非吸收性抗酸剂

B: 抗酸剂可直接中和胃酸，升高胃内容物 pH

C: 氢氧化铝能直接中和胃酸，并被胃肠道吸收

D: 常用抗酸剂缓解非甾体抗炎药相关症状及预防溃疡发生

答案：B

29. 雷尼替丁用于治疗消化性溃疡的机制是

A: 抑制胃壁细胞 H⁺，K⁺-ATP 酶

B: 竞争性拮抗 H₁ 受体

C: 直接中和胃酸

D: 竞争性拮抗 H₂ 受体

答案：D

30. 利福平

- A: 禁用于胆道阻塞患者
- B: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年
- C: 禁用于 8 岁以下儿童
- D: 禁用于早产儿、新生儿

答案：A

31. 可引起巨幼红细胞性贫血的药物是()

- A: 伯氨喹
- B: 乙胺嘧啶
- C: 氯喹
- D: 甲氟喹

答案：B

32. 可用于烧伤及伤后感染的是()

- A: 磺胺甲噁唑
- B: 磺胺嘧啶
- C: 柳氮磺吡啶
- D: 磺胺米隆

答案：B

33. 关于胺碘酮描述，正确的是

- A: 只对室上性心动过速有效
- B: 只对室性心动过速有效
- C: 特异性针对房颤有效
- D: 对室上性和室性心动过速都有效

答案：D

34. 高血压伴消化性溃疡患者慎用的药物是

- A: 哌唑嗪
- B: 普萘洛尔
- C: 利血平
- D: 卡托普利

答案：C

35. 2 岁以下儿童腹泻，禁用的药品是

- A: 双歧三联活菌胶囊
- B: 双八面体蒙脱石散
- C: 地衣芽孢杆菌胶囊
- D: 盐酸洛哌丁胺胶囊

答案：D

36. 作用于 γ -氨基丁酸受体的药物是

- A: 卡马西平
- B: 佐匹克隆
- C: 苯妥英钠
- D: 苯巴比妥

答案：B

37. 下列哪种药物与碳酸钙合用时，易发生高钙血症

- A: 阿莫西林
- B: 噻嗪类利尿剂
- C: 氧化镁
- D: 四环素类

答案：B

38. 属于抑酸药的是()

- A: 莫沙必利
- B: 胶体果胶铋
- C: 奥美拉唑
- D: 胃蛋白酶

答案：C

39. (2021 年真题) 由于氧吡格置部分经 CYP2C19 转化为活性代谢物，合用控制此酶活性的药物会降低氯吡格雷的疗效，故不推荐与氯吡格雷合用的质子泵抑制剂是 ()

- A: 雷贝拉唑
- B: 泮托拉唑
- C: 奥美拉唑
- D: 兰索拉唑

答案：C

40. 对曲霉无效的药物是

- A: 两性霉素 B
- B: 伏立康唑
- C: 伊曲康唑
- D: 氟康唑

答案：D

41. 属于持续大剂量应用糖皮质激素引起的不良反应是

- A: Cushing 综合征体型
- B: 胰腺炎
- C: 骨质疏松症
- D: 青光眼

答案：A

42. 患者，男，25 岁。咽炎，注射青霉素后 1 分钟呼吸急促、面部发绀，心率 130 次/分，血压 60/40mmHg。

- A: 青霉素促进机体释放组胺、白三烯等致敏原
- B: 青霉素本身诱导机体发生变态反应
- C: 青霉素加速抗原抗体结合
- D: 青霉素的降解产物诱导机体发生变态反应

答案：D

43. 无雌激素、雄激素、肾上腺皮质激素样作用代谢物没有雌激素活性，可用于黄体功能不足的先兆流产治疗的药物是

- A: 地屈孕酮
- B: 屈螺酮
- C: 甲羟孕酮
- D: 环丙孕酮

答案：A

44. 有镇咳作用的是

- A: 喷托维林
- B: 沙丁胺醇
- C: 噻托溴铵
- D: 氨溴索

答案：A

45. 前列腺素类似物的降眼压机制是

- A: 减少房水生成
- B: 浓缩玻璃体
- C: 增加巩膜葡萄膜通路房水外流

D: 开放小梁网

答案: C

46. (2015 年真题) 属于延长动作电位时程药 (第Ⅲ类) 的抗心律失常药的是 ()。

A: 胺碘酮

B: 维拉帕米

C: 拉贝洛尔

D: 美西律

答案: A

47. 对耐氯喹的恶性疟虫株, 首选

A: 咯萘啶或甲氟喹

B: 乙胺嘧啶+磺胺药

C: 氯喹+伯氨喹

D: 静脉滴注奎宁

答案: A

48. 属于 DPP-4 抑制剂的药物是

A: 那格列奈

B: 利拉鲁肽

C: 伏格列波糖

D: 阿格列汀

答案: D

49. 链激酶应用过量可选用的拮抗药是

A: 氨基己酸

B: 维生素 K1

C: 鱼精蛋白

D: 葡萄糖酸钙

答案: A

50. 大剂量碘剂

A: 对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状

B: 抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成

C: 使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌

D: 使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧

答案: D

51. 属于胰岛素增敏剂的是

A: 艾塞那肽

B: 阿卡波糖

C: 瑞格列奈

D: 罗格列酮

答案: D

52. 抑制血管平滑肌和心肌细胞 Ca

A: 氢氯噻嗪

B: 硝苯地平

C: 肼屈嗪

D: 利血平

答案: B

53. 抑制细菌依赖性 DNA 的 RNA 聚合酶，阻碍 mRNA 合成的药物是

A: 利福平

B: 两性霉素

C: 氧氟沙星

D: 磺胺嘧啶

答案：A

54. 与吲达帕胺合用，可导致心律失常的是

A: 拟交感药

B: 胺碘酮

C: 考来烯胺

D: 多巴胺

答案：B

55. 属于抗雄激素类的抗肿瘤药是

A: 氟他胺

B: 炔雌醇

C: 阿那曲唑

D: 他莫昔芬

答案：A

56. 属于膨胀性泻药的是

A: 乳果糖

B: 酚酞

C: 聚乙二醇 4000

D: 甘油（开塞露）

答案：C

57. 可用于治疗非霍奇金淋巴瘤的单克隆抗体是

A: 西妥昔单抗

B: 利妥昔单抗

C: 贝伐单抗

D: 英夫利昔单抗

答案: B

58. 哮喘急性发作首选的药物是

A: 羧甲司坦口服液

B: 沙丁胺醇气雾剂

C: 布地奈德福莫特罗吸入剂

D: 孟鲁司特片

答案: B

59. 可引起听力减退或暂时耳聋的利尿药是

A: 螺内酯

B: 氢氯噻嗪

C: 乙酰唑胺

D: 呋塞米

答案: D

60. 止吐方案: 每日化疗前, 联合应用 5-HT₃ 受体阻断剂和口服地塞米松 12mg, 化疗后从第 2 日到第 3 日口服地塞米松或应用 5-HT

A: 低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

B: 中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

C: 微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

D: 重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

答案: B

61. 5 α -还原酶抑制剂的作用特点不包括

A: 降低血清前列腺特异抗原 (PSA) 水平

- B: 可以松弛前列腺平滑肌
- C: 无心血管不良反应
- D: 减小增大的前列腺体积

答案：B

62. 与奥美拉唑、甲硝唑三联治疗幽门螺杆菌感染的是

- A: 罗红霉素
- B: 克拉霉素
- C: 万古霉素
- D: 红霉素

答案：B

63. 糖皮质激素的禁忌证不包括()

- A: 严重的高血压、糖尿病
- B: 妊娠初期和产褥期
- C: 角膜炎、虹膜炎
- D: 创伤或手术恢复期

答案：C

64. 高血压伴有肾功能不全者最好选用

- A: 利血平
- B: 氢氯噻嗪
- C: 卡托普利
- D: 胍乙啶

答案：C

65. 硫脲类药物的基本作用是

- A: 抑制甲状腺素的生物合成

B: 抑制 Na^+-K^+ 泵

C: 抑制甲状腺蛋白水解酶

D: 抑制碘泵

答案：A

66. 首选用于伤寒、副伤寒的是()

A: 氯霉素

B: 青霉素

C: 两性霉素 B

D: 克林霉素

答案：A

67. (2017 年真题) 5 岁以下儿童首选的散瞳剂是()

A: 10% 去氧肾上腺素滴眼剂

B: 四环素可的松眼膏剂

C: 2% 后马托品眼膏剂

D: 1% 硫酸阿托品眼膏剂

答案：D

68. (2018 年真题) 镇痛药的合理用药原则, 不包括()

A: 按阶梯给药, 对于轻度疼痛者首选弱阿片类药物

B: 用药剂量个体化, 根据患者需要由小剂量开始逐渐加大剂量

C: “按时” 给药, 而不是“按需” 给药

D: 尽可能选口服给药

答案：A

69. (2020 年真题) 曲妥珠单抗的适应证是

A: 转移性结直肠癌

- B: 人表皮生长因子受体-2 (HER-2) 过度表达的乳腺癌
- C: 晚期恶性黑色素瘤
- D: 表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性的转移性非小细胞肺癌

答案: B

70. 红霉素的抗菌作用机制 ()

- A: 影响胞浆膜通透性
- B: 作用于细菌 70S 核糖体的 50S 亚基，抑制转肽酶
- C: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性
- D: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成

答案: C

71. 伴有高钙血症的妊娠期妇女使用，可致新生儿特殊面容，智力低下，该物质是

- A: 精氨酸
- B: 维生素 C
- C: 维生素 AD
- D: 维生素 B2

答案: C

72. 异烟肼联用对乙酰氨基酚使

- A: 肝毒性增加
- B: 疗效减弱
- C: 吸收减少
- D: 月经不规则

答案: A

73. 次水杨酸铋是

- A: 抗动力药
- B: 抗分泌药
- C: 吸附剂
- D: 微生态制剂

答案：B

74. 适用于磺酰脲类降糖药治疗不理想的 2 型糖尿病患者的药物是

- A: 葡萄糖酸钙
- B: 瑞格列奈
- C: 利拉鲁肽
- D: 骨化三醇

答案：B

75. 双香豆素与苯巴比妥合用可

- A: 竞争性对抗
- B: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱
- C: 与其竞争结合血浆蛋白
- D: 产生协同作用

答案：B

76. (2021 年真题) 有关甲氨蝶呤药物相互作用的说法，错误的是 ()

- A: 碳酸氢钠会减慢甲氨蝶呤的肾排泄
- B: 丙磺舒会减慢甲氨蝶呤的肾排泄
- C: 与顺铂等肾毒性药物合用，可能减慢甲氨蝶呤的肾排泄
- D: 阿司匹林会减慢甲氨蝶呤的肾排泄

答案：A

77. 按照抗菌药物 PK/PD 理论，下列给药方案中，错误的是 ()

- A: 注射用美罗培南 1g, ivV, q8h
- B: 注射用青霉素钠 480 万单位 iv, q8h
- C: 莫西沙星片 0.4g po, BiD
- D: 阿奇霉素片 0.5g, po: qD

答案：C

78. (2015 年真题) 可用于重度痤疮 (尤其是结节囊肿型痤疮) 的药品是 ()。

- A: 过氧苯甲酰
- B: 克林霉素
- C: 异维 A 酸
- D: 阿达帕林

答案：C

79. (2015 年真题) 下列药品中, 属于酰胺类的脑功能改善及抗记忆障碍主要是 ()。

- A: 多奈哌齐
- B: 利斯的明
- C: 胞磷胆碱
- D: 吡拉西坦

答案：D

80. 可以降低血尿酸水平, 但升高尿尿酸水平而导致肾结石的抗痛风药是

- A: 丙磺舒
- B: 别嘌醇
- C: 呋塞米
- D: 秋水仙碱

答案：A

81. 属于神经激肽-1 受体阻断剂的止吐药是()。

- A: 阿瑞吡坦
- B: 维生素 B
- C: 甲氧氯普胺
- D: 托烷司琼

答案：A

82. 雌激素替代疗法应在绝经后几年之内开始

- A: 2
- B: 6
- C: 8
- D: 4

答案：B

83. 兼具抑菌作用、抑制痛觉神经和刺激腺体分泌的鼻用制剂是

- A: 鲑鱼降钙素鼻喷剂
- B: 复方薄荷脑滴鼻液
- C: 氟替卡松鼻喷剂
- D: 异丙托溴铵吸入剂润德教育

答案：B

84. 下述保肝药在静脉滴注时必须用不含电解质的溶液稀释的是

- A: 复方甘草酸苷
- B: 还原型谷胱甘肽
- C: 门冬氨酸钾镁
- D: 多烯磷脂酰胆碱

答案：D

85. 下列情况不应首选红霉素的是()

- A: 肠道痢疾杆菌感染
- B: 支原体肺炎
- C: 白喉带菌者
- D: 军团菌肺炎

答案：A

86. 在体内主要经 CYP3A4 代谢的质子泵抑制剂是

- A: 兰索拉唑
- B: 米索前列醇
- C: 枸橼酸铋钾
- D: 铝碳酸镁

答案：A

87. 下列雌激素中，可用作复方口服避孕药的成分之一的是()

- A: 炔诺酮
- B: 雌二醇
- C: 炔雌醇
- D: 尼尔雌醇

答案：C

88. 金刚烷胺与多潘立酮合用

- A: 可增加抗胆碱不良反应的危险
- B: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)
- C: 增加肾毒性

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 增加锥体外系不良反应的风险

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/726141124054011030>