

【A1 型题】

1. 护理诊断的组成是

- A. 名称、定义、症状体征
- B. 问题、相关因素、症状体征
- C. 问题、定义、相关因素
- D. 名称、定义、诊断依据及相关因素
- E. 名称、问题、相关因素及症状体征

参考答案：D

2. 在护理诊断陈述的 PES 公式中，字母 E 代表

- A. 诊断名称
- B. 临床表现
- C. 实验室检查
- D. 诊断依据
- E. 相关因素

参考答案：E

3. 有关护理诊断和医疗诊断，下述哪项是错误的

- A. 护理诊断随病情变化而变化
- B. 护理诊断的决策者是护理人员也可以是医生
- C. 医疗诊断描述的是一种疾病
- D. 医疗诊断在疾病的发展过程中是相对稳定的
- E. 护理诊断描述的是个体对健康问题的反应

参考答案：B

4. 下列有关护理诊断的陈述，错误的是

- A. 一个诊断可针对多个护理问题
- B. 护理诊断应以充分的主、客观资料为依据
- C. 护理诊断应是护理范围内可以解决的问题
- D. 护理诊断决策者是护理人员
- E. 问题的描述不应使用医疗诊断用语

参考答案：A

5. 下列有关护理目标的叙述，哪项不正确

- A. 一个目标只针对一个护理诊断
- B. 制订的目标应切实可行
- C. 目标的主语可以是病人，也可以是护士
- D. 目标应具体、可测量
- E. 目标是护理的结果而不是护理的过程

参考答案：C

6. 叙述护理程序的评价内容，应除外下列哪项

- A. 护理诊断是否正确
- B. 有无新的健康问题
- C. 护理目标是否实现
- D. 护理目标未实现的原因
- E. 修正不适当的诊断、目标或措施

参考答案：B

7. 以下对护理目标的描述，正确的是

- A. 住院期间病人不发生便秘
- B. 3 天内护士应解除病人便秘
- C. 住院期间病人大便正常
- D. 3 天内病人的习惯性便秘得到纠正
- E. 住院期间应使病人保持大便通畅

参考答案：A

8. 护理诊断的排列顺序，正确的标准是

- A. 按病情的轻重缓急确定先后顺序
- B. 按病人症状出现的先后排列
- C. 以病人的主述为标准
- D. 以护士的工作程序顺序为标准
- E. 无具体规定

参考答案：A

9. 以下哪项不是护理诊断的名称

- A. 体液过多
- B. 营养失调
- C. 活动耐力下降
- D. 急性胰腺炎
- E. 体温过高

参考答案：D

9. 以下哪项不是护理诊断的名称

- A. 体液过多
- B. 营养失调
- C. 活动耐力下降
- D. 急性胰腺炎
- E. 体温过高

参考答案：D

10. 以下哪项与护理程序的叙述无关

- A. 以促进和恢复病人的健康为目标
- B. 是一系列有计划、有目的的护理活动
- C. 是一个综合的、动态的、具有决策和反馈功能的过程
- D. 是对疾病进行诊断的过程
- E. 要求对护理对象进行主动和全面的护理

参考答案：D

11. 护理程序中收集资料的活动应何时进行

- A. 病人入院时
- B. 病人出院时
- C. 自入院开始至出院结束
- D. 遵医嘱进行
- E. 病人病情有变化时

参考答案：C

12. 有关资料收集的叙述，以下哪项是不准确的

- A. 资料有主观资料和客观资料
- B. 客观资料是通过观察、体检等获得的资料

- C. 主观资料只能由病人本人提供
- D. 要客观记录病人的主述
- E. 资料的记录不应带有主观结论

参考答案：C

13. 护士收集资料的方法应除外

- A. 交谈
- B. 体格检查
- C. 书写护理记录单
- D. 观察
- E. 阅读有关资料

参考答案：C

14. 下列问题中应列为优先问题的是

- A. 不能维持自主呼吸
- B. 自我形象紊乱
- C. 腹泻
- D. 社交孤立
- E. 知识缺乏

参考答案：A

15. 下列属于病人一般资料的是

- A. 心率、血压、脉搏、呼吸
- B. 患病史、婚育史、药物过敏史
- C. 姓名、性别、年龄、民族、职业
- D. 性格特征、情绪状态、康复信心
- E. 家庭关系、经济状况、工作环境

参考答案：C

16. 下列属于相关因素的是

- A. 潜在的精神健康增强
- B. 与血红蛋白降低有关
- C. 有受伤的危险
- D. 腹胀、腹痛
- E. 焦虑

参考答案：B

17. 属于合作性问题是

- A. 潜在并发症：心律不齐
- B. 低效性呼吸型态：发绀、呼吸急促：与胸部疼痛有关
- C. 有受伤的危险：与视物不清有关
- D. 母乳喂养有效
- E. 体温升高

参考答案：A

【A2型题】

1. 男性，71岁。昏迷，评估确认病人存在以下护理问题，你认为优先应解决的问题是

- A. 便秘
- B. 语言沟通障碍

- C. 清理呼吸道无效
- D. 皮肤完整性受损
- E. 营养失调：低于机体需要量

参考答案：C

2. 女性，14岁。因急性心肌炎入院，护士进行评估收集资料，其中属于主观资料的是

- A. 心动过速、发热
- B. 感觉心慌、发热、疲乏
- C. 心悸、疲乏、周身不适
- D. 气促、心动过速、发热
- E. 气促、感觉心慌、心率快

参考答案：C

3. 男性，40岁。自感全身不适前来就诊，急诊护士发现他面色苍白，出冷汗，呼吸急促，主诉腹痛剧烈。医生处理后，患者被留住观察室，护士评估病人时，下述哪项是客观资料

- A. 面色苍白
- B. 感到恶心
- C. 腹痛难忍
- D. 睡眠不佳
- E. 心慌不适

参考答案：A

4. 对常规新住院病人，在值班医生未到达前护士首先应

- A. 测生命体征，建立静脉通路
- B. 向病人及家属了解病情，耐心解释
- C. 记录病人来院时间，病情变化
- D. 抽血标本
- E. 收集资料，评估病人

参考答案：E

#### 【A3 / A4 型题】

(1~2 题共用题干)

男性，45岁。因车祸受伤送医院就诊。诊断：左下肢胫腓骨斜型骨折，收住院。查体：左下肢疼痛、肿胀，功能障碍。

1. 以下哪一项不是针对该病人病情所做的护理诊断

- A. 疼痛
- B. 焦虑
- C. 活动无耐力
- D. 有皮肤完整性受损的危险
- E. 躯体移动障碍

参考答案：C

2. 以下哪项不是根据该病人相关护理诊断制定的护理措施

- A. 解释有关骨折的相关知识
- B. 保持床单位的干燥、平整
- C. 保持环境安静，限制探视，保证其充分的睡眠
- D. 给予必要的生活护理

E. 提供减轻疼痛的非药物方法。如分散注意力、保持舒适体位等

参考答案：C

(3~5 题共用题干)

男性，56 岁。心绞痛病史 5 年，由于近日过度劳累，夜间突感心前区憋闷，胸骨后压榨性疼痛，口含硝酸甘油和速效救心丸疼痛不缓解，伴恶心、呕吐，大汗淋漓，遂被急送医院就诊。急诊医生以急性心肌梗死收住院。

3. 以下哪项不属于客观资料

- A. 痛苦面容
- B. 被迫体位
- C. 一月前亲属在飞机失事中丧生，精神一直处于痛苦压抑之中
- D. 血压 150 / 90mmHg
- E. 心电图 II、III、avF 导联有 Q 波，ST 段弓背向上抬高，T 波倒置

参考答案：C

4. 以下哪项不是正确的护理诊断

- A. 心绞痛
- B. 自理缺陷
- C. 活动无耐力
- D. 恐惧
- E. 心输出量减少

参考答案：A

5. 以下哪项是针对“活动无耐力”这一护理诊断制定的护理目标

- A. 病人卧床期间生活需要得到满足
- B. 病人恢复到原来的日常生活自理能力
- C. 病人能运用有效方法缓解疼痛
- D. 病人活动时不出现心律失常和缺氧表现
- E. 病人的生命体征在正常范围

参考答案：D

### 【A1 型题】

1. 关于病历的保管，叙述错误的是

- A. 应按规定位置放置
- B. 病人出院后由病案室保管
- C. 特殊情况，出院后可由病人本人保管
- D. 家属不得随意翻阅
- E. 病区医护人员有责任防止其损坏和丢失

参考答案：C

2. 有关医嘱的种类，表述错误的是

- A. 只执行一次的医嘱为临时医嘱
- B. 需医生注明停止时间的医嘱为长期医嘱
- C. 术前准备的医嘱为临时医嘱
- D. 静脉输液的医嘱是长期医嘱
- E. 必要时应用的医嘱为备用医嘱

参考答案：D

3. 体温单填写“手术后日期”至术后第几天

- A. 5天
- B. 7天
- C. 10天
- D. 14天
- E. 20天

参考答案：D

4. 以下哪项不是长期医嘱

- A. 止咳糖浆 10ml po qid
- B. 庆大霉素 8万U im bid
- C. 安定 10mg po qn
- D. 测血压 q6h
- E. 度冷丁 50mg im sos

参考答案：E

5. 特别护理记录的内容不包括

- A. 生命体征
- B. 病情变化
- C. 医生医嘱
- D. 出入液量
- E. 神态状况

参考答案：C

6. 病室报告的填写顺序为

- A. 重点病人——新进入病人——当日离去病人
- B. 当日离去病人——重点病人——新进入病人
- C. 新进入病人——当日离去病人——重点病人
- D. 当日离去病人——新进入病人——重点病人
- E. 重点病人——当日离去病人——新进入病人

参考答案：D

7. 口头医嘱正确的执行方法是

- A. 医生签名后执行
- B. 护士长签名后执行
- C. 两名护士核对后执行
- D. 抄写至治疗单后执行
- E. 护士向医生复述。双方确认无误后执行

参考答案：E

8. 有关特护记录单液体出入量的记录方法错误的是

- A. 日间用蓝钢笔填写，夜间用红钢笔填写
- B. 输液输血应按实际入量准确记录
- C. 对痰、尿、引流液、呕吐物等均应按量记录
- D. 24小时总入量的总结用蓝钢笔填写
- E. 24小时出入总量应填入体温单上

参考答案：D

9. 病室报告的书写要求不包括

- A. 内容简单扼要，用医学术语

- B. 所有眉栏项目均用蓝钢笔填写
- C. 字迹清楚，不得随意涂改
- D. 每个病人的第一行填写生命体征内容
- E. 书写者签全名

参考答案：B

10. 要求日间用蓝笔、夜间用红笔书写的医疗文件是

- A. 病室交班报告
- B. 长期医嘱单
- C. 临时医嘱单
- D. 护理病历
- E. 体温单

参考答案：A

11. 处理医嘱时，错误的做法是

- A. 长期医嘱执行完应打红钩标识
- B. 临时医嘱执行完应打黑钩标识
- C. 医嘱转抄后应打蓝钩标识
- D. 未执行的医嘱可用红笔在该医嘱栏内注明“未用”
- E. 执行护士应签全名

参考答案：D

12. 以下哪项不属于重整医嘱的适用范围

- A. 手术后医嘱
- B. 分娩后医嘱
- C. 转出的医嘱
- D. 过多的长期医嘱
- E. 转入的医嘱

参考答案：C

13. 临时备用医嘱的有效期为

- A. 4小时
- B. 6小时
- C. 8小时
- D. 10小时
- E. 12小时

参考答案：E

14. 应转抄在长期医嘱栏内的医嘱是

- A. 庆大霉素 8 万 U im bid
- B. 度冷丁 50mg im st
- C. 青霉素皮试
- D. 尿常规
- E. 术前尿管留置

参考答案：A

15. 执行完应在医嘱前打铅笔钩的医嘱为

- A. 记液体出入量
- B. 半流食
- C. 保留尿管，定时开放

- D. 术前备皮
- E. 一级护理

参考答案：D

16. 次日准备手术病人的交班内容

- A. 报告手术前准备、夜间睡眠情况、病人心理状况
- B. 报告手术名称、麻醉方式、病人全身情况
- C. 报告生命征、意识、尿量、药物使用情况
- D. 报告疼痛部位、性质、体征等
- E. 报告出血部位、性质、出血量等

参考答案：A

17. 转抄于长期医嘱单，单的医嘱是

- A. 临时医嘱
- B. 临时备用医嘱
- C. 停止医嘱
- D. 手术医嘱
- E. 长期备用医嘱

参考答案：E

执行后记录于临时医嘱

【A：型题】

1. 女性，33岁。子宫全切术后第二天，主诉伤口疼痛无法入睡，医嘱：安定 10mg im st，此项医嘱属于

- A. 应立即执行的临时医嘱。
- B. 按时执行的长期医嘱
- C. 需要时可用的临时备用医嘱
- D. 需要时可用的长期备用医嘱
- E. 按时执行的临时医嘱

参考答案：A

2. 男性，21岁。因股骨骨折入院，手术后医嘱：度冷丁 50mg im q8h pm。对此项医嘱错误的解释是

- A. 将医嘱转抄在长期医嘱栏内
- B. 每隔8小时可重复使用
- C. 每次使用后应在临时医嘱栏内记录
- D. 有停止医嘱后此医嘱方终止执行
- E. 过时未执行应用红笔在该项医嘱栏内写“未用”两字

参考答案：E

【A1型题】

1. 左心衰竭的典型临床表现是

- A. 水肿
- B. 呼吸困难
- C. 发绀
- D. 乏力
- E. 咳铁锈色痰

参考答案：B

2. 护士在发给心力衰竭病人地高辛之前，应先数心率，若心率少于多少次则不能给药



- A. 100 次 / 分
- B. 90 次 / 分
- C. 80 次 / 分
- D. 70 次 / 分
- E. 60 次 / 分

参考答案: E

3. 使用洋地黄类药物的绝对禁忌证是

- A. 急性心肌梗死 24 小时内
- B. 严重房室传导阻滞
- C. 肥厚型梗阻型心肌病
- D. 洋地黄中毒或过量
- E. 心房颤动或扑动

参考答案: D

4. 洋地黄类药物较严重的毒性反应是

- A. 胃肠道反应: 食欲不振
- B. 神经系统反应: 黄视、绿视
- C. 呼吸系统反应: 呼气中有烂苹果味
- D. 心血管系统反应: 各种心律失常
- E. 泌尿系统反应: 血尿、蛋白尿

参考答案: D

5. 右心衰竭的呼吸困难是由于

- A. 气道反应性增强
- B. 支气管狭窄及阻塞
- C. 肺循环淤血
- D. 体循环淤血
- E. 呼吸中枢兴奋性降低

参考答案: D

6. 长期卧床的心力衰竭病人, 下肢静脉血栓脱落易发生的栓塞部位

- A. 脑
- B. 肾
- C. 脾
- D. 肺
- E. 四肢

参考答案: D

7. 体力活动轻度受限, 日常活动引起乏力、心悸、气急属于

- A. 心功能 I 级
- B. 心功能 II 级
- C. 心功能 III 级
- D. 心功能 IV 级
- E. 重度心力衰竭

参考答案: B

8. 心力衰竭的早期表现是

- A. 咳大量泡沫痰
- B. 踝部水肿

- C. 窦性心动过速
- D. 端坐呼吸
- E. 两肺部湿啰音

参考答案：C

9. 心力衰竭晚期呼吸困难的表现是

- A. 劳力性呼吸困难
- B. 阵发性夜间呼吸困难
- C. 端坐呼吸
- D. 吸气性呼吸困难
- E. 呼吸频率和节律的改变

参考答案：C

10. 慢性右心衰竭首要的护理问题是

- A. 有感染的危险：与肺瘀血有关
- B. 皮肤完整性受损：与水肿有关
- C. 活动无耐力：与氧供求失衡有关
- D. 体液过多：与水钠潴留和静脉淤血有关
- E. 潜在电解质紊乱：与用利尿剂和低盐饮食有关

参考答案：D

11. 左心衰竭最严重的形式是

- A. 端坐呼吸
- B. 咯血
- C. 劳力性呼吸困难
- D. 夜间阵发性呼吸困难
- E. 急性肺水肿

参考答案：E

12. 严重左心衰竭时，病人出现少尿的主要原因是

- A. 肾小球滤过率下降、
- B. 血液进行再分配，肾血流量明显减少
- C. 体循环淤血
- D. 病人饮水量减少
- E. 肾小管重吸收增多

参考答案：B

13. 慢性心力衰竭的病因不包括

- A. 长期心脏压力负荷过重
- B. 长期心脏容量负荷过重
- C. 心室舒张充盈受限
- D. 原发性心肌损害
- E. 循环血量不足

参考答案：E

14. 慢性心力衰竭病人的病情观察，不包括

- A. 关节活动范围和肢体活动能力
- B. 皮肤黏膜发绀情况
- C. 颈静脉怒张和肺部啰音
- D. 每日测量体重

E. 身体下垂部位有无水肿

参考答案: A

15. 护士给予慢性心力衰竭患者的饮食指导不妥的是

A. 应少量多餐

B. 饮食应清淡、易消化

C. 每日摄盐量应少于 5g

D. 增加味精和酱油等调味品的食用, 以促进食欲

E. 限制腌制食品和碳酸饮料

参考答案: D

16. 下列哪项不是右心衰竭的体征

A. 肝大

B. 胸腔积液

C. 肺部湿啰音

D. 颈静脉怒张

E. 肝颈静脉回流征阳性

参考答案: C

17. 右心衰竭可能的症状不包括

A. 肝大

B. 少尿

C. 恶心

D. 食欲下降

E. 夜间阵发性呼吸困难

参考答案: E

18. 左心衰竭可能的症状不包括

A. 夜间阵发性呼吸困难

B. 心悸

C. 劳累性呼吸困难

D. 严重者可发生端坐呼吸

E. 心前区疼痛

参考答案: E

~53. —

19. 在心力衰竭治疗中可以同时减轻心脏前负荷和后负荷的药物是

A. 硝酸异山梨酯

B. 氢氯噻嗪

C. 毛花苷 C

D. 硝普钠

E. 多巴胺

参考答案: D

【A2 型题】

1. 男性, 45 岁。高血压病史 10 年, 一直间断服降压药维持, 血压时高时低, 多在 160 / 100mmHg 左右, 4 小时前心前区持续疼痛、出冷汗来院急诊, 经心电图检查确诊为急性心肌梗死, 进行观察, 半小时后病人出现呼吸困难, 两肺布满湿 1 罗音, 心率 110 次 / 分, 律齐。主管护士首先考虑病人病情变化是

A. 急性左心衰竭

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/726205235141010050>