

# 危重症护理专科护士准入理论考试

## 一、选择题

1.从静脉注射部位起沿静脉走向出现条索状红线、肿痛等症状时,应采取的措施是( ) [单选题]\*

A、抬高患肢并用硫酸镁热湿敷✓

B、患肢下垂并用硫酸镁热湿敷

C、活动肢体并用硫酸镁热湿敷

D、抬高患肢并用生理盐水热湿敷

E、患肢下垂并用 70%乙醇热湿敷

2.诊断呼吸衰竭最主要的化验指标是( ) [单选题]\*

A、标准重碳酸盐增高

B、二氧化碳结合力下降

C、血液 pH 值降低

D、动脉 PaO<sub>2</sub> 小于 60mmHg,伴或不伴有 PaCO<sub>2</sub> 大于 50mmHg✓

E、血钾增高,血氯增高

3.肝硬化病人发生食道静脉曲张后,护士应掌握该病人最重要的情况是( ) [单选题]\*

A、观察是否有出血体征✓

B、观察腹水增长

C、观察吞咽困难

D、保持病人绝对卧床休息

E、保持水电解质的平衡

4.胸腔引流管如自胸壁伤口脱出应如何处理 ( ) [单选题]\*

- A、捏紧导管
- B、更换引流导管
- C、捏紧胸壁穿刺处皮肤✓
- D、将引流管立即重新插入
- E、立即缝合胸壁穿刺处

5.尿毒症的饮食中应注意 ( ) [单选题]\*

- A、一律忌盐
- B、一律限水
- C、尿多时适当补钾✓
- D、不必限制补充钾、钠、氯
- E、限制蛋白质

6.颅脑损伤的中间清醒期的临床意义为 ( ) [单选题]\*

- A、判断有无颅内感染
- B、判断有无颅内肿瘤
- C、判断有无脑室内出血
- D、判断有无脑室内感染
- E、判断有无硬膜外血肿✓

7.男性,30岁,因与同事闹纠纷,产生轻生念头,服大量毒药,药名不详,进行洗胃时首先应 ( ) [单选题]\*

- A、立即灌入洗胃液进行洗胃
- B、问病人服的是什么毒药
- C、抽取胃内容物立即送检✓

D、灌入牛奶

E、灌入蛋清水

8.心衰的最主要诱因 ( ) [单选题]\*

A、感染✓

B、心律失常

C、输液过多、过快

D、情绪激动

E、血容量增加

9.无合并症的急性心肌梗死患者早期应绝对卧床休息 ( ) [单选题]\*

A、48-72h✓

B、>72h

C、1周

D、2周

E、3周

10.少尿是指尿量少于 ( ) [单选题]\*

A、50ml

B、100ml

C、200ml

D、400ml✓

E、500ml

11.纠正低渗性脱水,首选的液体是 ( ) [单选题]\*

A、5%的葡萄糖

B、10%的葡萄糖

C、生理盐水✓

D、10%氯化钾

E、10%氯化钙

12.上消化道出血病人出现呕血说明其胃内积血至少超过（ ）[单选题]\*

A、70ml

B、200ml

C、250ml✓

D、400ml

E、500ml

13.上消化道出血最常见的病因是（ ）[单选题]\*

A、门静脉肝硬化食管静脉曲张

B、消化性溃疡✓

C、胆道疾患

D、急性糜烂出血性胃炎

E、全身性疾病

14.昏迷病人用热水袋时要求水温不超过 50°C的原因（ ）[单选题]\*

A、机体对热敏感度增加

B、局部感觉迟钝✓

C、皮肤抵抗力下降

D、血管对热反应过敏

E、可加深患者昏迷程度

15.护理癫痫持续状态患者最重要的措施是 ( ) [单选题]\*

- A、迅速控制抽搐发作✓
- B、吸氧
- C、防止外伤
- D、防止呼吸道感染
- E、保持呼吸道通畅

16.严重腹泻患者 ,血气测定结果如下 :ph7.31 ,paco235mmHg,Hco3-17mmol/L ,Na+140mmol/L ,  
cl-112mmol/L , 最可能的酸碱平衡紊乱类型是 ( ) [单选题]\*

- A、AG 正常型代谢性酸中毒✓
- B、AG 增高型代谢酸中毒
- C、代谢性碱中毒
- D、呼吸性酸中毒
- E、代谢性酸中毒

17.感染性休克抗生素使用时机为 ( ) [单选题]\*

- A、找到明确感染病灶后
- B、找到明确感染病灶并明确为何种病原菌后
- C、感染性休克控制后
- D、一旦感染性休克确诊 , 尽早使用✓
- E、采集血培养之前

18.妊娠合并心脏病患者 , 妊娠()周是患者最危险的时期 , 极易发生心衰 ( ) [单选题]\*

- A、28-30
- B、32-34✓

C、26-27

D、<26

E、>20

19.患者因为结肠癌术后转入ICU，1小时后，患者神志转清，现在床上辗转反侧、扭动，应立即( ) [单选题]\*

A、疼痛评估✓

B、镇静评估

C、立即束缚

D、谵妄评估

E、约束评估

20.下列心电图改变哪项易出现晕厥现象( ) [单选题]\*

A、一度房室传导阻滞

B、二度房室传导阻滞

C、三度房室传导阻滞✓

D、窦性心率不齐

E、室性期前收缩

21.推荐意见指出输注丙泊酚注射液时输液器和药液应( )更换一次( ) [单选题]\*

A、24小时

B、6小时

C、8小时

D、12小时✓

E、4小时

22.某些特殊疾病患者禁用氟哌啶醇治疗谵妄，下列那种不是（ ）[单选题]\*

心功能不全

骨髓抑制

重症肌无力

青光眼

癫痫✓

23.下列哪种药物对血压的抑制作用最强（ ）[单选题]\*

丙泊酚✓

咪达唑仑

右美托咪定

氯胺酮

芬太尼

24.用平车运送病人上时，以下说法正确的是（ ）[单选题]\*

上下坡时，病人头部在高侧✓

病人头侧卧于小轮端

夹闭病人的输液器

护士立于病人两侧，方便观察病情

推行中，平车大轮端在前

25.进行肢体肌力分级时，当患者肢体能在床面上移动，但不能抗地心引力，不能抬起，为肌力（ ）级

（ ）[单选题]\*

1 级

2 级✓

3 级

4 级

5 级

26.使用 ICU 谵妄筛查表 (ICDSC) 评估谵妄。总分多少提示有谵妄? ( ) [单选题]\*

≥4 分✓

≥5 分

≥7 分

≥10 分

≥8 分

27.下列关于目标体温管理 (TTM), 哪项不正确 ( ) [单选题]\*

治疗性低温是将患者的核心温度降低到 32°C-36°C✓

颅脑损伤的患者应在 6h 之内启动

目前推荐 TH 持续时间为 12-24h

心脏骤停患者复温以 0.2-0.5°C/h 为宜

TH 治疗中, 需监测混合静脉氧饱和度、乳酸水平

28.休克病人动态监测中心静脉压值为 25cmH<sub>2</sub>O 表示 ( ) [单选题]\*

肺梗塞

静脉血管床过度收缩

肺循环阻力增高

血容量不足

充血性心力衰竭✓

29.急性颅内压增高的主要临床表现是 ( ) [单选题]\*

肢体偏瘫

头痛呕吐✓

意识障碍

少尿或无尿

视网膜出血

30.脑脊液漏禁忌耳鼻冲洗、堵塞或腰穿是防止( ) [单选题]\*

脑疝

头痛

颅内压下降

颅内继发感染✓

昏迷

31.患者开颅术后全麻未醒、刺痛可睁眼、语言反应只能发声,运动反应刺痛能够定位,GCS评分是( )

[单选题]\*

12分

10分

9分✓

8分

5分

32.发现患者出现脑疝的先兆表现时,处理措施最主要的是( ) [单选题]\*

即报告医

快速输注脱 $\square$ 利尿剂

即输氧

保持患者呼吸道通畅✓

□ 即□ 术

33.最常见的输卵管妊娠是 ( ) [单选题]\*

间质部妊娠

峡部妊娠

壶腹部妊娠✓

伞部妊娠

34.重症患者早期康复运动的暂停指征错误的是 ( ) [单选题]\*

心率 < 40 次/分或 > 130 次/分

收缩压 < 90mmHg 或 > 180mmHg✓

平均动脉压 < 65mmHg 或 > 110mmHg

呼吸频率 < 5 次/分或 > 40 次/分

脉搏血氧饱和度 < 88%

35.关于肠内营养护理，说法错误的是 ( ) [单选题]\*

营养液室温保存不可大于 8h，10°C冰箱保存不可大于 24h✓

喂养过程中每 4-6h 温开水至少 20ml 冲洗管路

药物必须充分研磨成粉末状充分溶解后方可注入

使用肠内营养时床头抬高 30-45 度防止误吸

每天监测肠内营养耐受性，是否出现恶心、呕吐、腹泻及反流等

36.病例：患者，男，65 岁，GCS 评分 E1VTM2，气管插管呼吸机辅助通气，头部脑室引流管、头皮下引流管各一根在位，引出血性液体。左桡动脉置管在位，予有创压力监测。留置尿管一根，尿色黄。外周静脉置管在位，液体畅滴。术后第 1 天，患者对呼唤刺激无反应，疼痛刺激肢体过伸，无睁眼。予留置

胃管一根，胃肠减压引出咖啡色液体。血压 100/52mmHg，予右锁骨下静脉置入，升压药物泵入。请问患者意外脱管评分是多少（ ）[单选题]\*

15分

17分✓

12分

14分

16分

37.严重感染液体复苏目标为（ ）[单选题]\*

中心静脉压(CVP)8-12mmHg

平均动脉压 $\geq$ 65mmHg

尿量 $\geq$ 0.5ml/kg.h

中心静脉或混合静脉血氧饱和度(ScvO<sub>2</sub> 或 SvO<sub>2</sub>) $\geq$ 0.70

以上都正确✓

38.中央导管穿刺集束化护理措施不正确的是（ ）[单选题]\*

严格执行手卫生

置管时使用最大无菌屏障

评估选择最佳穿刺部位

所有人均可使用 2%葡萄糖酸氯己定乙醇溶液进行皮肤消毒✓

选择符合标准的皮肤消毒剂

39.ARDS 的临床表现为（ ）[单选题]\*

急性呼吸窘迫✓

严重的低氧血症

低血压

无明显呼吸困难

意识障碍，高热

40.关于导尿管相关性尿路感染预防措施叙述错误的是（ ）[单选题]\*

严格无菌操作

集尿袋置于床面✓

抗反流尿袋 1 周更换一次

二次固定规范

手卫生规范

41.下列哪项不是 CRRT 动脉压报警原因（ ）[单选题]\*

患者透析用中心静脉导管血流量不足

患者透析用中心静脉导管贴壁、血栓形成等

体外循环血液管路扭曲或受压

体外循环血液管路凝血及传感器监测异常等

穿刺针脱出✓

42.气道湿化的评价标准中湿化不足,错误的是（ ）[单选题]\*

痰液黏稠，不易咳出或者吸出

听诊气道内有干鸣音

人工气道内可形成痰痂

可出现呼气性呼吸困难，缺氧性发绀，经皮血氧饱和度下降✓

43.治疗和抢救休克的关键环节是（ ）[单选题]\*

应用纠酸药物

应用皮质激素

应用血管活性药物

防治弥散性血管内凝血

消除病因,补充血容量✓

44.胸外心脏按压时手掌的正确部位是 ( ) [单选题]\*

左锁中线第四肋间

剑突与胸骨交界处

胸骨中下 1/3 交界处✓

胸骨左缘第四肋间

心脏前方的胸壁

45.诊断急性胰腺炎的主要指标 ( ) [单选题]\*

血、尿淀粉酶测定✓

血常规

尿常规

肌钙蛋白测定

46.血浆置换输注大量新鲜血浆时需补充哪种电解质成分 ( ) [单选题]\*

K+

Ca<sup>2+</sup>✓

Na+

Mg<sup>2+</sup>

Cl<sup>-</sup>

47.主动脉夹层动脉瘤未破裂引起的的休克是 ( ) [单选题]\*

心源性休克

梗阻性休克✓

低血容量性休克

感染性休克

分布性休克

48.氧合指数 $\leq$ 多少是急性呼吸窘迫综合征 ( ARDS ) 的诊断标准之一 ( ) [单选题]\*

350

400

300✓

450

500

49.可作为肺血栓栓塞唯一或首发症状的是 ( ) [单选题]\*

呼吸困难及气促

胸痛

烦躁不安、惊恐甚至濒死感

晕厥✓

咯血

50.目前诊断主动脉夹层的“金标准”是 ( ) [单选题]\*

X 线

主动脉造影

超声心动图

多排螺旋 CT 血管成像

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/727052125063006036>