

2023-24 年甘肃省碌曲县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题王牌题库（综合题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于嘌呤类抗代谢类药物的是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 巯嘌呤
- C: 吉西他滨
- D: 长春瑞滨

答案：B

2. 患者，女，45 岁。因持续的烧心和反酸就诊，诊断为胃食管反流病，宜选用的抑酸药物是（）

- A: 乳酶生
- B: 吉法酯
- C: 米索前列醇
- D: 雷尼替丁

答案：D

3. 关于利伐沙班注意事项的描述，不正确的是（）

- A: 用药过量可导致出血并发症
- B: 对于不同的手术选择的疗程不同
- C: 如伤口已止血，首次用药应于术后立即给药
- D: 用药期间需定期测定血红蛋白

答案：C

4. (2016 年真题) 患者，男，56 岁。有高血压病史 4 年。体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。监测他汀类药所致肌毒性的临床指标是

- A: 乳酸脱氢酶
- B: 碱性磷酸酶
- C: 尿淀粉酶
- D: 肌酸激酶

答案：D

5. 治疗滴虫性阴道炎适宜使用的药物是 ()

- A: 甲硝唑
- B: 呋喃妥因
- C: 苄星青霉素
- D: 庆大霉素

答案：A

6. 阿糖胞苷的作用机制是 ()

- A: 胸腺核苷合成酶抑制剂
- B: 二氢叶酸还原酶抑制剂
- C: DNA 多聚酶抑制剂
- D: 核苷酸还原酶抑制剂

答案：C

7. (2016 年真题) 鱼精蛋白可用于救治

- A: 吗啡过量导致的呼吸抵制
- B: 华法林过量导致的出血
- C: 肝素过量导致的出血

D: 异烟肼中毒导致的神经毒性

答案: C

8. 属于广谱抗心律失常药物的是()

A: 苯妥英钠

B: 利多卡因

C: 胺碘酮

D: 地高辛

答案: C

9. 噻嗪类利尿药的作用部位是

A: Na^+-Cl^- 共转运子

B: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子

C: 磷酸二酯酶

D: 远曲小管近端

答案: D

10. 以下有关 ACEI 药物治疗高血压的监护叙述中，不正确的是

A: 对伴低钠血症、脱水、低血容量患者在首剂治疗时注意低血压反应

B: 对已接受多种或大剂量利尿剂的患者，在首剂治疗时注意低血压反应

C: 我国对 ACEI 在肾病方面的建议：用药初 2 个月血肌酐升幅大于 30%~50%时应停药

D: 心力衰竭加重所致的咳嗽应当停用 ACEI

答案: D

11. 下列关于袢利尿药不良反应的描述，错误的是()

A: 耳毒性与剂量无关

B: 常见水、电解质紊乱

C: 长期使用多数患者可出现高尿酸血症

D: 当低血钾和低血镁同时存在时，如不纠正低血镁，即使补充钾也不易纠正低钾血症

答案：A

12. 糖皮质激素在临床上一般不用于

A: 全身性红斑狼疮

B: 支气管哮喘

C: 真菌感染

D: 中毒性感染

答案：C

13. 治疗绝经后妇女的骨质疏松症可选用()

A: 阿仑膦酸钠

B: 葡萄糖酸钙

C: 阿法骨化醇

D: 依降钙素

答案：A

14. (2017 年真题) 关于镇咳药作用强度的比较, 正确的是 ()

A: 可待因>苯丙哌林>喷托维林

B: 苯丙哌林>可待因>喷托维林

C: 苯丙哌林>喷托维林>可待因

D: 喷托维林>苯丙哌林>可待因

答案：B

15. 胰岛素的不良反应有

- A: 高血糖高渗性昏迷
- B: 酮症酸中毒
- C: 低血糖昏迷
- D: 骨髓抑制

答案：C

16. 单独应用时止吐作用相对较弱，主要作为辅助药物，用于减轻地塞米松所致焦虑和甲氧氯普胺所致静坐不能，也可用于减少预期性的化疗所致恶心呕吐的是

- A: 氯丙嗪
- B: 劳拉西泮
- C: 甲氧氯普胺
- D: 帕洛诺司琼

答案：B

17. 壬二酸的抗菌活性和吸收依赖于

- A: pH
- B: 浓度
- C: 作用面积
- D: 剂型

答案：A

18. 对服用双炔失碳酯后月经周期延长或闭经者，可加服

- A: 去氧孕烯
- B: 甲羟孕酮和炔雌醇
- C: 炔雌醇
- D: 维生素 B6

答案：B

19. (2016 年真题) 可用于习惯性流产的药品是

- A: 戊酸雌二醇
- B: 地屈孕酮
- C: 依普黄酮
- D: 他莫昔芬

答案: B

20. 治疗血吸虫病的药物是()

- A: 氯喹
- B: 乙胺嗪
- C: 甲硝唑
- D: 吡喹酮

答案: D

21. 作用机制为直接抑制破骨细胞的活性，从而抑制骨盐溶解，阻止钙由骨释出，而骨骼对钙的摄取仍在进行，因而可降低血钙；可抑制肾小管对钙和磷的重吸收，血钙也随之下降；对肿瘤骨转移、骨质疏松所致骨痛有明显治疗效果，该药物是

- A: 降钙素
- B: 骨化三醇
- C: 雷洛昔芬
- D: 阿仑膦酸钠

答案: A

22. 具有抗炎作用的他汀类调血脂药是

- A: 阿伐他汀
- B: 藻酸双酯钠

C: 普伐他汀

D: 氟伐他汀

答案: C

23. 作用于髓袢升支粗段的利尿剂是

A: 碳酸酐酶抑制剂

B: 醛固酮受体阻断剂

C: 噻嗪类和类噻嗪类利尿剂

D: 袢利尿剂

答案: D

24. (2018 年真题) 围手术期为预防革兰阴性杆菌感染, 可选用 ()

A: 氨曲南

B: 头孢唑林

C: 青霉素 G

D: 万古霉素

答案: A

25. 可致细胞膜通透性增加, 细菌膨胀、溶解死亡的药物是

A: 环丙沙星

B: 庆大霉素

C: 替加环素

D: 多黏菌素

答案: D

26. 属于钙通道阻滞剂的抗心律失常药是 ()

A: 胺碘酮

B: 普鲁卡因胺

C: 利多卡因

D: 维拉帕米

答案: D

27. 糖尿病酮症酸中毒患者选用()

A: 格列本脲

B: 丙硫氧嘧啶

C: 胰岛素

D: 二甲双胍

答案: C

28. 司坦唑醇的禁忌证不包括

A: 前列腺增生

B: 男性乳腺癌

C: 严重心功能不全

D: 肾炎

答案: C

29. 氨基糖苷类

A: 禁用于早产儿、新生儿

B: 禁用于胆道阻塞患者

C: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年

D: 禁用于 8 岁以下儿童

答案: D

30. 治疗肺孢子菌肺病的首选药物的是()

A: 磺胺嘧啶

B: 磺胺米隆

C: 柳氮磺吡啶

D: 复方磺胺甲噁唑

答案: D

31. 患者，男，42 岁，胃癌根治术后，病理检查结果为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常。化疗方案为奥沙利铂+氟尿嘧啶+亚叶酸钙。

A: 其神经系统毒性与剂量大小无关

B: 直肠癌的首选药之一

C: 应给予预防性或治疗性的止吐用药

D: 与氯化钠和碱性溶液(特别是氟尿嘧啶)之间存在配伍禁忌

答案: A

32. (2019 年真题) 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下，请结合问题作答。

A: 轻、中度肾功能不全患者可使用沙库巴曲缬沙坦

B: 从 ACEI 转换为沙库巴曲缬沙坦时，应停用 ACEI 36 小时后方可转换

C: 轻、中度肝功能损害患者可使用沙库巴曲缬沙坦

D: 沙库巴曲缬沙坦不能与阿替洛尔、吲哚美辛或西咪替丁合用

答案: D

33. 关于艾塞那肽的注意事项描述，不正确的是()

A: 应注意是否有过敏性症状

B: 本品可肌肉注射

C: 肾移植患者慎用

D: 服药期间应警惕急性胰腺炎症状

答案: B

34. 影响毛细血管通透性的促凝血药是

- A: 维生素 K
- B: 血凝酶
- C: 卡巴克络
- D: 鱼精蛋白

答案：C

35. 环磷酰胺属于哪一类抗肿瘤药物

- A: 烷化剂
- B: 抗代谢抗肿瘤药
- C: 抗肿瘤抗生素
- D: 抗肿瘤金属配合物

答案：A

36. 抑酸剂泮托拉唑长期应用可引起的典型不良反应是

- A: 血尿酸升高
- B: 定向力障碍
- C: 血糖升高
- D: 低镁血症

答案：D

37. （2016 年真题）患者，女，26 岁，妊娠 3 个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是

- A: 头孢氨苄
- B: 左氧氟沙星
- C: 青霉素 G
- D: 阿莫西林

答案：B

38. 属于Ⅲ类抗心律失常药的是

- A: 普罗帕酮
- B: 胺碘酮
- C: 奎尼丁
- D: 利多卡因

答案：B

39. 氯霉素的抗菌作用机制是

- A: 阻止氨基酰-tRNA 与细菌核糖体 30S 亚基结合，影响蛋白质的合成
- B: 与细菌核糖体 50S 亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性，从而阻止肽链延伸，使蛋白质合成受阻
- C: 改变细菌胞浆膜通透性，使重要的营养物质外漏
- D: 抑制二氢叶酸合成酶，影响叶酸的合成

答案：B

40. （2021 年真题）患者，女，27 岁，孕 34 周。诊断为轻度便秘，宜选用的药物是（）

- A: 普芦卡必利
- B: 乳果糖
- C: 硫酸镁
- D: 蓖麻油

答案：B

41. 属于抑制疟原虫的二氢叶酸还原酶，阻碍核酸合成的抗疟药物是

- A: 奎宁
- B: 乙胺嘧啶
- C: 吡喹酮
- D: 青蒿素

答案：B

42. (2021 年真题) 属于微管蛋白活性制剂的抗肿瘤药物是 ()

- A: 环磷酰胺
- B: 来曲唑
- C: 长春新碱
- D: 厄洛替尼

答案：C

43. 下列哪种疼痛不用吗啡治疗

- A: 急性锐痛
- B: 癌性剧痛
- C: 胆绞痛及肾绞痛
- D: 神经压迫性疼痛

答案：D

44. 治疗儿童癫痫，对认知功能和行为影响较小的药物是 ()

- A: 乙酰胺
- B: 丙戊酸钠
- C: 苯巴比妥
- D: 卡马西平

答案：D

45. 扎那米韦的作用靶点是

- A: 神经氨酸酶
- B: 脱氧核糖核酸聚合酶
- C: HIV-1 反转录酶
- D: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶

答案：A

46. 在妊娠期，尤其是妊娠末期或分娩期不宜应用，易发生"灰婴综合征"的药物是()

- A: 氯霉素
- B: 青霉素
- C: 多西环素
- D: 四环素

答案：A

47. 以下哪个药物不属于肝胆疾病辅助药

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 多潘立酮
- C: 甘草酸二铵
- D: 还原型谷胱甘肽

答案：B

48. 患者，男，50 岁。旅游登山时突发头晕，症状持续不缓解。查体：148 / 90mmHg，心率 80 次 / 分，医嘱卡托普利、氢氯噻嗪治疗。

- A: 阻断 AT1 受体
- B: 促进缓激肽水解
- C: 抑制循环系统的转换酶，减少血管紧张素 II 的生成
- D: 作用于 RAAS 初始环节，从源头减少血管紧张素 II 的生成

答案：C

49. 下列哪类药物属于快速杀菌药()

- A: 多黏菌素 B
- B: 红霉素

C: 氯霉素类

D: 氨基糖苷类

答案: D

50. 氨曲南的作用特点不包括

A: 可用于治疗脑膜炎

B: 时间依赖性抗菌药物

C: 血浆半衰期较短

D: 低毒，与青霉素类及头孢菌素类无交叉过敏

答案: A

51. 维生素 K 参与下列哪些凝血因子活化()

A: II、VII、IX、X 因子

B: VII、XI、VII、IX 因子

C: II、VII 因子

D: II、VIII、XI、IV 因子

答案: A

52. 促进钙吸收()

A: 葡萄糖酸钙

B: 依降钙素

C: 阿法骨化醇

D: 阿仑膦酸钠

答案: C

53. 可与催化肽聚糖合成的磷酸烯醇丙酮酸转移酶不可逆性结合，使该酶灭活，阻断细菌细胞壁的合成，从而导致细菌死亡的是

A: 磷霉素

- B: 万古霉素
- C: 利奈唑胺
- D: 美罗培南

答案：A

54. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽、咳痰伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”，入院后使用莫西沙星和氨溴索治疗。

- A: 替考拉宁
- B: 头孢哌酮
- C: 头孢曲松
- D: 阿米卡星

答案：A

55. 不具有磺酰胺基结构，更容易引起耳毒性的药物是

- A: 托拉塞米
- B: 布美他尼
- C: 呋塞米
- D: 依他尼酸

答案：D

56. (2016 年真题) 铜绿假单胞菌感染首选的抗菌药物是

- A: 头孢曲松
- B: 头孢他啶
- C: 利奈唑胺
- D: 罗红霉素

答案：B

57. (2016 年真题) 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式（控制饮食、增加运动）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他丁片 20mg/d 治疗

A: 100mg

B: 20mg

C: 80mg

D: 40mg

答案：C

58. 噻托溴铵平喘的主要机制是 ABCDE

A: 抑制白三烯受体

B: 激动肾上腺素 β_2 受体

C: 拮抗 M 胆碱受体

D: 阻断腺苷受体

答案：C

59. (2015 年真题) 利尿作用较弱，具有排钠留钾作用，可用于慢性心力衰竭治疗的利尿剂的是（）。

A: 氢氯噻嗪

B: 乙酰唑胺

C: 呋塞米

D: 螺内酯

答案：D

60. 白女士，74 岁，以“间断性腹胀 1 月余”主诉入院。患者 1 个月前无明显诱因出现腹胀，既往有乙肝病史 14 年。诊断：肝硬化失代偿期；腹水（大量）。医嘱：

- A: 充血性心力衰竭
- B: 预防急性肾衰竭
- C: 高钾血症
- D: 高钠血症

答案：D

61. （2015 年真题）属于芳香氨酶抑制剂的抗肿瘤药是（）。

- A: 阿那曲唑
- B: 他莫昔芬
- C: 炔雌醇
- D: 丙酸睾酮

答案：A

62. 头孢克洛不宜用于

- A: 脑膜炎
- B: 呼吸道感染
- C: 泌尿系统感染
- D: 中耳炎

答案：A

63. （2018 年真题）属于 β_2 受体激动剂的平喘药是（）

- A: 噻托溴铵
- B: 孟鲁司特
- C: 茶碱
- D: 沙美特罗

答案：D

64. 强心苷中毒最早出现的症状是

- A: 厌食、恶心和呕吐
- B: 眩晕、乏力和视力模糊
- C: 房室传导阻滞
- D: 色视

答案：A

65. 多库酯钠作为泻药的作用机制是

- A: 一种阴离子表面活性剂，口服后基本不吸收，在肠道内促进水和脂肪类物质浸入粪便，通过物理性润滑肠道排便
- B: 通过激活 CFTR（囊性纤维化跨膜传导调节因子），细胞内 cGMP 可增加小肠腔内氯化物和碳酸氢盐的分泌量，最终使小肠液分泌增多和结肠转运速度增快
- C: 在消化道不被吸收，在胃内酸性条件下，脱钙形成聚卡波非，在小肠或大肠的中性环境下显示了高度的吸水性，膨胀成为凝胶，保持消化道内水分，调节消化道内容物的输送，从而对便秘发挥治疗作用
- D: 选择性、高亲和力的 5-HT₄ 受体激动剂，可通过 5-HT₄ 受体激活作用来增强胃肠道中蠕动反射和推进运动模式，具有促肠动力活性

答案：A

66. 激动 I₁ 咪唑啉受体的降压药是

- A: 胍屈嗪
- B: 吡那地尔
- C: 利血平
- D: 可乐定

答案：D

67. 糖皮质激素的抗中毒性休克作用是

- A: 提高机体对细菌内毒素的耐受力
- B: 抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶
- C: 提高中枢神经系统的兴奋性
- D: 抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理

答案：A

68. 患者，男性，55 岁。每年冬春季常有哮喘发作，近日来上呼吸道感染，咳嗽加哮喘，门诊测血压亦升高，治疗方案：给予抗感染及平喘治疗外，尚考虑给予降压药，其中欲选择一种 β 肾上腺素受体阻断药，应选用

- A: 纳多洛尔
- B: 吲哚洛尔
- C: 普萘洛尔
- D: 美托洛尔

答案：D

69. 属于第二代 CCB 的是

- A: 乐卡地平
- B: 左旋氨氯地平
- C: 硝苯地平控释片
- D: 氨氯地平

答案：C

70. 双香豆素与苯巴比妥合用可

- A: 竞争性对抗
- B: 产生协同作用

C: 与其竞争结合血浆蛋白

D: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱

答案：D

71. 可预防环磷酰胺所致膀胱毒性的药物是()

A: 美司钠

B: 糖皮质激素

C: 呋塞米

D: 维生素

答案：A

72. 与氯吡格雷合用，竞争 CYP2C19，使用氯吡格雷患者血栓不良反应事件增多的药物是

A: 雷贝拉唑

B: 奥美拉唑

C: 泮托拉唑

D: 西咪替丁

答案：B

73. (2015 年真题) 患者，男，56 岁。有高血压病史 4 年。体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。该患者若长期服用依那普利片，除应监测血压、心、肾功能外。还应监测的指标是 ()。

A: 血钾

B: 血钙

C: 血氯

D: 血钠

答案：A

74. 阿托品用于全麻前给药的目的是()

- A: 减少麻醉药的用量
- B: 预防心动过缓
- C: 增强麻醉效果
- D: 减少呼吸道腺体分泌

答案: D

75. 可用于恶性淋巴瘤的药物是

- A: 阿糖胞苷
- B: 甲氨蝶呤
- C: 利妥昔单抗
- D: 氟尿嘧啶

答案: A

76. 血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)应避免与()联合应用。

- A: β 受体阻断剂
- B: 噻嗪类利尿剂
- C: 留钾利尿剂
- D: 人促红素

答案: C

77. 可引起下肢水肿的抗高血压药物是

- A: 洛伐他汀
- B: 硝酸甘油
- C: 普萘洛尔
- D: 硝苯地平

答案: D

78. 可用于预防 HIV（人免疫缺陷病毒）感染者巨细胞病毒视网膜炎的药物是

- A: 阿昔洛韦
- B: 恩替卡韦
- C: 金刚烷胺
- D: 更昔洛韦

答案：D

79. （2017 年真题）减少钠离子内流而使神经细胞膜稳定，属于乙内酰胺类抗癫痫药的是（）

- A: 苯妥英钠
- B: 苯巴比妥
- C: 加巴喷丁
- D: 卡马西平

答案：A

80. 急性白血病患者接受化疗期间出现了手指、足趾麻木、腱反射迟钝等不良反应，最有可能导致上述症状的药物是

- A: 曲妥珠单抗
- B: 环磷酰胺
- C: 长春新碱
- D: 甲氨蝶呤

答案：C

81. 抗肿瘤药一般缺乏特异性，在杀伤肿瘤细胞同时，对正常组织细胞不可避免的会产生损害或毒副作用，75%以上化疗患者会出现不同程度的恶心、呕吐。

- A: 应用化疗药后的 48~72h 内发生
- B: 应用化疗药后的 72h 后发生
- C: 应用化疗药后 24h 内发生
- D: 应用化疗药后的 24~48h 内发生

答案：C

82. 氯霉素的下述不良反应中，哪项是与剂量和疗程无关的严重反应

- A: 可逆的各类血细胞减少
- B: 二重感染
- C: 不可逆的再生障碍性贫血
- D: 灰婴综合征

答案：C

83. 下列药物属于第四代头孢菌素的是

- A: 头孢噻肟
- B: 头孢氨苄
- C: 头孢呋辛
- D: 头孢吡肟

答案：D

84. (2020 年真题) 主要用于治疗皮肤真菌感染，可抑制角鲨烯环氧酶活性，属于丙烯胺类的抗真菌药物是

- A: 特比萘芬
- B: 制霉菌素
- C: 联苯苄唑
- D: 阿莫罗芬

答案：A

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/728032121051007022>