

2025 年 护 师 类 B 卷 附 答

单 选 50 题 题) (共

1、： 与造血无关营养素是()

- A. 维生素 D
- B. 铁
- C. 维生素 C
- D. 叶酸
- E. 维生素 E

【答 案 】 A

2、在描述病程较长的慢性疾病存在或流行情况时，一般使用 () 。

- A. 发病率
- B. 罹患率
- C. 患病率
- D. 病死率
- E. 感染率

【答 案 】 C

3、关于产后正常恶露的描述，正确的是 () 。

- A. 浆液性恶露约持续 3 周
- B. 正常恶露大约持续 2~4 周
- C. 血性恶露约持续 1~2 天
- D. 产后第 3 天，恶露中含有较多血液

E. 血 性 恶 露 中 含 有 大 量 的 坏

【 答 案 】 D

4、吸入一氧化碳可导致中 毒，其发生机制是

- A. 缺氧
- B. 抑制酶的 活性
- C. 局部刺激腐蚀作用
- D. 抑制大 脑皮质活动
- E. 受体竞争

【 答 案 】 A

5、肺炎球菌肺炎咳

- A. 铁锈色痰
- B. 红色胶胨状黏稠脓性 痰
- C. 大 量 恶 臭味脓痰
- D. 棕黄色脓性 痰
- E. 粉红色乳状脓性 痰

【 答 案 】 A

6、为预防硫酸镁中 毒，静脉点滴速度每小时不应超过()。

- A. 0. 5g
- B. 1. 0g
- C. 1. 5g
- D. 2. 0g

E. 2. 5g

【 答 案 】 D

7、普通高血压病人的降压目标是将血压降至（ ）。

A. 120/70mmHg 以内

B. 130/80mmHg 以内

C. 140/90mmHg 以内

D. 150/90mmHg 以内

E. 150/95mmHg 以内

【 答 案 】 C

8、男性，70 岁。主动脉-冠状动脉旁路移植术后第 2 天，ICU 监护，EKG 示波出现心室颤动， 血压下降，应该立即采取的措施为

A. 非同步电复律

B. 同步电复律

C. 静推利多卡因

D. 静推肾上腺素

E. 静推心三联

【 答 案 】 A

9、产程延长可导致

A. 宫缩乏力

B. 胎盘嵌顿

C. 胎盘粘连

- D. 软产道裂伤
- E. 凝血功能障碍

【答案】A

10、低位肠梗阻易发生的碱性失衡是（ ）。

- A. 代谢性酸中毒
- B. 呼吸性酸中毒
- C. 代谢性碱中毒
- D. 呼吸性碱中毒
- E. 代谢性酸中毒合并呼吸性碱中毒

【答案】A

11、男，50 岁，右侧肢体逐渐抖动 1 年余。体检：血压 20/12kPa (150/90mmHg)，神志清楚，表情呆板，右上下肢肌力正常，肌张力增高，右上下肢可见静止性震颤，神经系统检查未发现异常。最可能的诊断是

- A. 脑梗死
- B. 震颤麻痹
- C. 肝豆状核变性
- D. 小舞蹈病
- E. 癫痫局限性运动性发作

【答案】B

12、有关分娩临床经过，错误的是

- A. 规律性宫缩由弱到强
- B. 宫颈 张分

- C. 潜伏 16 小时约需
- D. 活跃 4 期时均约需
- E. 破膜多在第一产程末

【 答 案 】 C

13、社区护士对肢体有伤口的伤员急救处理措施为（ ）。

- A. 用清水冲洗创面
- B. 对擦伤、撕裂伤可挤出创面少量血液
- C. 立即使用吗啡等药物
- D. 可经口补充一定量的液体
- E. 发现伤者立即搬运至卫生站

【 答 案 】 B

14、胰岛素剂量过大

- A. 低血糖反应
- B. 妊娠后期糖尿病
- C. 酮症酸中毒
- D. 2 型糖尿病
- E. 血管神经性水肿

【 答 案 】 A

15、诊断呼吸衰竭的血气标准是

- A. PaO
- B. PaO

C. PaO

D. PaO

E. PaO

【 答 案 】 C

16、光疗最常见的副作用是

A. 腹泻

B. 发热

C. 皮疹

D. 溶血

E. 青铜症

【 答 案 】 B

17、表示死亡的符号是

A.

B.

C.

D.

E.

【 答 案 】 C

18、硬脑膜外血肿病人意识变化特点是

A. 昏迷

B. 昏迷—清醒

- C. 昏 迷 — 清 醒 — 昏 迷
- D. 清 醒 — 昏 迷
- E. 清 醒 — 昏 迷 — 清 醒

【 答 案 】 C

19、判断妊娠合并糖尿病孕妇治疗效果的依据是

- A. 尿糖定量
- B. 尿糖定性
- C. 尿酮体测定
- D. 空腹血糖测定
- E. 75 克葡萄糖耐量试验

【 答 案 】 D

20、对放疗高度敏感的肿瘤是（ ）。

- A. 来自上皮组织的恶性肿瘤
- B. 淋巴造血系统和某些胚胎组织的恶性肿瘤
- C. 软组织恶性肿瘤
- D. 骨组织恶性肿瘤
- E. 黑色素瘤

【 答 案 】 B

21、腹型过敏性紫癜患儿护理措施，正确的是（ ）

- A. 腹痛时行热敷
- B. 观察有无血便

- C. 高蛋白饮食
- D. 饮食以软食为主
- E. 鼓励下床活动

【 答 案 】 B

22、先露部位置在坐骨棘以 2cm,上记录应为

- A. +2cm
- B. -2cm
- C. 0cm
- D. -1cm
- E. +1cm

【 答 案 】 B

23、护士在对慢性阻塞性肺气肿病人进行护理的过程中，哪项措施是不妥当的

- A. 给予高热量、高蛋白、高维生素饮食
- B. 指导做腹式和缩唇呼吸
- C. 给予高浓度吸氧
- D. 慎用镇静药
- E. 避免食用产气食物

【 答 案 】 C

24、患儿女，4岁。精神运动发育明显落后，只会说简单话，两眼外眦上斜，内眦赘皮，鼻梁低下，舌伸出口外，通贯的是。

- A. 性

- B. 先天性甲状腺功能低
- C. 大脑发育不全
- D. 21-三体综合症
- E. 生长激素缺乏症

【 答 案 】 D

25、体外冲击碎石两次的间隔时间至少要大于（ ）。

- A. 3 天
- B. 5 天
- C. 7 天
- D. 9 天
- E. 14 天

【 答 案 】 C

26、符合社区卫生服务发展原则的是（ ）。

- A. 以地方为主，因地制宜
- B. 以基本医疗服务为主，中西医并重
- C. 注重卫生服务的效益性和盈利性
- D. 立足于扩建和新建，健全社区卫生服务网络
- E. 以社会参与为主导，多渠道发展社区卫生服务

【 答 案 】 A

27、胎心减速与宫缩无固定关系，下降迅速且下降幅度大，恢复也迅速，提示

- A. 胎儿状况良好

- B. 宫 缩 时 胎 头 受 压
- C. 胎 儿 受 镇 静 药 物 影 响
- D. 宫 缩 时 脐 带 受 压 兴 奋 迷 走
- E. 胎 儿 缺 氧

【 答 案 】 D

28、 羊 水 穿 刺 作 为 产 前 诊 断

- A. 妊 11~娠 周 13
- B. 妊 13~娠 周 14
- C. 妊 14~娠 周 20
- D. 妊 20~娠 周 24
- E. 妊 24~娠 周 28

【 答 案 】 C

29、 前 列 腺 手 术 后 ， 预 防 前

- A. 做 好 气 囊 导 尿 管 护 理
- B. 肛 管 排 气
- C. 避 免 剧 烈 活 动
- D. 禁 止 灌 肠
- E. 避 免 用 力 排 便

【 答 案 】 B

30、 患 岁 者 。 女 肝 ， 3区 45 痛 侧 髌 高 密 度
有 叩 痛cm; ,示 CT 胎 砵 痛 砵 下 高 密 度
可 的 诊 。 断

- A. 原发性肝癌
- B. 细菌性肝脓肿
- C. 阿米巴性肝脓肿
- D. 肝包虫病
- E. 肝囊肿

【 答 案 】 B

31、消化性溃疡患者并发幽门梗阻，血钾遵医嘱给予静脉补钾，下列哪项护理措施不正确

- A. 见尿补钾
- B. 速度不宜过快
- C. 以最快的速度尽早补足
- D. 浓度一般不超过 0.3%
- E. 每日补钾量一般不超过 4~6g

【 答 案 】 C

32、男性 25 岁，左腰部刺伤入院。BP 70/50mmHg，伤口持续溢出淡红色液体，左上腹触痛，但无肌紧张及反跳痛。为明确诊断首选哪项检查？（ ）

- A. B 超检查
- B. 伤口溢出液淀粉酶测定
- C. 钡餐检查
- D. 钡剂灌
- E. 检查

【 答 案 】 A

33、重症肌无力病人的首发症状是

- A. 饮水呛咳
- B. 言语不清
- C. 四肢乏力
- D. 眼睑下垂
- E. 吞咽困难

【答案】 D

34、女性，60 岁，因消瘦、腹胀、纳差 5 年入院，病前曾有慢性肝病史。查：皮肤、巩膜黄染，腹部膨隆，移动性浊音阳性，脾肋下可触及。如经三腔二囊管压迫止血 24 小时后未见继续出血，此时对三腔二囊管的处理应是

- A. 三腔管继续压迫 24 小时
- B. 气囊放气后留置三腔管观察 24 小时
- C. 放气拔管，继续内科治疗
- D. 继续压迫至大便潜血转阴后放气拔管
- E. 放气拔管，转外科手术治疗

【答案】 B

35、骨折早期的严重并发症是 。

- A. 部 染
- B. 血性骨
- C. 骨 膜
- D. 部 性 染
- E. 压

【答案】 C

36、急性白血病贫血的主要原因是

- A. 红细胞生成减少
- B. 红细胞寿命缩短
- C. 出血致红细胞丢失过多
- D. 促红细胞生成素减少
- E. 铁摄入不足或吸收不良

【答案】 A

37、某孕妇孕 36 周，在乘坐的公共汽车急刹车后突感剧烈腹痛难忍。血压 140/100mmHg。检查：阴道无流血，子宫似足月妊娠大小，硬如板状，压痛明显，胎位不清，胎心约 90 次 / 分。

- A. 及时终止妊娠
- B. 期待疗法
- C. 积极降压治疗
- D. 及时抑制宫缩
- E. 积极补充血容量

【答案】 A

38、对癫痫发作患者的首要处置是（ ）。

- A. 制止发作
- B. 压舌
- C. 急行 CT
- D. 吸氧，止惊
- E. 细查病因

【 答 案 】 D

39、 妇 科 最 常 见 的 良 性 肿 瘤

- A. 纤 维 瘤
- B. 畸 胎 瘤
- C. 子 宫 肌 瘤
- D. 睾 丸 母 细 胞 瘤
- E. 卵 巢 巧 克 力 囊 肿

【 答 案 】 C

40、 一 诊 断 为 尿 痿 的 妇 女 为

- A. 亚 甲 蓝 （美 蓝 ）试 验
- B. 靛 胭 脂 试 验
- C. 膀 胱 镜 检 查
- D. 宫 腔 镜 检 查
- E. 肾 盂 输 尿 管 静 脉 造 影 术

【 答 案 】 D

41、 II型呼吸衰竭采用（ ）。

- A. 低流量持续给氧
- B. 低流量间歇给氧
- C. 中 流量间歇给氧
- D. 较高浓度给氧
- E. 面罩加压给氧

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/728054021027007023>