

## 临床护士应知应会及三基理论知识考试试题库与答案

1、李某,男,40岁,农民。2周前出现腹泻,7-10次/天,为果酱样大便,伴右下腹部压痛,无发热,无里急后重,粪便常规发现夏科-莱登结晶。该病人的诊断应是()

- A、急性菌痢普通型
- B、霍乱
- C、病毒性肠炎
- D、阿米巴痢疾普通型
- E、伤寒

答案: D

2、患者,女性,52岁,因车祸致颅脑外伤2天入住重症监护病房。体查:患者昏迷,熊猫眼,鼻腔有液体流出,口角颜面部损伤,咳嗽反应差,喉部可闻及痰鸣音,已吸氧。以下吸痰操作中说法不正确的是()

- A、禁止经鼻腔吸痰
- B、吸痰前和患者交流取得患者配合
- C、可经口腔吸痰
- D、每次吸痰不超过15秒
- E、吸痰前调高患者氧流量

答案: B

3、患者女,46岁。反复咳嗽、咳脓痰21年,支气管造影证实右下、左下叶支气管扩张。近1周发热,痰量增多,下列哪一项处理是错误的

- A、手术治疗
- B、体位引流
- C、应用祛痰药
- D、痰细菌学检查
- E、选用敏感抗生素

答案: D

4、盆腔器官手术前导尿的目的是()

- A、放出尿液,减轻病人痛苦
- B、留取尿标本作细菌培养
- C、排空膀胱,避免术中误伤
- D、向膀胱内注入药液
- E、检查残余尿量

答案: C

5、宋某,女,39岁。拟诊为ITP而收住入院。查血小板计数为 $50 \times 10^9/L$ 。  
对该病人的健康宣教,下列内容正确的是( )

- A、严格卧床休息,避免颅内出血的发生
- B、服用糖皮质激素期间应低钾低钠饮食
- C、有感冒发热应及时使用阿司匹林
- D、定期骨髓穿刺检查巨核细胞的数量和质量
- E、目前情况无须血小板输注治疗

答案: E

6、症状性癫痫的定义是指( )

- A、临床上不能分类的癫痫
- B、从婴儿起始的癫痫
- C、抗癫痫药物无法控制的癫痫
- D、脑部有病损或代谢异常的癫痫
- E、脑部无病损或代谢异常的癫痫

答案: D

7、某患者因慢性心衰入院,护士在给予患者地高辛时,下列情况不能给药的是( )

- A、血压 150/90mmHg
- B、房颤
- C、便秘
- D、心率 56 次/分
- E、呼吸困难

答案: D

8、患者,男,42岁。有癫痫病史,2小时前饮酒后出现意识模糊、口鼻分泌物增多、伴双下肢不对称强直和阵挛。此时该患者最重要的护理措施为( )

- A、及时清除口鼻分泌物
- B、协助医生行气管切开
- C、按压患者抽搐身体
- D、保持室内光线柔和
- E、给予患者心里安慰

答案: A

9、大量不保留灌肠溶液流入受阻时,处理的首要方法是

- A、提高灌肠筒
- B、降低灌肠筒
- C、移动或挤捏肛管

- D、嘱患者深呼吸
- E、嘱患者快速呼吸

答案：C

10、患者,女性,35岁,腹腔镜下阑尾切除术后第二天,已进半流质饮食,根据医嘱应给患者什么护理级别?( )

- A、一级护理
- B、二级护理
- C、三级护理
- D、特级护理

答案：B

11、患儿,男,生后10小时,吃奶、烦躁不安、体温37.9℃,脐带根部及周围皮肤发红,脐窝无脓性分泌物,诊断为新生儿脐炎,此时最合适的护理措施为( )

- A、脐部采用10%硝酸银溶液涂擦
- B、脐部使用75%乙醇清洗
- C、遵医嘱静脉输注抗生素
- D、遵医嘱予以布洛芬口服液
- E、脐部采用1%过氧化氢涂擦

答案：B

12、某女,50岁,右乳癌根治术后上肢活动受限受限。护士指导其患侧肢体康复锻炼,达到的目的是

- A、手能摸到同侧耳朵
- B、肩能平举
- C、肘能屈伸
- D、手摸到对侧肩部
- E、手经头摸到对侧耳朵

答案：E

13、下肢静脉曲张术后早期活动的目的是预防( )

- A、肌肉僵直
- B、患肢水肿
- C、血管痉挛
- D、术后复发
- E、深静脉血栓形成

答案：E

14、抢救完毕,( )小时内应完成抢救护理记录

- A、4

- B、 6
- C、 8
- D、 12
- E、 24

答案： B

15、 体外冲击碎石最适宜于多大的结石( )

- A、  $>2.5\text{cm}$
- B、  $<2.5\text{cm}$
- C、  $\geq 2.5\text{cm}$
- D、  $>3\text{cm}$
- E、  $<3\text{cm}$

答案： B

16、 引起肝性脑病最常见的原因是( )

- A、 门体分流手术
- B、 原发性肝癌
- C、 妊娠急性脂肪肝
- D、 肝硬化
- E、 严重胆道感染

答案： D

17、 使用约束带正确的是( )

- A、 符合使用指征即可使用
- B、 使用前不一定取得病人的同意
- C、 躁动病人约束带可拉紧以防脱落
- D、 保护性制动时间可随意延长
- E、 约束带下垫的衬垫松紧要适度

答案： E

18、 患者男, 60 岁。 骶尾处有一个  $2\text{CM} \times 2\text{CM}$  压疮。 护士准备给患者换药, 在准备物品时, 不小心将 0.9%氯化钠溶液倒在无菌巾包上, 正确的做法是

- A、 烘干后使用
- B、 无菌包重新灭菌
- C、 4 小时内用完
- D、 24 小时内用完
- E、 立即将无菌包内的无菌巾用完

答案： B

19、 乙醇擦浴的禁忌部位应除外是( )

- A、足底
- B、心前区
- C、腋窝
- D、腹部
- E、后颈

答案：C

20、霍某,女,70岁。确诊肝硬化近10年。长期服用排钾利尿药呋塞米。今晨家人发现其昏睡不醒,送来急诊。拟诊“肝性脑病”。下列选项不属于该病常见诱因的是()

- A、感染
- B、大量利尿
- C、消化道出血
- D、反复大量放腹水
- E、严格限制蛋白质摄入

答案：E

21、标准预防应视( )病人均为具有潜在感染性的病人

- A、重点病人
- B、筛查后病人
- C、所有病人
- D、发热病人
- E、有流病史的患者

答案：C

22、罗某,男,74岁,因情绪激动后突然倒地,不省人事,大小便失禁2小时入院。临床诊断最可能的是( )

- A、脑出血
- B、脑梗死
- C、蛛网膜下腔出血
- D、脑疝
- E、高血压脑病

答案：A

23、病人张某,烧伤后采用暴露疗法,可选用的保护具是( )

- A、宽绷带
- B、床档
- C、肩部约束带
- D、膝部约束带

E、支被架

答案：E

24、以下需要集中隔离观察的人群不包括( )

A、确诊患者

B、确诊患者密切接触者

C、无法排除的发热患者

D、入境人员

E、高风险地区流入人员

答案：A

25、中央型胸椎间盘突出症最先出现的临床症状为( )

A、脊柱急慢性损伤

B、脊柱姿势的改变

C、吸烟

D、胸椎及椎间盘的退行性改变

E、妊娠

答案：A

26、输入大量库存过久的血液可导致( )

A、高钠血症

B、低钠血症

C、低钾血症

D、高钾血症

E、低镁血症

答案：D

27、医疗废物存放点应加锁,设专人管理,夏季暂时储存的时间不得超过( )  
天

A、1天

B、2天

C、3天

D、7天

答案：B

28、患者,男,52岁,突然出现意识丧失,呼吸不规则,首先判断有无发生心脏骤停的指标是( )

A、桡动脉搏动消失

B、颈动脉搏动消失

C、瞳孔散大

D、血压下降明显

E、心音消失

答案：B

29、双相波除颤仪首次除颤选( )

A、 120-200J

B、 100-200J

C、 260-300J

D、 360J

E、 180J

答案：A

30、血尿是指离心后尿沉渣镜检每高倍视野红细胞为( )

A、 3 个以上

B、 5 个以上

C、 8 个以上

D、 10 个以上

E、 15 个以上

答案：A

31、患者因肠梗阻入院后行肠切除术,术后护士嘱病人取半坐卧位的目的是( )

A、减少静脉回流量,减轻心脏负担

B、改善局部血液循环

C、增加肺活量,改善呼吸困难

D、减轻腹部缝合处张力

E、减少重力

答案：D

32、李某,男,30岁。因拟诊“人禽流感”住院治疗,对该病人实施的预防控制措施属于( )

A、甲类传染病按甲类处理

B、乙类传染病按乙类处理

C、丙类传染病按丙类处理

D、甲类传染病按乙类处理

E、乙类传染病按甲类处理

答案：E

33、脑出血最好发的部位为( )

A、小脑

- B、中脑
- C、大脑
- D、脑桥
- E、内囊

答案：E

34、新型冠状病毒核酸检测标本首选( )

- A、呼吸道标本
- B、粪便标本
- C、尿液标本
- D、结膜拭子标本
- E、血液标本

答案：A

35、病情稳定或处于康复期,且自理能力轻度依赖或无须依赖的患者可以确  
定为( )护理。

- A、特级
- B、一级
- C、二级
- D、三级

答案：D

36、慢性骨髓炎,死骨形成,出现红、肿、热,有波动感,应采用 ( )

- A、截肢术
- B、窦道切除术
- C、死骨摘除术
- D、切开引流术
- E、全身抗生素治疗

答案：D

37、大量咯血是指病人每天咯血量大于( )

- A、200ml
- B、300ml
- C、400ml
- D、500ml
- E、600ml

答案：D

38、下肢静脉曲张病人手术治疗的禁忌证是 ( )

- A、深静脉不通畅



- B、下肢水肿
- C、小腿溃疡
- D、交通支瓣膜功能不全
- E、大隐静脉瓣膜功能不全

答案：A

39、某病人今晨距小腿关节扭伤,局部青紫,为防止皮下出血与肿胀,早期应选用()

- A、局部按摩
- B、红外线照射
- C、冷湿敷
- D、热湿敷
- E、热水袋热敷

答案：C

40、纤维内窥镜的消毒灭菌宜用()

- A、酒精浸泡法
- B、戊二醛浸泡法
- C、紫外线照射法
- D、高压蒸汽灭菌法
- E、煮沸法

答案：B

41、吴先生,50岁,直肠癌手术后2周。生命体征:体温37.1℃,脉搏78次/分,呼吸20次/分,血压120/86mmHg。拟选择在左上肢进行PICC置管进行化疗。皮肤消毒时宜选择的消毒剂是()

- A、0.02%乙酸
- B、2%碘酊
- C、75%乙醇
- D、2%碘伏
- E、0.1%氯己定

答案：D

42、外科病人最常见的缺水类型()

- A、原发性缺水
- B、继发性缺水
- C、等渗性缺水
- D、低渗性缺水
- E、高渗性缺水

答案：C

43、为清醒患者行口腔护理擦洗牙齿的顺序( )。

A、依次擦洗牙齿右上舌面→右上咬合面→左上舌面→左上咬合面→弧形擦洗颊部

B、依次擦洗牙齿左上舌面→左上咬合面→左下舌面→左下咬合面 →弧形擦洗颊部

C、依次擦洗牙齿左上舌面→右上咬合面→右上舌面→左上咬合面 →弧形擦洗颊部

D、依次擦洗牙齿右上咬合面→右上舌面→左下舌面→左下咬合面 →弧形擦洗颊部

E、依次擦洗牙齿左上咬合面→左下舌面→右上咬合面→右上舌面 →弧形擦洗颊部

答案：B

44、女性 68 岁,因颅内压增高头痛逐渐加重,行腰椎穿刺脑脊液检查后突然呼吸停止,双侧瞳孔直径 2mm,以后逐渐散大,血压下降,该病人最可能出现了( )

A、小脑幕切迹疝

B、枕骨大孔疝

C、大脑镰下疝

D、脑干缺血

E、脑血管意外

答案：B

45、严重挤压伤常发生( )

A、高钾血症

B、高钙血症

C、低钾血症

D、低钙血症

E、高镁血症

答案：A

46、小儿头皮静脉输液时,如误注入动脉,局部表现为( )

A、局部无变化

B、苍白、水肿

C、呈树枝状分布苍白

D、沿静脉走向呈条索状红线

E、局部发绀、水肿

答案：C

47、下列属于压力性损伤的是( )

- A、跌倒, 撞伤
- B、冰袋、制冷袋所致得冻伤
- C、因导尿不慎所致的尿道黏膜损伤
- D、因石膏、加夹固定过紧所形成的局部压疮
- E、因医务人员言谈不慎导致病人情绪波动, 病情加重

答案：D

48、某新生儿出生 15 小时, 接种卡介苗正确方法是( )

- A、前臂掌侧下段 ID
- B、三角肌下缘 ID
- C、三角肌下缘 H
- D、股外侧 H
- E、臀大肌 IM

答案：B

49、对缺氧和二氧化碳潴留同时并存者应( )

- A、高浓度给氧为宜
- B、大流量给氧为宜
- C、低浓度持续给氧为宜
- D、低流量间断给氧为宜
- E、高浓度间断给氧为宜

答案：C

50、下列病历资料不可以复印的有( )。

- A、门诊病历
- B、医嘱单
- C、会诊意见
- D、手术同意书
- E、护理记录

答案：C

51、肋骨骨折最常见于( )

- A、1~3 肋骨
- B、4~7 肋骨
- C、7~9 肋骨
- D、9~10 肋骨
- E、11~12 肋骨

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/728055044060006035>