2023 年深静脉血栓试题

基本信息：[矩阵文本题] *

姓名：	_____
科室：	_____

1.VTE 最早旳症状（） [单项选择题] *

A.疼痛(对旳答案)

B.肿胀

C.浅静脉曲张

D.皮温高

E .皮肤溃疡

2.下肢静脉血栓旳患者大腿周径旳测量点为髌骨上缘以上（）处。 [单项选择题] *

A. 10cm

B .15cm(对旳答案)

C .18cm

D .20cm

E. 5cm

3.长期卧床的病人为了防止深静脉血栓下列说法哪项错误（） [单项选择题] *

A.限制病人的活动(对的答案)

B. 增长病人的活动

C. 协助病人进行被动运动

D. 床上行踝泵运动

E.使用弹力袜

4.DVT 防止措施不包括（） [单项选择题] *

A.基本防止

B、物理防止

C、药物防止

D、化学防止(对的答案)

5.DVT 患者介入术后继续患肢抬高,高于心脏（）， 运用重力增进静脉回流。 [单项选择题] *

A.20~30cm(对的答案)

B.10~20cm

C.30~40cm

D.25~30cm

6.Caprini VTE 风险评分对的的是：（） [单项选择题] *

A.极低危组(0-3 分)

B.低危组(0-2 分)

C.中危组(2-4 分)

D.高危组(≥5 分)(对的答案)

7.下面有关深静脉血栓防治的健康宣传教育内容描述错误的是（） [单项选择题] *

A、防止长时间坐位或站立

B、多饮水,量约 2023ml

C 、多食清淡易消化饮食,保持大便畅通

D、可在下肢进行静脉穿刺,但要尽量减少扎止血带的时间(对的答案)

8.有关下肢深静脉血栓形成后综合征，下列描述不对的的是（） [单项选择题] *

A．浅静脉曲张

B．常规行大隐静脉高位结扎剥脱术效果明显(对的答案)

C．足靴区溃疡

D．长时间站立后下肢肿胀

E．需要长期弹力袜支持

9.急性下肢深静脉血栓形成时，根据如下哪个体征可诊断股青肿（） [单项选择题]

*

A．下肢肿胀

B．浅静脉曲张

C．下肢青紫

D．腓肠肌压痛

E．下肢肿胀青紫，足背动脉搏动明显减弱或消失(对的答案)

10 下列哪一项是诊断深静脉血栓形成后综合征的重要根据（） [单项选择题] *

A．患肢活动后明显肿胀，平卧休息后肿胀减轻

B．浅静脉曲张

C．下肢静脉顺行造影(对的答案)

D．患肢足靴区反复溃疡

E．患肢大片色素从容，脂质硬化

11.严重下肢动脉缺血所致的肢体冰凉，下列哪项处理不应采用（） [单项选择题] *

A．予以扩血管药物

B．低分子肝素抗凝

C．穿棉袜子保暖

D．高温暖足(对的答案)

E.可采用动脉造影明确动脉病变的程度和范围

12.急性动脉栓塞栓子来源最常见的（） [单项选择题] *

A.血管源性

B.心源性(对的答案)

C.医源性

D.肺源性

E.腹积极脉

13.大隐静脉汇入股静脉前分支除外（） [单项选择题] *

A．旋髂浅静脉

B．股外侧静脉

C．阴部外静脉

D．胫前静脉(对的答案)

E.腹壁浅静脉

14. 深静脉血栓形成后应采用的护理措施中,错误的是（） [单项选择题] *

A.抬高肢体、制动

B.禁忌经患肢输液

C.严禁按摩患肢,以防血栓脱落

D.不用监测凝血时间及凝血酶原时间(对的答案)

15.阿司匹林用于治疗下肢深静脉血栓形成的重要作用是（） [单项选择题] *

A.扩张微血管

B.稀释血液

C.扩充血容量

D.溶解血栓

E.克制血小板汇集(对的答案)

16.对的的 VTE 风险评估是 VTE 防止关键，有三个节点分别是：（） [单项选择题]

*

A .入院评估，入院后评估

B. 手术评估

C. 入院评估，手术后评估，病情变化评估(对的答案)

D .入院前评估

E.出院前评估

17.怎样测足背动脉有搏动（） [单项选择题] *

A .用大拇指

B .先放中指然后在放食指最终是无名指一起触摸足背动脉(对的答案)

C .食指

D .无名指

E.食指与中指

18.VTE 极高危患者 DVT 发生率（） [单项选择题] *

A . < 10%

B. 10 - 20%

C. 20 - 40%

D.50%-60%

E. 40 - 60%(对的答案)

19.住院患者 capriniVTE 风险评估评分 8 分属于（） [单项选择题] *

A. 低危

B. 中危

C. 高危(对的答案)

D .极高危

E.无风险

20.防止 VTE 中改善生活方式错误的是（） [单项选择题] *

A.减肥

B.戒烟

C .规律运功

D .久坐(对的答案)

E.控制血压

21.我院对新入院患者应在（）小时内完毕 VTE 评估 [单项选择题] *

A.1h

B.2h

C.6h

D.8h(对的答案)

E.12h

22.患者是 VTE 发生的高危人群，caprini 评分在（）分以上 [单项选择题] *

A.3 分

B.4 分

C.5 分(对的答案)

D.6 分

E.8 分

23.VTE 高危(≥4 分)，出血风险高不适宜（） [单项选择题] *

A.间歇充气加压泵(IPC)

B.分级加压弹力袜(GCS)

C.足底静脉泵

D.推荐抗凝药物(对的答案)

24.下列不属于机械防止禁忌症（） [单项选择题] *

A.下肢动脉硬化性缺血

B.充血性心力衰竭

C.胸腔恶性肿瘤(对的答案)

D.急性下肢 DVT

25.药物防止措施提议低剂量一般肝素（） [单项选择题] *

A.5000U 每 12h 一次，皮下注射(对的答案)

B.3000U 每 6h 一次，皮下注射

C.3000U 每 12h 一次，皮下注射

D.5000U 每 6h 一次，皮下注射

26.新型抗凝药物：利伐沙班及阿哌沙班,重要用于（） [单项选择题] *

27.肺栓塞最常见的类型（） [单项选择题] *

A.PTE(对的答案)

B.脂肪栓塞综合征

C.羊水栓塞

D.空气栓塞

28.下列不属于抗凝治疗高危风险旳是（） [单项选择题] *

A.嗜酒

B.频繁跌倒

C.无近期手术史(对旳答案)

D.糖尿病

29.防止 VTE，手术中防止首选（） [单项选择题] *

A.腔静脉滤器

B.GCS

C.IPC(对旳答案)

D.使用抗凝药物

30.下列哪项不属于 VTE 发生危险原因（） [单项选择题] *

A.骨折

B.肥胖

C.高龄

D.酗酒(对旳答案)

31.下列哪项不属于 VTE 发生旳原发危险原因（） [单项选择题] *

A.高酮型半胱氨酸血症

B.抗心磷脂抗体综合征

C.克罗恩病(对的答案)

D.蛋白 C 缺乏

32.PTE 引起病理生理变化，下列哪项不对的（） [单项选择题] *

A.右心房压力升高，也许导致卵圆孔开放，出现心内右向左分流

B.栓塞可导致炎症介质释放，支气管平滑肌发生痉挛

C.肺动脉的机械堵塞和肺血管痉挛是栓塞后发生肺动脉高压的基础

D.肺栓塞重要引起右肺功能衰竭，可出现急性肺源性心脏病，左心功能则不受影响。(对的答案)

33.有关 PTE 症状描述错误的是（） [单项选择题] *

A.PTE 患者可以无任何症状

B.PTE 的症状缺乏特异性

C.多数 PTE 患者体既有咳血症状(对的答案)

D.晕厥可以是 PTE 的首发症状

34.下列有关 PTE 治疗论述错误的是（） [单项选择题] *

A.对于出现休克的大面积 PTE 患者，应予以迅速大量的补液(对的答案)

B.低分子肝素由肾脏清除，因此对肾功能不全患者慎用

C.对于大面积 PTE 也可以进行溶栓治疗

D.溶栓治疗前应考虑配血，做好输血准备

35.下列不属于 VTE 物理防止措施的是（） [单项选择题] *

A.弹力袜

B.间歇性气压泵

C.足底静脉泵

D.吹气试验(对的答案)

36.下列名词缩写错误的是（） [单项选择题] *

A.肺血栓栓塞症(PTE)

B.间歇充气加压泵(IPC)

C.分级加压弹力袜(GGS)(对的答案)

D.深静脉血栓形成(DVT)

37.最常见的深静脉血栓形成是（） [单项选择题] *

A.上肢深静脉血栓形成

B.下肢深静脉血栓形成(对的答案)

C.上腔静脉血栓形成

D.下腔静脉血栓形成

38.术后病人深静脉血栓形成最常见的部位是（） [单项选择题] *

A.头静脉

B.贵要静脉

C.下腔静脉

D.髂股静脉

E.小腿深静脉(对的答案)

39.下列哪项最常合并肺栓塞（） [单项选择题] *

A .下肢深静脉血栓(对的答案)

B .肾盂肾炎

C .房间隔缺损

D .冠脉造影术后

40.患者男，60 岁，下肢水肿病史 5 年，右下肢水肿较剧，无高血压及糖尿病史，

昨晚在看电视时突发呼吸困难，活动后加重，不伴有咳嗽、咳痰，其也许的诊断为

（） [单项选择题] *

A.肺动脉血栓形成

B. 肺动脉血栓栓塞(对的答案)

C. 肺动脉脂肪栓塞

D. 肺血流量增长

41.低分子肝素皮下注射吸取好且快的部位（） [单项选择题] *

A.脐周(对的答案)

B.上臂三角肌下缘

C.股外侧

D.上臂外侧

42.下列不是低分子肝素注射禁忌症的是（） [单项选择题] *

A 严重的凝血障碍

B 活动性消化道溃疡或有出血倾向的器官损伤

C 深静脉血栓(对的答案)

D 脑出血性疾病

43.低分子肝素皮下注射进针角度（） [单项选择题] *

A .15-20°

B. 5-15°

C.垂直(对的答案)

D. 30°

E.30°-40°

44.静脉血栓最常使用的溶栓药物是（） [单项选择题] *

A.华法林

B.重组链激酶

C.利伐沙班

D.尿激酶(对的答案)

45.静脉血栓最常使用的腔内治疗溶栓措施是（） [单项选择题] *

A.经皮血管腔内成形术

B.经皮机械血栓清除术

C.腔静脉滤器植入术

D.经导管接触溶栓(对的答案)

46.有关 VTE 的有关概念对的是:（） [单项选择题] *

A、血栓脱落形成栓子阻塞肺静脉引起的一组疾病或临床综合征

B、腓肠肌压迫试验体现为阴性

C、VTE 体格检查是霍曼氏征(Homans)试验体现为阴性

D、血液在静脉内不正常地凝结，使血管完全或不完阻塞，是一种静脉回流障碍性疾病。(对的答案)

47.Homans 征阳性是指：（） [单项选择题] *

A.足向背屈使腓肠肌紧张时可激发疼痛(对的答案)

B.足向背伸使腓肠肌紧张时可激发疼痛

C.浅静脉曲张

D.股青肿

48.VTE 指（） [单项选择题] *

A 血栓后综合征

B 深静脉血栓形成

C 肺血栓栓塞症

D 静脉血栓栓塞症(对的答案)

49.PTE 引起肺梗死时，临床上可出现(肺梗死三联征),包括（） [单项选择题] *

A.胸痛、咯血、呼吸困难(对的答案)

B.胸闷、咯血、呼吸困难

C.胸痛、胸闷、呼吸困难

D.胸痛、心悸、呼吸困难

50VTE 风险评估由谁实行（） [单项选择题] *

A.护士长

B.科主任

C.经治医师和责任护士(对的答案)

D.VTE 防控小组

51.对于血栓风险极低危患者(Caprini 血栓风险评估模型分值为 0 分)，提议采用

（） [单项选择题] *

A.基础防止(对的答案)

B.物理防止

C.基础防止联合药物防止

D.药物防止

52.对于血栓风险低危患者(Caprini 血栓风险评估模型分值为 1-2 分)，提议采用（）

[单项选择题] *

A.基础防止(对的答案)

B.物理防止

C.基础防止联合药物防止

D.药物防止

53.对于血栓风险中危患者(Caprini 血栓风险评估模型分值为 3-4 分)，提议采用（）

[单项选择题] *

A.基础防止

B.物理防止

C.基础防止联合物理防止(对的答案)

D.药物防止

54.（）是 VTE 最基本的防止方式。 [单项选择题] *

A.基础防止(对的答案)

B.物理防止

C.基础防止联合物理防止或药物防止

D.药物防止

55.踝泵运动的措施是：患者取平卧或坐位，先尽量最大角度的向上勾脚(足背屈)，使脚尖朝向自己，保持()秒，后用力绷脚(足背伸)，脚尖竭力向前踩，在最大位置保持()秒（） [单项选择题] *

A.10s,15s

B.15s,10s

C.10s,10s(对的答案)

D.5s,10s

56.正常成人每日所需的水分为（）ml. [单项选择题] *

A.2023-2500ml(对的答案)

B.1500-2023ml

C.1000-1500ml

D.2023-3000ml

57.有关研究显示，吸烟可导致（）构造发生变化，从而增进血栓形成。 [单项选择题] *

A.血管上皮细胞

B.血管内皮细胞

C.血管壁(对的答案)

D.血管腔

58.防止深静脉血栓，应指导患者进食（）饮食。 [单项选择题] *

A.低盐、低脂、高蛋白饮食

B.低盐、低脂、低胆固醇、高维生素饮食(对的答案)

C.低盐、低胆固醇、高蛋白饮食

D.低脂、高蛋白、高维生素饮食

59.抗血栓袜是压力 I 级的梯度压力袜，脚踝水平的压力提议在（）。 [单项选择题]

*

A.15-21mmHg(对的答案)

B.10-20mmHg

C.10-15mmHg

D.12-15mmHg

60.间歇充气加压是目前临床上常用的 DVT 物理防止措施，一般调整压力为（）

[单项选择题] *

A.30-35mmHg

B.35-40mmHg(对的答案)

C.25-35mmHg

D.30-40mmHg

61.下面抗凝药物中，属于凝血酶间接克制剂的是（） [单项选择题] *

A.低分子肝素(对的答案)

B.阿加曲班

C.利伐沙班

D.达比加群酯

62.()是确诊 DVT 的首选措施。（） [单项选择题] *

A.血浆 D-二聚体

B.彩色多普勒超声(对的答案)

D-二聚体 B.彩色多普勒超声

D-二聚体 B.彩色多普勒超声 C.CT 静脉成像 D.静脉造影

63.有关静脉血栓的护理，如下说法不对的的是（） [单项选择题] *

A.急性期患者应绝对卧床休息

B.防止剧烈翻身

C.防止热敷

D.按摩肿胀肢体(对的答案)

64.使用抗凝药物治疗静脉血栓时，静脉输液或静脉采血结束后按压时间应延长至

（） [单项选择题] *

A.5min

B.15min

C.10min(对的答案)

D.20min

65.腔内治疗静脉血栓术后，指导患者术侧肢体制动（） [单项选择题] *

A.4-6h

B.2-4h

C.6-12h(对的答案)

D.6-8h

66.VTE 、DVT、 PE 三者的关系对的的是（） [单项选择题] *

A.VTE=DVT+PE(对的答案)

B.VTE+DVT=PE

C.VTE+PE=DVT

D.VTE=PE=DVT

67.经导管接触溶栓治疗中最常见的并发症是（） [单项选择题] *

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/728066074033006023