

系统复习资料汇编

考试复习重点推荐资料

百炼成金模拟考试汇编

阶段复习重点难点梳理

适应性全真模拟考试卷

考前高效率过关手册集

高效率刷题好资料分享

学霸上岸重点笔记总结

注：下载前请仔细阅读资料，以实际预览内容为准

2020 年外科主治医师考试——《专业实践能力》试卷及答案解析

一、A3/A4

1. 患者，男性，29 岁。腹痛伴呕吐 5 小时入院；患者于晚餐后感上腹部不适，自服吗丁啉未能缓解，随后逐渐出现腹痛，痛感不强可以忍受；期间呕吐一次为胃内容物；于凌晨 1 点腹痛加重，并转移至脐部遂来就诊，门诊以急性阑尾炎收住入院。

1) 患者急性阑尾炎最可能的病因，你能想到的是

- A. 阑尾管腔阻塞
- B. 细菌侵袭
- C. 阑尾扭曲
- D. 阑尾官腔细小
- E. 阑尾血运不佳

【正确答案】 A

【答案解析】 急性阑尾炎最常见的病因是阑尾管腔阻塞，多是淋巴滤泡明显增生（约占 60%）所致，多见于年轻人。其余肠结石占 35%，异物、炎性狭窄、蛔虫等是少见阻塞病因。

2) 体检时，患者 obturator 征阳性，提示

- A. 阑尾靠近闭孔内肌
- B. 阑尾位于腰大肌前方
- C. 阑尾形成周围脓肿
- D. 阑尾靠近直肠右前方
- E. 阑尾已穿孔

【正确答案】 A

【答案解析】 obturator 征即闭孔内肌试验，病人仰卧位，使右髋和右大腿屈曲，然后被动向内旋转，引起右下腹疼痛为阳性，提示阑尾靠近闭孔内肌。

3) 若患者行阑尾切除术，术中发现阑尾尖端粘连固定，应

- A. 先根部结扎切断

- B. 先分离粘连端
- C. 先结扎系膜
- D. 先夹闭血管
- E. 先将盲肠内翻

【正确答案】 A

【答案解析】 阑尾尖端粘连固定，不能按常规方法切除阑尾，可先将阑尾于根部结扎切断，残端处理后，再分离阑尾系膜，最后分离切除整个阑尾，此为逆行切除法。

4) 助手切断阑尾时，上级医师嘱咐残端保留不要超过 1cm，其主要目的是

- A. 防止结扎线松脱
- B. 防止粘连
- C. 防止梗阻
- D. 防止炎症复发
- E. 防止形成瘘道

【正确答案】 D

【答案解析】 阑尾切除术后亦形成多种并发症，其中阑尾残株炎，多是因为阑尾残端保留过长超过 1cm 时或有结石残留，术后残株可炎症复发，仍表现为阑尾炎的症状。

2.女，30 岁。便秘 2 年，近半月来大便时肛门疼痛，呈刀割样，便时可见到血迹，便后疼痛可缓解。

1) 其诊断最可能是

- A. 内痔
- B. 外痔
- C. 直肠癌
- D. 肛瘘
- E. 肛裂

【正确答案】 E

【答案解析】 据疼痛、便秘和出血可诊断肛裂。肛裂的疼痛特点具有周期性，排便时可感到烧灼样或刀割样疼痛，便后数分钟可缓解，称为间歇期；随后因肛门括约肌收缩痉挛再次剧痛，此期持续半到数小时临床称为括约肌挛缩痛。直到括约肌疲劳、松弛后疼痛缓解，但再次排便又发生疼痛，以上特点称为肛裂疼痛周期。

2) 其病变常发生在肛管的

- A. 前正中位
- B. 后正中位
- C. 左侧
- D. 右前位
- E. 右后位

【正确答案】 B

【答案解析】 肛裂是齿状线以下肛管皮肤层裂伤后的小溃疡，经久不愈。呈梭形或椭圆形常引起剧痛，愈合困难。肛裂常发于肛门后、前正中，以肛门后部居多，两侧的较少。

解剖学因素：肛门外括约肌浅部，从尾骨起，向前至肛门后方。分为两束，沿肛管两侧向前围绕，至肛门前方，又相互联合。因此，在肛门前后都留有间隙。并且肛提肌的大部分均附着于肛管两侧，前后较少。可见，肛门前、后方不如两侧牢固，容易受损伤。并且向下、向后与直肠形成一近 90° 的角。因此，肛门后部受粪便压迫较重，又因肛管后部血液循环不足，弹性较差，肛门腺分布又较多，这些都是发生肛裂的因素。

感染学说：主要是肛门后部的肛隐窝感染，炎症向肛管皮下部蔓延，致使皮下脓肿破溃而成肛裂。

3) 本病的疼痛的特点正确的是

- A. 疼痛为隐痛
- B. 排便前出现括约肌挛缩痛
- C. 排便后出现肛门隐痛可延续到数小时

D. 排便时与排便后疼痛之间有间歇期

E. 疼痛无规律

【正确答案】 D

【答案解析】 肛裂的临床症状表现为疼痛和出血。肛裂常发于肛门后、前正中，以肛门后部居多，两侧的较少。初起仅在肛管皮肤上有一小裂口，有时可裂到皮下组织或直至括约肌浅层，裂口呈线形或菱形，如将肛门张开，裂口的创面即成圆形或椭圆形。其痛很有特点，即先于排便时突发刀割样疼痛（由于粪便划破肛管皮肤所致），然后短暂缓解，继而出现长时间肛痛（由于肛门括约肌受刺激后产生痉挛所致）。临床常见患者因怕痛畏惧排便，出现“怕痛----忍便----便干----更痛”的恶性循环现象。肛裂引起的出血也因撕裂血管的程度或多或少，常见因肛裂长期或大量出血而至贫血的病例。

3.男性，42 岁。便秘 2 年余，1 周前排便时出现肛门烧灼样痛，便后可缓解，之后又可再次出现疼痛，便纸上可见少量血迹。

1) 其最可能的诊断为

A. 痔

B. 肛痿

C. 肛裂

D. 肛周脓肿

E. 直肠癌

【正确答案】 C

【答案解析】 肛裂是齿线以下肛管皮肤层小溃疡。其方向与肛管纵轴平行，呈梭形或椭圆形，常因排便引起周期性剧痛，愈合困难。

2) 此病人当前应行的治疗手段不包括

A. 温水坐浴

B. 口服液态石蜡

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/728106041027006075>