

2024 河北省平山县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库带答案（巩固）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 多黏菌素 B 的抗菌机制是

- A: 影响胞浆膜的通透性
- B: 抑制蛋白质合成的全过程
- C: 抑制细菌细胞壁的合成
- D: 影响叶酸代谢

答案：A

2. 治疗侵袭性曲霉菌病首选()

- A: 氟胞嘧啶
- B: 灰黄霉素
- C: 伏立康唑
- D: 氟康唑

答案：C

3. 毛果芸香碱的作用特点不包括

- A: 术后以抵消睫状肌麻痹剂或散瞳药的作用
- B: 减少房水生成
- C: 用于白内障人工晶状体植入手术中缩瞳
- D: 收防止激光手术后的反应性眼压升高

答案：B

4. (2021 年真题) 促进尿酸排泄的抗痛风药物是 ()

- A: 秋水仙碱
- B: 双氯芬酸
- C: 苯溴马隆
- D: 双醋瑞因

答案: C

5. 关于达比加群酯的描述，错误的是

- A: 胺碘酮可使达比加群酯血浆浓度提高 50%
- B: 与阿司匹林联用不会增加出血风险
- C: 应用期间不能口服奎尼丁类药物
- D: 用药期间应监测凝血功能、肝功能

答案: B

6. 大剂量可导致 Q-Tc 间期延长的是

- A: 多潘立酮
- B: 西沙必利
- C: 莫沙必利
- D: 甲氧氯普胺

答案: B

7. 老年人对苯二氮 (𠂇卓) 类药较为敏感，用药后可致平衡功能失调，觉醒后可发生步履蹒跚、思维迟缓等症状，在临床上称为

- A: 老年期痴呆
- B: 戒断综合征
- C: 震颤麻痹综合征
- D: “宿醉”现象

答案: D

8. (2016 年真题) 华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是

- A: 维生素 B2
- B: 依诺肝素
- C: 维生素 B1
- D: 维生素 B12

答案：B

9. 与长春新碱合用可增强神经毒性

- A: 替尼泊苷
- B: 非格司亭
- C: 异烟肼
- D: 铂类

答案：A

10. 以下哪项不是糖皮质激素的不良反应

- A: 电解质紊乱
- B: 诱发癫痫
- C: 伤口愈合缓慢
- D: 心律失常

答案：D

11. 口服首过消除明显，常舌下给药的是

- A: 胍乙啶
- B: 普萘洛尔
- C: 阿昔莫司
- D: 硝酸甘油

答案：D

12. 作用机制是有丝分裂抑制剂的是

- A: 巯嘌呤
- B: 紫杉醇
- C: 吉非替尼
- D: 枸橼酸他莫昔芬

答案：B

13. 顺铂作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗

- A: 慢性淋巴细胞性白血病
- B: 非小细胞肺癌
- C: 纤维瘤
- D: 恶性淋巴瘤

答案：B

14. 用于单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的 2 型糖尿病的降糖药物是

- A: 格列本脲
- B: 二甲双胍
- C: 罗格列酮
- D: 阿卡波糖

答案：B

15. 属于胰岛素增敏剂的是

- A: 艾塞那肽
- B: 阿卡波糖
- C: 瑞格列奈
- D: 罗格列酮

答案：D

16. 加重洋地黄中毒的易感因素为

- A: 伴有房颤的心功能不全
- B: 低钾血症
- C: 甲状腺功能减退症
- D: 低镁血症

答案：C

17. 防治血栓性疾病如心肌梗死、脑梗死的药物是()

- A: 维生素 K
- B: 非格司亭
- C: 氨甲环酸
- D: 香豆素类

答案：D

18. 恶性贫血可选用

- A: 肝素
- B: 维生素 K
- C: 维生素 B
- D: 香豆素类

答案：C

19. 可以引起低钾血症和低镁血症，增加洋地黄中毒危险的是

- A: 克拉霉素
- B: 胺碘酮
- C: 硫酸镁
- D: 呋塞米

答案：D

20. 与脊髓上水平的中枢镇痛、欣快感和依赖性有关的受体

- A: K 受体
- B: $\mu 2$ 受体
- C: $\mu 1$ 受体
- D: δ 受体

答案：C

21. (2017 年真题) 可以引起耳蜗神经、肾损害的药物是 ()

- A: 多西环素
- B: 甲矾霉素
- C: 加替沙星
- D: 庆大霉素

答案：D

22. 复方左炔诺孕酮片、复方孕二烯酮片均含有的成份是

- A: 炔雌醇
- B: 去氧孕烯
- C: 雌二醇
- D: 维生素 B6

答案：A

23. 需要皮下注射的糖尿病治疗药物是

- A: 艾塞那肽
- B: 那格列奈
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

答案：A

24. 以多酶或辅酶形式参与体内新陈代谢及重要的生化反应的是

- A: 葡萄糖
- B: 维生素
- C: 果糖
- D: 脂肪乳

答案：B

25. 糖尿病合并轻度肾功能不全患者宜选用

- A: 二甲双胍
- B: 格列喹酮
- C: 普通胰岛素
- D: 低精蛋白锌胰岛素

答案：B

26. 阿米卡星与万古霉素合用()

- A: 不良反应叠加
- B: 药理作用拮抗
- C: 后者血药浓度下降，药效降低
- D: 后者血药浓度升高，不良反应增加

答案：A

27. 抑制 Na

- A: 呋塞米
- B: 氢氯噻嗪
- C: 乙酰唑胺
- D: 氨苯蝶啶

答案：B

28. 同用可抵消降钙素对高钙血症疗效的是

A: 双膦酸盐类骨吸收抑制剂

B: 钙剂

C: 维生素 D

D: 铁剂

答案：C

29. (2017 年真题) 属于 DPP-4 抑制剂的药物是 ()

A: 伏格列波糖

B: 那格列奈

C: 利拉鲁肽

D: 阿格列汀

答案：D

30. 下述药物中不可用于治疗深部真菌感染的是

A: 伊曲康唑

B: 两性霉素

C: 制霉菌素

D: 灰黄霉素

答案：D

31. 患者。男，42 岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

A: 1

B: 10%~30%

C: 30%~90%

D: 大于 90%

答案: D

32. 为高分子聚合物，通过增加局部渗透压软化大便，对肠道 pH 没有影响的是

A: 开塞露

B: 乳果糖

C: 聚乙二醇 4000

D: 酚酞

答案: C

33. 用于成人非瓣性房颤患者的卒中和全身栓塞，治疗深静脉血栓形成，解救药可用艾达司珠单抗的是

A: 肝素

B: 依达肝素

C: 达比加群酯

D: 华法林

答案: C

34. (2016 年真题) 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的是

A: 阿昔莫司

B: 非诺贝特

C: 阿托伐他汀

D: 依折麦布

答案: C

35. 可使磷酸化胆碱酯酶复活的药物

A: 匹鲁卡品

- B: 碘解磷定
- C: 毒扁豆碱
- D: 阿托品

答案：B

36. 适用于各种类型疟疾的症状控制，尤其是对抗氯喹恶性及凶险型疟疾有较好疗效的药物是

- A: 乙胺嘧啶
- B: 蒿甲醚
- C: 双氢青蒿素
- D: 奎宁

答案：C

37. （2021 年真题）乙内酰脲类药物通过减少钠离子内流而使神经细胞稳定，限制 Na⁺通道介导的发作性放电的扩散，属于该类的抗癫痫药物是（）

- A: 苯妥英钠
- B: 卡马西平
- C: 左乙拉西坦
- D: 加巴喷丁

答案：A

38. 作用于 DNA 拓扑异构酶 I 的生物碱是

- A: 来曲唑
- B: 卡莫氟
- C: 甲氨蝶呤
- D: 喜树碱

答案：D

39. 哌拉西林

- A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- B: 口服，肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染
- C: 肾毒性较大
- D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

答案：D

40. 长期使用应定期检查甲状腺功能的药物是

- A: 索他洛尔
- B: 普罗帕酮
- C: 胺碘酮
- D: 利多卡因

答案：C

41. 关于阿奇霉素使用的叙述，错误的是

- A: 治疗儿童中耳炎、肺炎时，阿奇霉素首次剂量为后续剂量的 3 倍
- B: 若需服含铝或镁的抗酸药，阿奇霉素应在服用上述药物前 1 小时或后 2 小时给予
- C: 治疗儿童中耳炎、肺炎时，阿奇霉素的疗程为 5 天
- D: 阿奇霉素一天一次口服即可

答案：A

42. 作用机制是竞争雌激素受体的是

- A: 枸橼酸他莫昔芬
- B: 吉非替尼
- C: 紫杉醇
- D: 巯嘌呤

答案：A

43. 患者，女 75 岁，既往有 2 型糖尿病史 18 年，有青霉素过敏史，因车祸导致左下肢开放性骨折，术后发生骨髓炎，给予克林霉素治疗 10 余天，临床应关注的典型不良反应是

- A: 抗生素相关性腹泻
- B: 肌肉震颤
- C: 红人综合征
- D: 急性溶血性贫血

答案：A

44. 下列不属于治疗前列腺增生的药物是

- A: 西地那非
- B: 坦洛新
- C: 非那雄胺
- D: 特拉唑嗪

答案：A

45. 硝酸酯类药物舒张血管的作用机制是

- A: 产生 NO，激活鸟苷酸环化酶，使细胞内 cGMP 升高
- B: 激动血管平滑肌上的 β_2 受体，使血管扩张
- C: 抑制磷酸二酯酶
- D: 产生 NO，激活腺苷酸环化酶，使细胞内 cAMP 升高

答案：A

46. 可作为心血管不良事件一级和二级预防的药物是()

- A: 塞来昔布
- B: 对乙酰氨基酚

C: 双氯芬酸

D: 阿司匹林

答案：D

47. 有心肌梗死、脑梗死病史患者可以使用

A: 水杨酸类

B: 芳基乙酸类

C: 选择性 COX-2 抑制剂

D: 芳基丙酸类

答案：A

48. 铜绿假单胞菌感染首选的抗菌药物是()。

A: 罗红霉素

B: 头孢他啶

C: 利奈唑胺

D: 头孢曲松

答案：B

49. 作用于外周多巴胺受体，神经系统副作用罕见的是

A: 甲氧氯普胺

B: 莫沙必利

C: 西沙必利

D: 多潘立酮

答案：D

50. 治疗系统性红斑狼疮选用

A: 甲苯咪唑

B: 吡喹酮

C: 氯喹

D: 甲硝唑

答案: C

51. 司坦唑醇的禁忌证不包括

A: 严重心功能不全

B: 男性乳腺癌

C: 肾炎

D: 前列腺增生

答案: A

52. 下列不属于雌激素禁忌证的是

A: 儿童禁用

B: 乳腺癌

C: 急慢性肝功能不全

D: 生殖系统恶性肿瘤

答案: A

53. 可能引起高铁血红蛋白血症的抗高血压药是

A: 阿托普利

B: 硝普钠

C: 阿利克仑（阿利吉仑）

D: 氨氯地平

答案: B

54. 抗阿米巴原虫药的药物是()。

A: 伯氨喹

B: 奎宁

C: 氯喹

D: 甲硝唑

答案: D

55. 属于抗胆碱药的是()

A: 奥美拉唑

B: 哌仑西平

C: 氢氧化铝

D: 雷尼替丁

答案: B

56. 硝酸酯类药物舒张血管的作用机制是

A: 促进前列环素的生成

B: 直接作用于血管平滑肌

C: 阻断 β 受体

D: 释放一氧化氮

答案: D

57. 需要 1 周才起效的是

A: 氟西汀

B: 文拉法辛

C: 吡拉西坦

D: 吗氯贝胺

答案: B

58. 复方氨基酸注射液出现发热、头痛、心悸、寒战等反应，主要是因为

A: 含有过敏原

- B: 患者的个体差异
- C: 含有的氨基酸种类太多
- D: 静脉滴注速度过快

答案：D

59. 喷托维林为中枢性镇咳药。

- A: 氨溴索
- B: 喷托维林
- C: 沙丁胺醇
- D: 噻托溴铵

答案：B

60. (2016 年真题) 属于 α_1 受体阻断剂的抗良性前列腺增生症的药品是

- A: 酚妥拉明
- B: 度他雄胺
- C: 普适秦
- D: 特拉唑嗪

答案：D

61. 服用时必须坐位或立位、空腹、服后 30 分钟内不宜进食和卧床的药品是

- A: 依普黄酮
- B: 依降钙素
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 雷洛昔芬

答案：C

62. 氯霉素与剂量和疗程无关的严重不良反应是()

- A: 可逆的性骨髓抑制
- B: 二重感染
- C: 灰婴综合征
- D: 严重的再生障碍性贫血

答案: D

63. 下述药物中属于鼻腔减充血剂的是

- A: 色甘酸钠溶剂
- B: 链霉素溶剂
- C: 盐酸麻黄碱溶剂
- D: 布地奈德气雾剂

答案: C

64. 可作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌和肠杆菌作用的药物是

- A: 亚胺培南
- B: 氨曲南
- C: 克拉维酸
- D: 阿莫西林

答案: B

65. 氯沙坦的降压作用机制是()

- A: 阻断 α 受体
- B: 阻断 AT
- C: 阻断 β 受体
- D: 阻断 AT

答案: D

66. 口服用于肠道感染或肠道手术前准备的药物是

- A: 新霉素
- B: 妥布霉素
- C: 庆大霉素
- D: 异烟肼

答案：C

67. 引起妇女面部和躯体的多毛症，男性若长期应用，可表现为男子女性乳房的是()

- A: 特拉唑嗪
- B: 十一酸睾酮
- C: 非那雄胺
- D: 普适泰

答案：B

68. 神经毒性是剂量依赖性的是()

- A: 亚叶酸钙
- B: 顺铂
- C: 卡铂
- D: 奥沙利铂

答案：D

69. 可用于骨和关节感染的药物是()

- A: 青霉素
- B: 万古霉素
- C: 四环素
- D: 林可霉素

答案：D

70. 适用于治疗精神分裂症、躁狂症的药物是

- A: 氯氮平
- B: 阿立哌唑
- C: 利培酮
- D: 碳酸锂

答案：A

71. 关于达比加群酯的描述，错误的是

- A: 与阿司匹林联用不会增加出血风险
- B: 为直接凝血酶的抑制剂
- C: 用药期间应监测凝血功能、肝功能
- D: 长期口服安全性较好

答案：A

72. （2018 年真题）具有强大的抗凝血因子 Xa 功能及微弱的抗凝血酶作用，可用于预防深静脉血栓形成的药物是（）

- A: 华法林
- B: 那屈肝素钙
- C: 阿加曲班
- D: 尿激酶

答案：B

73. 糖尿病酮症酸中毒患者宜选用

- A: 正规胰岛素
- B: 珠蛋白锌胰岛素
- C: 格列喹酮

D: 二甲双胍

答案：A

74. 可使洋地黄化时发生心脏传导阻滞，尤其是同时静脉注射钙盐时，该药物是

A: 克拉霉素

B: 硫酸镁

C: 胺碘酮

D: 呋塞米

答案：B

75. 吡嗪酰胺联用丙磺舒使

A: 月经不规则

B: 吸收减少

C: 肝毒性增加

D: 疗效减弱

答案：D

76. 通过与敏感需氧革兰阴性菌细胞膜上 PBP3 的高度亲合而发挥杀菌作用，仅对需氧革兰阴性菌包括铜绿假单胞菌具有良好抗菌活性，对革兰阳性菌和厌氧菌作用差的是

A: 头孢他啶

B: 头孢美唑

C: 头孢噻肟

D: 氨曲南

答案：D

77. 卡替洛尔的副作用不包括

- A: 结膜充血
- B: 可产生暗黑感
- C: 眼底黄斑部水肿
- D: 近视化倾向

答案：A

78. 有机磷酸酯中毒的解救宜选用

- A: 阿托品
- B: 纳洛酮
- C: 多潘立酮
- D: 鱼精蛋白

答案：A

79. 罗格列酮的降糖作用机制是

- A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- B: 直接补充胰岛素
- C: 提高靶组织对胰岛素的敏感性
- D: 竞争性抑制 α 葡萄糖苷酶

答案：C

80. 调节酸平衡药中，临床上最常用的碱性药是()

- A: 碳酸氢钠
- B: 乳酸钠
- C: 氯化铵
- D: 氯化钠

答案：A

81. 鲑降钙素对骨质疏松症进行治疗期间，为防继发性甲状旁腺功能亢进需要补充

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 钙剂
- C: 维生素 D
- D: 铁剂

答案：B

82. 通过阻断血管紧张素 II 受体而逆转心肌肥厚，减轻心力衰竭的药物是

- A: 氯沙坦
- B: 氨力农
- C: 地高辛
- D: 美托洛尔

答案：A

83. 茶碱浓度 15-20ug/ml 时可出现

- A: 心动过速、心律失常
- B: 恶心、呕吐、失眠
- C: 为有效的治疗浓度
- D: 呼吸、心跳停止

答案：B

84. 主要用于解热镇痛，但几乎没有抗炎作用的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 吲哚美辛
- D: 塞来昔布

答案：B

85. 下列硝酸酯类药物起效最快的是

- A: 戊四醇酯
- B: 硝酸甘油
- C: 硝酸异山梨酯
- D: 单硝酸异山梨酯

答案：B

86. 1~5 岁儿童甲状腺功能减退症，左甲状腺素每日完全替代剂量为

- A: 25 μg
- B: 5 $\mu\text{g} / \text{kg}$
- C: 4 $\mu\text{g} / \text{kg}$
- D: 6 $\mu\text{g} / \text{kg}$

答案：B

87. 可用于治疗重度痤疮，但妊娠期妇女避免使用的药物是

- A: 异维 A 酸
- B: 特比萘芬
- C: 克罗米通
- D: 克拉霉素

答案：A

88. 促消化的药物应()

- A: 空腹内服
- B: 睡前内服
- C: 定时内服

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 饭前内服

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/728122132042007022>