

2024 年山西省大宁县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题内部题库带答案（综合卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 头孢唑林()

- A: 用于非典型致病原感染
- B: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于脑膜炎
- C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注
- D: 肾毒性较大

答案：D

2. 乳酶生是

- A: 抗酸药
- B: 生乳剂
- C: 胃肠解痉药
- D: 干燥活乳酸杆菌制剂

答案：D

3. 关于他扎罗汀治疗银屑病的叙述，错误的是

- A: 育龄期妇女用药前 2 周，应进行血清或尿液妊娠试验
- B: 成人每晚(睡前半小时)1 次，一般 12 周，使用面积应不超过 20% 体表面积
- C: 对严重的银屑病效果显著
- D: 不用于 18 岁以下银屑病患者

答案：C

4. 能松弛前列腺和膀胱括约肌，很少发生低血压的抗前列腺增生症药为

- A: 乙酰唑胺
- B: 特拉唑嗪
- C: 酚苄明
- D: 坦洛新

答案：D

5. (2018 年真题) 配制静脉输液时;应先用灭菌注射用水溶解,然后用 5%葡萄糖注射液稀释,不可用氯化钠注射液稀释的抗真菌药是 ()

- A: 伏立康唑
- B: 卡泊芬净
- C: 氟康唑
- D: 两性霉素 B

答案：D

6. 用于单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的 2 型糖尿病的降糖药物是

- A: 格列本脲
- B: 二甲双胍
- C: 阿卡波糖
- D: 罗格列酮

答案：B

7. 镇痛药合理用药原则不包括

- A: 尽可能选择口服给药
- B: 用药剂量个体化，根据患者需要由小剂量开始，逐渐加大剂量
- C: 按阶梯给药，对于轻度疼痛患者首选弱阿片类药物

D: 按时给药，而不是按需给药

答案：C

8. (2018 年真题) 在体内不经细胞色素 P450 酶代谢的药物是 ()

A: 氟伐他汀

B: 阿托伐他汀

C: 瑞舒伐他汀

D: 普伐他汀

答案：D

9. 与西地那非合用，可导致严重低血压的药品是

A: 甲睾酮

B: 非那雄胺

C: 丙酸睾酮

D: 硝酸甘油

答案：D

10. 袢利尿药可增强强心苷对心脏的毒性，这是因为袢利尿药可以造成

A: 低钾血症

B: 低钠血症

C: 低血压

D: 低镁血症

答案：A

11. 利福平联用伏立康唑使

A: 月经不规则

B: 疗效减弱

C: 肝毒性增加

D: 吸收减少

答案：B

12. 恶性贫血可选用

A: 香豆素类

B: 肝素

C: 维生素 K

D: 维生素 B

答案：D

13. 属于合成的麻醉性镇痛药的是

A: 布洛芬

B: 可待因

C: 吗啡

D: 美沙酮

答案：D

14. (2021 年真题) 作为大手术、外伤或脓毒血症引起的严重肾功能衰竭以及急慢性肾功能衰竭患者肠外营养支持的药物是 ()

A: 赖氨酸注射液

B: 复方氨基酸注射液 (9AA)

C: 复方氨基酸注射液 (18AA)

D: 丙氨酰谷氨酰胺注射液

答案：B

15. 患者，女，46 岁。以"口角歪斜 3 天"之主诉入院。3 天前洗澡冲凉后次日晨起刷牙时发现右口角漏水，右侧闭眼不紧，口角歪斜，伴右眼流泪。查体：大致正常。诊断：面神经麻痹(右侧)。医嘱：

A: 1 次/日，午后 14 时给药

B: 3 次/日

C: 1 次/日，上午 8 时给药

D: 夜间给药

答案：C

16. 患者，男，70 岁。进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示胃多发性溃疡(A

A: 美托洛尔

B: 胶体果胶铋胶囊

C: 替米沙坦

D: 埃索美拉唑钠

答案：B

17. 属于治疗中枢性尿崩症用药的是

A: 左甲状腺素

B: 生长抑素

C: 醋酸去氨加压素

D: 甲巯咪唑

答案：C

18. 镇静催眠药佐匹克隆的禁忌证是（）

A: 低蛋白血症

B: 糖尿病

C: 癫痫

D: 重症肌无力

答案：D

19. 硫脲类药物用于

- A: 甲亢
- B: 糖尿病
- C: 高血压
- D: 精神病

答案：A

20. 可引起胃肠道出血的是()

- A: 氨苯蝶啶
- B: 呋塞米
- C: 氢氯噻嗪
- D: 螺内酯

答案：B

21. 属于 P-糖蛋白的底物，提高辛伐他汀发生横纹肌溶解危险性的是

- A: 红霉素
- B: 利福平
- C: 地高辛
- D: 烟酸

答案：C

22. 通过抑制 5-HT 和去甲肾上腺素 (NA) 再摄取，增加突触间隙 5-HT 和 NA 浓度从而增强中枢 5-HT 和 NA 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 阿米替林
- B: 吗氯贝胺
- C: 舍曲林
- D: 度洛西汀

答案：D

23. 下列哪种药物能抑制尿酸生成的是

- A: 丙磺舒
- B: 呋塞米
- C: 别嘌醇
- D: 秋水仙碱

答案：C

24. 对耐药金黄色葡萄球菌感染有效的 β -内酰胺类抗生素是()

- A: 喹诺酮类
- B: 甲硝唑
- C: 苯唑西林
- D: 四环素

答案：C

25. 假膜性肠炎或食物中毒应首选的微生物制剂是()

- A: 双歧三联活菌
- B: 枯草杆菌
- C: 粪肠球菌
- D: 酪酸菌

答案：D

26. (2015 年真题) 属于糖皮质激素禁忌症的是 ()。

- A: 过敏性皮炎
- B: 再生障碍性贫血
- C: 严重高血压
- D: 类风湿性关节炎

答案：C

27. (2021 年真题) 属于乙酰胆碱酯酶抑制剂，用于改善脑功能及抗记忆障碍的药物 ()

- A: 尼莫地平
- B: 吡拉西坦
- C: 多奈哌齐
- D: 依达拉奉

答案：C

28. 抑制磷酸二酯酶，增加细胞内的 cAMP 含量，缓解慢性心力衰竭症状 ()

- A: 地高辛
- B: 氨力农
- C: 多巴酚丁胺
- D: 硝普钠

答案：B

29. 下列关于 5 α 还原酶抑制剂的描述，错误的是

- A: 可以缩小前列腺体积
- B: 是有性生活要求的患者治疗 BPH 的一线用药的
- C: 与 $\alpha 1$ 受体阻断剂相比，更易引起性功能障碍
- D: 对膀胱颈和平滑肌没有作用

答案：B

30. 羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂简称为他汀类药，其与羟甲基戊二酰辅酶 A 的结构相似，且对羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶（HMG—CoA 还原酶）的亲合力更大，对该酶产生竞争性的抑制作用，结果使血总胆固醇（TC）、低密度脂蛋白（LDL）和载脂蛋白（Apo）B 水平降低，对动脉粥样硬化和冠心病的防治产生作用。

- A: 40mg 氟伐他汀，每日 1 次
- B: 40mg 洛伐他汀，每日 1 次
- C: 10mg 阿托伐他汀钙，每日 1 次
- D: 20mg 瑞舒伐他汀，每日 1 次

答案：C

31. （2018 年真题）对磺胺类药物过敏者可以选用的利尿剂是（）

- A: 依他尼酸
- B: 乙酰唑胺
- C: 布美他尼
- D: 依托塞米

答案：A

32. 通过改变虫体肌细胞膜的离子通透性发挥驱虫作用，适用于儿童，常见制剂为宝塔糖的药品是

- A: 氯喹
- B: 哌嗪
- C: 噻嘧啶
- D: 青蒿素

答案：B

33. 唯一被批准用于临床的选择性肝固醇吸收抑制剂是（）

- A: 依折麦布

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 小剂量氟伐他汀
- C: 大剂量阿托伐他汀
- D: 小剂量阿托伐他汀

答案：A

34. 大环内酯类药的主要作用靶点是

- A: 核糖体的 30S 亚基
- B: 细胞内膜 PBP
- C: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- D: 核糖体的 50S 亚基

答案：D

35. 法莫替丁可用于治疗

- A: 心肌梗死
- B: 十二指肠溃疡
- C: 十二指肠穿孔
- D: 急慢性胃炎

答案：B

36. (2019 年真题) 患者，女，63 岁，因心绞痛急诊就医，诊断为 ST 段抬高心肌梗死，血压 175/95mmHg，心率 110 次/分，该患者适宜使用的药物是 ()

- A: 贝那普利
- B: 硝普钠
- C: 美托洛尔
- D: 氨氯地平

答案：C

37. 下列关于抗酸剂的描述，正确的是 ()

- A: 常用抗酸剂缓解非甾体抗炎药相关症状及预防溃疡发生
- B: 碳酸氢钠是非吸收性抗酸剂

C: 氢氧化铝能直接中和胃酸，并被胃肠道吸收

D: 抗酸剂可直接中和胃酸，升高胃内容物 pH

答案：D

38. (2016 年真题) 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的是

A: 阿托伐他汀

B: 阿昔莫司

C: 依折麦布

D: 非诺贝特

答案：A

39. 血浆蛋白结合率低，易透过血脑屏障用于治疗流行性脑脊髓膜炎的药物是()

A: 磺胺多辛

B: 甲氧苄啶

C: 复方新诺明

D: 磺胺嘧啶

答案：D

40. (2018 年真题) 阿哌沙班属于 ()

A: 凝血因子 X 抑制剂

B: 环氧酶抑制剂

C: 维生素 K 拮抗剂

D: 直接凝血酶抑制剂

答案：A

41. 下列药物中不属于降压药的是()

A: 肼屈嗪

B: 左旋多巴

C: 阿利克仑

D: 利血平

答案: B

42. 对肝素的正确描述是

A: 仅在体内有抗凝作用

B: 可以口服给药

C: 直接抑制凝血因子的活化

D: 可抑制血小板聚集

答案: C

43. 阿斯综合征患者禁用

A: 氨己烯酸

B: 卡马西平

C: 苯妥英钠

D: 丙戊酸钠

答案: C

44. 可导致坏死性结肠炎的是

A: 甲氨蝶呤

B: β 受体阻断剂

C: 阿糖胞苷

D: 利福平

答案: C

45. 治疗敏感菌所致成人伤寒、副伤寒的应选药物是()

A: 氯霉素

- B: 磺胺嘧啶
- C: 左氧氟沙星
- D: 呋喃妥因

答案：C

46. 下述药物中长期使用易产生耐受性的药物是

- A: β
- B: 磷酸二酯酶抑制剂
- C: M 受体拮抗剂
- D: 白三烯受体阻断剂

答案：A

47. 鲑降钙素对骨质疏松症进行治疗期间，为防继发性甲状旁腺功能亢进需要补充

- A: 维生素 D
- B: 双膦酸盐类骨吸收抑制剂
- C: 铁剂
- D: 钙剂

答案：D

48. 慢性外耳道炎时局部滴用，促使耳道干燥，可选用()

- A: 3%硼酸乙醇
- B: 赛洛唑啉
- C: 伪麻黄碱
- D: 2%酚甘油

答案：A

49. 硝酸酯类药物舒张血管的作用机制是

- A: 促进前列环素的生成
- B: 直接作用于血管平滑肌
- C: 阻断 β 受体
- D: 释放一氧化氮

答案：D

50. 硝酸酯类药物舒张血管的作用机制是

- A: 抑制磷酸二酯酶
- B: 产生 NO，激活腺苷酸环化酶，使细胞内 cAMP 升高
- C: 激动血管平滑肌上的 β_2 受体，使血管扩张
- D: 产生 NO，激活鸟苷酸环化酶，使细胞内 cGMP 升高

答案：D

51. 仅适用于少数敏感菌，衣原体属，立克次体等不典型病原体所致感染的药物是

- A: 阿奇霉素
- B: 甲硝唑
- C: 四环素
- D: 链霉素

答案：C

52. 分泌盐皮质激素的是

- A: 球状带
- B: 网状带
- C: 束状带和网状带
- D: 束状带

答案：A

53. 可用于肝硬化腹水以及加速某些毒物排泄的药物是

- A: 乙酰唑胺
- B: 托拉塞米
- C: 氨苯蝶啶
- D: 氢氯噻嗪

答案：B

54. 属于前药，在肝脏水解为阿昔洛韦，生物利用度比阿昔洛韦高 3~4 . 5 倍的抗病毒药物是

- A: 奥司他韦
- B: 伐昔洛韦
- C: 阿糖腺苷
- D: 干扰素

答案：B

55. 具有阿片样作用，长期大量服用可产生欣快感，并可能出现药物依赖性的止泻药是()

- A: 乳果糖
- B: 洛哌丁胺
- C: 地芬诺酯
- D: 蒙脱石散

答案：C

56. 与林可霉素类抗菌药物存在交叉耐药性的是

- A: 四环素类
- B: 氨基糖苷类
- C: 头孢菌素类
- D: 大环内酯类

答案：D

57. (2016 年真题) 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

- A: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖
- B: 若出现低血糖反应，应立即饮用蔗糖水
- C: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀
- D: 服药过程中适当补充维生素 B12

答案：B

58. 与吗啡合用可发生严重的、甚至致死的不良反应，包括躁狂、多汗、僵直、呼吸抑制、昏迷、惊厥和高热的药物是

- A: 氯硝西洋
- B: 苯巴比妥
- C: 吗氯贝胺
- D: 丙戊酸钠

答案：C

59. (2018 年真题) 碳酸钙用于肾衰竭患者降低血磷时，适宜的服药时间是 ()

- A: 餐中
- B: 餐后 2h
- C: 清晨或睡前
- D: 餐前即刻

答案：A

60. 应用磺酰脲类降糖药治疗 5 年，患者发生继发性失效的比例是

- A: 30%~40%

B: 5%~15%

C: 50%~60%

D: 1%~5%

答案：A

61. 属于肝药酶诱导剂，与华法林合用会减弱后者抗凝作用的药物是

A: 氯苯那敏

B: 唑吡坦

C: 苯妥英钠

D: 丙戊酸钠

答案：C

62. 患者，女性，57 岁。高血压病史 20 年，伴慢性心功能不全，给予地高辛每日维持量治疗，突然出现窦性心动过缓，宜选用的治疗药物是

A: 维拉帕米

B: 苯妥英钠

C: 普萘洛尔

D: 阿托品

答案：D

63. 甲状腺功能亢进症的内科治疗选用

A: 放射性碘

B: 丙硫氧嘧啶

C: 格列齐特

D: 大剂量碘剂

答案：B

64. 患者，男，19 岁，既往有癫痫病史 2 年，长期服用苯妥英钠控制良好。1 周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4 次/日。

- A: 雷尼替丁
- B: 氢氧化铝
- C: 泮托拉唑
- D: 复方碳酸钙

答案：C

65. 2~3 分钟起效，5 分钟达最大效应的硝酸酯类药物是

- A: 硝苯地平
- B: 哌唑嗪
- C: 硝酸甘油
- D: 普萘洛尔

答案：C

66. 治疗重度消瘦营养不良的糖尿病的是

- A: 胰岛素
- B: 二甲双胍
- C: 磺酰脲类
- D: A 和 B 均无效

答案：A

67. 羟基脲属于()

- A: 胸腺核苷合成酶抑制剂
- B: 核苷酸还原酶抑制剂

C: 二氢叶酸还原酶抑制剂

D: DNA 多聚酶抑制剂

答案: B

68. 与普通肝素相比，低分子肝素的抗凝作用特点是

A: 对凝血因子 IIa、VIIa 灭活作用强，对 Xa 作用弱

B: 对凝血因子 Xa、XIa 灭活作用强，对 IIa 作用弱

C: 对凝血因子 IIa、IXa 灭活作用强，对 Xa 作用弱

D: 对凝血因子 Xa、XIIa 灭活作用强，对 IIa 作用弱

答案: D

69. 用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染的药物是

A: 红霉素

B: 万古霉素

C: 克拉霉素

D: 克林霉素

答案: B

70. 下列治疗恶性肿瘤的药物中，对骨髓造血功能几乎没有抑制作用的是

A: 顺铂

B: 泼尼松

C: 长春碱

D: 表柔比星

答案: B

71. 可出现酮尿或乳酸性血症的药物是

A: 胰岛素皮下注射

B: 艾塞那肽

C: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

D: 二甲双胍

答案: D

72. 噻嗪类利尿药发挥抗利尿作用，是因为其可以抑制

A: Na^+-Cl^- 共转运子

B: 磷酸二酯酶

C: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子

D: 碳酸酐酶

答案: B

73. 患者，女，40 岁。癫痫病史 3 年，近来常觉头痛，测量血压为 170 / 110mmHg。

A: 氨氯地平

B: 硝苯地平

C: 维拉帕米

D: 尼莫地平

答案: D

74. 成人与头孢类并用舒巴坦最大剂量为每日

A: 1g

B: 3g

C: 2g

D: 4g

答案: D

75. 下述属于外周性多巴胺 D_2 受体阻断剂的是

- A: 西沙必利
- B: 甲氧氯普胺
- C: 多潘立酮
- D: 莫沙必利

答案：C

76. 属于 5α 受体还原酶抑制剂的抗良性前列腺增生症的药品是()。

- A: 度他雄胺
- B: 特拉唑嗪
- C: 酚妥拉明
- D: 普适泰

答案：A

77. 属于一线抗结核分枝杆菌的药物是

- A: 莫西沙星、卡那霉素、卷曲霉素
- B: 异烟肼、利福平、莫西沙星
- C: 异烟肼、吡嗪酰胺、乙胺丁醇
- D: 异烟肼、阿米卡星、对氨基水杨酸

答案：C

78. 可用于烧伤及伤后感染的是()

- A: 磺胺米隆
- B: 磺胺嘧啶
- C: 磺胺甲噁唑
- D: 柳氮磺吡啶

答案：B

79. 患者，男，57 岁，身高 175cm，体重 87kg，诊断为 2 型糖尿病。医生给予二甲双胍片口服，500mg，bid。

- A: 餐后半小时
- B: 随餐服用
- C: 餐前半小时
- D: 餐后 2 小时

答案：B

80. 某患者新诊断为退行性膝关节炎，既往有磺胺过敏史，不宜选用的非甾体抗炎药是（）

- A: 吲哚美辛
- B: 塞来昔布
- C: 双氯芬酸
- D: 布洛芬

答案：B

81. （2021 年真题）患儿。女，14 岁。因出现尿频、尿急、尿痛症状 2 天就诊，诊断为急性膀胱炎，患儿既往有癫痫病史，宜选用的治疗药物是（）。

- A: 呋喃妥因
- B: 环丙沙星
- C: 青霉素 G
- D: 阿奇霉素

答案：A

82. （2019 年真题）起效缓慢，可增加心力衰竭和女性骨折风险的口服抗糖尿病药物是（）

- A: 艾塞那肽

- B: 利拉鲁肽
- C: 罗格列酮
- D: 西格列汀

答案: C

83. 在物理降温配合下，可使体温降至正常以下，用于人工冬眠疗法的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 氯丙嗪
- C: 硫喷妥钠
- D: 地西泮

答案: B

84. 属于 II 类抗心律失常药 ()

- A: 利多卡因
- B: 奎尼丁
- C: 普萘洛尔
- D: 胺碘酮

答案: C

85. 患者，女，26 岁，妊娠 3 个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是 ()。

- A: 青霉素 G
- B: 左氧氟沙星
- C: 阿莫西林
- D: 头孢氨苄

答案: B

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/735014233313012033>