

三基三严理论知识考试试题含答案

1、钩体病最常见的临床类型是()

- A、流感伤寒型感染中毒型
- B、黄疸出血型
- C、肺出血型
- D、肾衰竭型
- E、脑膜脑炎型

答案：A

2、慢性弥漫性阻塞性肺气肿最主要的症状是()

- A、咳嗽
- B、咳痰
- C、逐渐加重的呼吸困难
- D、心悸
- E、咯血

答案：C

3、肾素-血管紧张素系统活动增强时()

- A、醛固酮释放减少
- B、静脉回心血量减少
- C、体循环平均充盈压减低
- D、交感神经末梢释放递质减少
- E、肾脏排钠量减少

答案：E

4、动脉血压升高可导致()

- A、心房收缩期延长
- B、心室舒张期延长
- C、心室射血相延长
- D、等容收缩相延长
- E、心室收缩期延长

答案：D

5、早产女婴, 4 天, 因不吃不哭、下肢硬肿 2 天而于 1 月 24 日来院急诊。生后食少, 仅喂以糖水及少量母乳。体格检查: 体温不升, 反应低下, 双下肢硬肿, 皮肤呈暗红色。有关发病机制, 下列哪项不符()

- A、新生儿皮下饱和脂肪酸含量较多
- B、新生儿体温调节中枢不够完善
- C、早产儿棕色脂肪含量多, 产热储备能力差

- D、摄食不足, 机体产热少
- E、天气寒冷, 致皮下脂肪凝固

答案: C

6、肺癌最常见的组织学类型是: ()

- A、腺样囊性癌
- B、巨细胞癌
- C、鳞状细胞癌
- D、腺癌
- E、未分化癌

答案: C

7、鼻咽癌经破裂孔向颅内侵犯, 首先累及的颅神经是 ()

- A、V、VI
- B、III、IV
- C、VII、VIII
- D、IX、X、XI、XII
- E、以上都是

答案: A

8、【单选】一次性纸塑袋包装的无菌物品, 有效期宜为 () 天。

- A、30
- B、60、
- C、180
- D、90

答案: C

9、有关内镜消毒下列哪项是错误的 ()

- A、腹腔镜用环氧乙烷消毒
- B、消化内镜用 500×10 有效氯的含氯消毒剂消毒
- C、直肠镜采用高压灭菌
- D、内镜活检钳使用过频时, 采用 2%戊二醛消毒 45 分钟
- E、磷苯二甲醛消毒内镜 5 分钟可灭菌

答案: B

10、成人胸外心脏按压, 下列哪项正确 ()

- A、按压部位在胸骨下段, 剑突上 2. 5~5 cm 处
- B、按压时以使胸廓下陷 2 cm 为度
- C、应用冲击式猛压, 下压时间与放松时间比为 2:1
- D、放松时手掌根离开胸骨

E、按压频率以 30 次/min 为宜

答案：A

11、【单选】医院应对感染高风险部门的空气净化效果定期进行监测，频次为（）。

A、每周

B、每月

C、每季度

D、每年

答案：C

12、慢性肺源性心脏病肺动脉高压形成的最主要原因是（）

A、肺毛细血管血管床减少

B、肺小动脉炎

C、血液黏度增加

D、缺氧引起肺小动脉痉挛

E、血容量增加

答案：D

13、高位肠梗阻病人除腹痛外, 另一主要症状为（）

A、肛门停止排便、排气

B、腹胀明显

C、便血

D、阵发性绞痛

E、呕吐频繁

答案：E

14、扪查乳房的方法哪项不正确（）

A、扪查乳房内半侧时, 嘱病人举臂

B、扪查乳房外半侧时, 嘱病人垂臂

C、应用手指掌面循序轻轻触按乳房

D、乳房下部肿块, 采平卧位举臂触诊

E、抓捏乳房以利鉴别良、恶性肿瘤块

答案：E

15、下列哪项不属糖尿病的慢性并发症（）

A、动脉粥样硬化

B、肾脏病变

C、视网膜病

D、角膜溃疡

E、心肌病

答案：D

16、一侧瞳孔直接对光反应消失,间接光反应存在,病变在()

A、同侧动眼神经

B、对侧动眼神经

C、同侧视神经

D、对侧视神经

E、视交叉

答案：C

17、【单选】外科洗手方法要求揉搓时间要求为() ?

A、1-2 分钟

B、3-5 分钟

C、2-6 分钟

D、4-8 分钟

答案：B

18、【单选】如怀疑发生中心静脉导管相关血流感染,拔管时建议进行导管尖端培养,经导管取血培养及经() 静脉穿刺取血培养。

A、对侧

B、同侧

C、无明确要求

D、对侧、同侧皆可

答案：A

19、腰麻后头痛的主要原因是()

A、脑脊液向硬膜外腔溢出

B、穿刺点太低

C、局部麻醉药太少

D、病人的体位不当

E、术中输液过快

答案：A

20、氧在血液中运输方式主要是

A、以碳酸盐的形式

B、与血红蛋白结合

C、以上均是

D、溶解在血浆中

E、以上均不是

答案：B

21、【单选】血培养标本延迟上机的时间不能超过（）小时？

- A、2
- B、4
- C、10
- D、20

答案：D

22、【单选】消毒供应中心的工作区域不包括（）。

- A、去污区
- B、更衣室
- C、检查包装及灭菌区
- D、无菌物品存放区

答案：B

23、【单选】多重耐药菌、泛耐药菌感染或定植患者采取的隔离措施是（）。

- A、标准预防+空气隔离
- B、标准预防+飞沫隔离
- C、标准预防+接触隔离
- D、标准预防+严密隔离

答案：C

24、药物产生的副作用剂量是

- A、中毒量
- B、LD
- C、无效剂量
- D、极量
- E、治疗剂量

答案：E

25、危害行为发生率最高的精神疾病是（）

- A、精神分裂症
- B、躁狂症
- C、抑郁症
- D、反应性精神病
- E、偏执性精神病

答案：A

26、下述钾的生理功能中,哪项是错误的（）

- A、参与细胞内糖和蛋白质的代谢
- B、高钾使神经肌肉兴奋性降低
- C、参与静息电位的形成
- D、高钾抑制心肌收缩
- E、维持细胞内的渗透压

答案：B

27、鼻咽癌最常见的病理分类为()

- A、高分化鳞状细胞癌
- B、低分化鳞状细胞癌
- C、未分化癌
- D、高分化腺癌
- E、低分化腺癌

答案：B

28、下列有关维生素 K 临床应用的叙述中, 哪一条是错误的()

- A、任何一种维生素 K 都可用于防止由于维生素 K 缺乏而引起的出血症
- B、中国药典只收载了维生素 K1. gif], 但维生素 K3. gif]和维生素 K 也是临床常用止血药
- C、维生素 K 可用于肌肉注射或缓慢静脉滴注
- D、本类药物是止血药, 凡与此目的不符的应用应认为是不合理用药
- E、肌肉注射维生素 K 比口服效果好

答案：D

29、阿托品在眼科方面用于()

- A、缩瞳, 调节麻痹
- B、扩瞳, 调节麻痹
- C、扩瞳, 降低眼压
- D、扩瞳, 调节痉挛
- E、扩瞳, 视近物清楚

答案：B

30、口对口人工呼吸时, 将病人头部后仰, 托起下颌, 最主要的目的是()

- A、保持脑血液供应
- B、便于口对口接触
- C、避免口、鼻分泌物流出
- D、解除舌后坠造成的咽阻塞
- E、有利于保护颈椎

答案：D

31、【单选】当实施床边隔离时，诊疗护理多重耐药菌的患者应（）。

- A、安排在最先
- B、安排在中间
- C、安排在最后
- D、按常规进行

答案：C

32、幽门螺杆菌（Hp）与慢性胃炎的关系下列哪项不正确（）

- A、胃黏膜活检 Hp 阳性率高
- B、血中 Hp 抗体升高
- C、Hp 感染与胃黏膜中性粒细胞浸润呈正比
- D、Hp 与刺激性食物有关
- E、清除 Hp 治疗后胃炎组织学改善

答案：D

33、对癫痫阵挛性发作描述错误的是

- A、发作前无强直期
- B、可伴意识丧失
- C、特异性脑电图改变
- D、重复阵挛抽动
- E、婴幼儿为主

答案：C

34、盆腔炎的合并症或后遗症极少见的是

- A、输卵管卵巢囊肿
- B、输卵管积水
- C、弥漫性腹膜炎
- D、输卵管妊娠
- E、粘连性子宫后屈

答案：C

35、肺硅沉着症中,硅结节的叙述不正确的是

- A、早期为细胞性结节
- B、早期分布在肺组织内
- C、晚期为玻璃样变性结节
- D、其形成与患者从事的职业有关
- E、其形成与吸入的 SiO₂ 颗粒大小和形状有关

答案：B

36、【单选】下列对于病毒核酸标本监测，说法错误的是（）。

- A、采集后应在 2-4 小时内送至实验室
- B、血液标本应在 2-8℃条件下转运
- C、血液标本应在室温转运
- D、若运送时间超过 24 小时，则标本应在-70℃以下条件下转运

答案：B

37、有关骨折急救处理, 下列哪项错误()

- A、首先应止血及包扎伤口
- B、无夹板时, 可用树枝、木棍板、步枪等作临时固定支架
- C、可将伤员上肢缚于胸壁侧面, 下肢两腿绑在一起固定
- D、脊椎骨折病人最好俯卧位抬送
- E、搬动脊椎骨折病人时, 应采取一人抱肩, 一人抬腿的方法

答案：E

38、年龄相关性白内障与核硬化的不同是()

- A、屈光度增加
- B、晶状体核密度增加
- C、视力下降
- D、晶状体透明度降低
- E、晶状体颜色加深

答案：C

39、同视机的结构和原理描述正确的是

- A、镜筒的运动方向是根据 Fick 坐标围绕眼球旋转中心的位置进行的
- B、附件部分有画片和海丁格刷
- C、检查时患眼应处于松弛、眼球无调节状态
- D、光学系统出射到患者眼睛的光线应为平行光
- E、以上选项都正确

答案：E

40、【单选】口腔诊疗器械使用纸塑袋包装时应密封完整，密封宽度及包内器械距包装袋封口处应达到()。

- A、密封宽 $\geq 4\text{mm}$ 包内器械距包装袋封口处 $\geq 1.5\text{cm}$
- B、密封宽 $\geq 5\text{mm}$ 包内器械距包装袋封口处 $\geq 2\text{cm}$
- C、密封宽 $\geq 6\text{mm}$ 包内器械距包装袋封口处 $\geq 2.5\text{cm}$
- D、密封宽 $\geq 7\text{mm}$ 包内器械距包装袋封口处 $\geq 3\text{cm}$

答案：C

41、【单选】抽出的药液和配制好的静脉输注用无菌液体，放置时间不应该超过()；启封抽吸的各种溶媒不应该超过()。

- A、2h 24h
- B、2h 48h
- C、4h 24h
- D、4h 48h

答案：A

42、手部开放性损伤争取清创时间是()

- A、2~4 小时
- B、4~6 小时
- C、6~8 小时
- D、8~10 小时
- E、10~12 小时

答案：C

43、药物产生不良反应的剂量是()

- A、中毒量
- B、TD
- C、无效剂量
- D、极量
- E、治疗剂量

答案：E

44、受精时,精子能穿透明带起作用的是:()

- A、精子的运动
- B、顶体酶的释放
- C、精子运动和输卵管粘膜的作用
- D、精子运动和顶体酶释放
- E、顶体酶释放和输卵管粘膜的作用

答案：D

45、肉瘤是由()

- A、神经组织来源的恶性肿瘤
- B、间叶组织来源的良性肿瘤
- C、间叶组织来源的恶性肿瘤
- D、上皮组织来源的良性肿瘤
- E、上皮组织来源的恶性肿瘤

答案：C

46、5 岁小儿,下列何者不正常()

- A、体重 20kg

- B、身长 105cm
- C、乳牙 20 颗
- D、腕部骨化中心 6 个
- E、上部量与下部量相等

答案：E

47、对急性肾盂肾炎的描述下列哪项是正确的

- A、是病原微生物侵入肾盂、肾间质所引起的炎症
- B、是病原微生物侵入肾盂、肾实质所引起的炎症
- C、是病原微生物侵入肾盂、肾间质和肾实质所引起的炎症
- D、是自身免疫性疾病
- E、主要是病毒或葡萄球菌所引起

答案：E

48、肾功能衰竭患者应()

- A、供给大量豆制品
- B、禁用鱼肉类食品
- C、生物价值高的低蛋白质膳食
- D、限制碳水化物供给
- E、限制维生素的供给

答案：C

49、治疗风热犯表证的代表方剂是()

- A、桑菊饮
- B、麻杏石甘汤
- C、麻黄汤
- D、桂枝汤
- E、银翘散

答案：E

50、显示组织及细胞内多肽和蛋白的最佳方法是:()

- A、免疫细胞化学术
- B、同位素示踪术
- C、PAS 反应
- D、Feulgen 反应
- E、H-E 染色

答案：A

51、关于细胞壁的功能,下列哪一项是错误的()

- A、维持细菌固有形态

- B、支持细胞膜承受内部高压
- C、与细胞膜共同完成物质交换
- D、决定细菌细胞的分裂
- E、表面有抗原表位. 可以诱导免疫应答

答案：D

52、【单选】医用一次性纸袋包装的无菌物品，有效期宜为（）天。

- A、30
- B、14
- C、7
- D、60

答案：A

53、肝脏良性肿瘤中最常见的是

- A、海绵状血管瘤
- B、肝脏纤维瘤
- C、肝腺瘤
- D、肝错构瘤
- E、肝脂肪瘤

答案：A

54、最早在妊娠多少周时用超声检查能够测量双顶径（）

- A、14 周
- B、12 周
- C、8 周
- D、6 周
- E、10 周

答案：B

55、【单选】传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，正确的处理是（）。

- A、先进行消毒，然后排入污水处理系统
- B、按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统
- C、先进行消毒，大致达到国家规定的排放标准后方排入污水处理系统
- D、按照国家规定严格消毒后就可以排放

答案：B

56、下列口腔粘膜下纤维性变的发病因素哪项说法是正确的（）

- A、咀嚼槟榔

- B、菌斑
- C、吸烟
- D、家族遗传
- E、免疫低下

答案：A

57、中心性发绀常具有下列哪项特点()

- A、常出现在肢体末梢
- B、伴有皮肤温度降低
- C、见于右心衰时
- D、见于发绀型先天性心脏病时
- E、见于严重休克时

答案：D

58、使肩关节外展的肌肉是()

- A、胸大肌
- B、背阔肌
- C、三角肌
- D、斜方肌
- E、肩胛下肌

答案：C

59、心尖在胸前壁的体表投影位于()

- A、位于左侧第4肋间隙,距前正中线7~9 cm处
- B、位于左侧第5肋间隙,距前正中线7~9 cm处
- C、位于左侧第6肋间隙,距前正中线7~9 cm处
- D、位于左侧第5肋间隙,距前正中线5~7 cm处
- E、位于左侧第6肋间隙,距前正中线5~7 cm处

答案：B

60、病程记录的书写下列哪项不正确()

- A、症状及体征的变化
- B、检查结果及分析
- C、各级医师查房及会诊意见
- D、每天均应记录1次
- E、临床操作及治疗措施

答案：D

61、典型法洛四联症X线表现的主要特征是()

- A、肺血增多

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/735034334043012122>