

急救技能知识考试题+答案

1、骨牵引病人为防止针孔感染，护理上应注意()

- A、出去针孔血痂
- B、全身应用抗生素
- C、移动钢针调正位置
- D、定期更换牵引钢针
- E、每日 2 次乙醇滴针孔处

答案：E

2、尿毒症伴高血钾时，最有效的治疗方法是()

- A、输入小苏打
- B、输入钙剂
- C、输入高渗葡萄糖加胰岛素
- D、血液透析
- E、口服钠型阳离子交换树脂

答案：D

3、患儿男，2 岁，麻疹恢复期，体温突然再次升高，出现嗜睡，惊厥等。

作为护士，可判断该患儿可能发生了()

- A、肺炎
- B、喉炎
- C、脑炎
- D、心肌炎
- E、支气管炎

答案：C

4、女性，23 岁，胸闷，气短 2 周，伴乏力. 低热，体温 37.8℃，纳差。查体：一般情况好，浅表淋巴结不大，左肩胛下角第 8 肋间以下语颤减低，叩浊，呼吸音减低，腹部检查正常。其最可能的诊断为()

- A、结核性胸膜炎
- B、胸膜间皮瘤
- C、肝硬化
- D、肾病综合征
- E、心力衰竭

答案：A

5、某溃疡病并发幽门梗阻病人，因反复呕吐入院，血气分析结果为 pH7.49, PaCO₂48mmhg, HCO₃⁻36mmol/L, 该病人应诊断为()

- A、呼吸性碱中毒

- B、呼吸性酸中毒
- C、代谢性酸中毒
- D、代谢性碱中毒
- E、混合性酸碱中毒

答案：D

6、医疗机构在发现甲类传染病时，对疑似病人在明确诊断前，应在指定场所进行（ ）

- A、访视
- B、留验
- C、单独隔离治疗
- D、医学观察
- E、就地诊验

答案：D

7、冲洗时发现浓液粘稠，边冲边挤压引流管来（ ），以免引起堵塞。

- A、加快冲洗速度
- B、降低冲洗速度
- C、保持冲洗速度
- D、停止冲洗

答案：A

8、床上洗头，头发如有打结，如何处理？（ ）

- A、把梳子打湿，轻轻梳理
- B、用手小心翼翼的分开
- C、可用 30%乙醇溶液辅助梳理
- D、用梳子强行用力梳头
- E、要病人家属处理

答案：C

9、下列提示休克患者进入微循环衰竭期的是（ ）

- A、代谢性酸中毒
- B、血压低，脉搏细数
- C、神志淡漠
- D、末梢血运差
- E、皮肤出现瘀斑、瘀点

答案：E

10、关于治疗休克的叙述，错误的是：（ ）

- A、失血性休克的治疗是扩容

- B、感染性休克时可应用大剂量氢化可的松
- C、失血性休克时，止血是不可忽视的主要手段
- D、感染性休克时，应首先选用升压药

答案：C

11、T形引流管的患者，若胆汁突然减少，甚至无胆汁引出，则应考虑引流管()

- A、胆管下端梗阻
- B、胆管上端梗阻
- C、结石残留
- D、胆管梗阻
- E、堵塞或脱出

答案：E

12、可同时加重心源性哮喘和支气管哮喘的药物是：()

- A、新斯的明
- B、酚妥拉明
- C、吗啡
- D、普萘洛尔
- E、维拉帕米

答案：D

13、医疗事故的处理原则是()

- A、公开. 公平. 公正. 及时. 便民
- B、公开. 公平. 公正. 方便. 快捷
- C、公开. 公平. 公正. 便民. 经济
- D、公开. 公平. 公正. 及时. 方便
- E、公开. 公平. 公正. 快捷. 高效

答案：A

14、男性，66岁，持续性呼吸困难10小时，3个月前曾发生股骨颈骨折。发现高血压病10年。体检：T36.5℃，BP90/60mmHg，颈静脉充盈，P2亢进，心脏各瓣膜区未闻及杂音和心包摩擦音。心电图：电轴右偏，S1QmTIII。血清乳酸脱氢酶()增高，血清肌酸磷酸激酶同工酶(CK—MB)正常。该患者最可能诊断是)

- A、肺动脉栓塞
- B、急性心肌梗死
- C、急性心包炎
- D、主动脉夹层

E、胸腔积液

答案：A

15、男性矿工，井下作业时发生塌方砸伤背部，当即倒于地上，下肢无力不能行走，立即来诊。检查见胸腰段后凸畸形并压痛，双下肢不全瘫，感觉异常平面位于双侧腹股沟水平。正确的搬运方法()

A、一人用一手抱颈另手抱腿放于担架上

B、一人抬头，另人抬足放于木板上

C、两人架其上肢助其走上担架车

D、两人将其躯干成一体滚动至木板上

E、三人分别抬其头和两腿放于担架上

答案：D

16、患者女性，15岁，骑自行车时不慎跌倒，自觉外阴部胀痛难忍，最可能发生()

A、处女膜破裂

B、小阴唇裂伤

C、大阴唇血肿

D、巴氏腺出血

E、会阴体损伤

答案：C

17、消化道出血应用三腔气囊管压迫止血，放气的时间是术后()

A、12小时

B、24小时

C、48小时

D、72小时

E、96小时

答案：B

18、确立心脏骤停后给予的最基本的生命支持方法是：()

A、阿托品

B、冰帽

C、人工呼吸，胸外心脏按压

D、人工心脏起搏

E、气管插管

答案：C

19、急性呼吸窘迫综合症宜采用：()

A、低浓度给氧

- B、高浓度给氧
- C、两者均可
- D、两者均否
- E、持续低浓度给氧

答案：B

20、急性胰腺炎患者饮食应：（

- A、少量多餐
- B、低盐饮食
- C、高维生素膳食
- D、急性期禁食
- E、忌辛辣食物

答案：D

21、大量不保留灌肠的目的下列哪项是错误的（）

- A、软化和清除粪便
- B、为肠道手术作清洁肠道准备
- C、清除肠道内的有害物质
- D、为低温患者升温

答案：D

22、一氧化碳中毒病人宜输入（）

- A、血浆
- B、白蛋白液
- C、新鲜血
- D、库血
- E、红细胞混悬液

答案：E

23、， 男性， 驾车撞树受伤， 伤后右髋关节疼痛剧烈不能活动。查体：患肢短缩， 呈屈曲. 内收. 内旋畸形， 应首先考虑的诊断是（）

- A、股骨颈骨折
- B、股骨干骨折
- C、髋关节后脱位
- D、髋关节前脱位
- E、坐骨神经损伤

答案：C

24、患者，女，23 岁。因路人发现晕倒在地而送来急诊，体检：神志恍惚，瞳孔缩小，呼出气无特殊气味，心率 120 次/分，律齐，BP90/60mmHg, 上臂可见多处注射针眼，该患者最有可能的诊断是()

- A、有机磷中毒
- B、鸦片类中毒
- C、乙醇中毒
- D、口服地西洋中毒
- E、以上都不是

答案：B

25、提示昏迷程度加重的是：()

- A、双侧对称性浅反射减弱
- B、深反射亢进或消失
- C、双侧腱反射不对称
- D、出现病理反射
- E、浅反射由减弱到消失

答案：E

26、开放性骨折现场止血首选：()

- A、止血带止血
- B、局部压迫包扎
- C、指压出血血管
- D、包扎出血血管
- E、抬高伤肢

答案：B

27、鼻导管给氧，导管插入长度为()

- A、鼻尖至耳垂
- B、鼻尖至耳垂的 $1/2$
- C、鼻尖至耳垂的 $1/3$
- D、鼻尖至耳垂的 $2/3$
- E、鼻翼至耳垂

答案：D

28、洋地黄的主要适应证不包括哪项：()

- A、急、慢性充血性心力衰竭
- B、阵发性室上性心动过速
- C、房室传导阻滞
- D、心房扑动

E、快速性心房颤动

答案：C

29、三腔气囊管使用注意事项中，下列哪项不妥()

A、充气量要适当

B、牵引宜适度

C、经常抽吸胃内容物

D、拔管前宜服石蜡油

E、出血停止后口服少量流质

答案：E

30、防止烧伤休克的主要措施是()

A、保暖

B、镇痛. 镇静

C、创面处理

D、补液治疗

E、多饮水

答案：D

31、在心肺复苏过程中，如发生阵发性室性心动过速，宜首选()

A、肾上腺素

B、阿托品

C、氯化钙

D、利多卡因

E、碳酸氢钠

答案：D

32、因抢救急危患者，未能及时书写病历的，有关医务人员应当在抢救结束后据实补记，并加以注明，其时限为()

A、2 小时内

B、4 小时内

C、6 小时内

D、8 小时内

E、12 小时内

答案：C

33、一患者阴道不规则少量流血 3 月，来院就诊。尿妊娠试验阳性，给予刮宫，但刮出物未见绒毛，病理检查结果为蜕膜组织，则其可能的诊断为()

A、早期妊娠反应

B、异位妊娠

- C、功血
- D、葡萄胎
- E、子宫内膜

答案：B

34、多根多处肋骨骨折，因反常呼吸导致呼吸困难时，主要措施是：()

- A、肋间神经阻滞
- B、骨折处局部封闭
- C、胸膜腔闭式引流
- D、使用呼吸兴奋剂
- E、固定胸壁

答案：E

35、胸外心脏按压中断时间不得超过()

- A、3 秒
- B、5 秒
- C、10 秒
- D、15 秒
- E、20 秒

答案：C

36、需立即进行新生儿复苏的项目不包括()

- A、高危产妇
- B、新生儿未足月
- C、新生儿羊水浑浊
- D、新生儿无哭声或呼吸 E 新生儿肌张力低下

答案：A

37、舒张压持续 $\geq 130\text{mmHg}$, 伴头痛. 眼底出血. 乳头水肿等应是：()

- A、高血压危象
- B、高血压脑病
- C、顽固性高血压
- D、恶性高血压
- E、老年高血压

答案：D

38、咽拭子标本采集法的是目的()

- A、取患者咽部及扁桃体分泌物做常规检查
- B、取患者咽部及扁桃体分泌物做细菌培养。
- C、取患者口腔粘膜分泌物做细菌培养。

D、取患者口腔溃疡部位分泌物做常规培养。

E、取患者口腔溃疡部位分泌物做细菌培养。

答案：B

39、关于腹外疝手术前后的护理，下列哪项是错误的（ ）

A、术后患侧膝下垫枕头

B、术前应治愈或控制引起腹内压升高的症状

C、严格准备会阴部皮肤

D、腹股沟斜疝术后不需要托起阴囊

E、术后3个月内避免重体力劳动

答案：D

40、留取24小时尿标本时加入甲醛的作用是（ ）

A、固定尿中有机成分。

B、防止尿激素氧化

C、防止尿液被污染变质

D、保持尿液中的化学成分不变

E、杀灭尿液中的致病菌

答案：A

41、符合浅昏迷临床表现是：（ ）

A、对疼痛刺激有反应

B、可以唤醒

C、无意识的自主运动消失

D、四肢腱反射消失

E、定向力障碍

答案：A

42、急性有机磷杀虫药中毒治疗过程中出现反跳的原因除外（ ）

A、污染的皮肤未彻底清洗干净

B、洗胃不彻底

C、胆碱酯酶复活剂用量不足

D、阿托品停药过早

E、阿托品用量不足

答案：C

43、男，36岁，在活动时突发性心绞痛5分钟，休息后缓解。该患者应诊断为：（ ）

A、急性心包炎

B、急性心肌梗死

- C、心内膜下心肌梗死
- D、慢性心肌缺血
- E、劳累性心绞痛

答案：E

44、处理骨折患者时，应首先掌握的原则是（ ）

- A、抢救生命
- B、妥善处理伤口，并简单有效固定
- C、迅速安全转移伤员
- D、输液并输血
- E、立即将骨折端嵌入进行复位

答案：B

45、高血压病脑出血时，最常见的出血部位是：（ ）

- A、小脑齿状核
- B、小脑皮质
- C、桥脑
- D、基底节
- E、延脑

答案：D

46、多根多处肋骨骨折患者，最典型的症状和体征是：（ ）

- A、疼痛剧烈
- B、呼吸困难
- C、伤处肿胀青紫
- D、反常呼吸运动
- E、胸廓挤压痛

答案：D

47、患者男性，70岁，突然意识丧失，血压测不清，颈动脉搏动消失，住院心电图监测为心室颤动，此时应采用最有效的治疗是（ ）

- A、心脏按压
- B、人工呼吸
- C、非同步直流电复律
- D、静注利多卡因
- E、心腔内注射肾上腺素

答案：C

48、急性肾衰竭最常见的诱发因素是（ ）

- A、劳累

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/735101340113011100>