

## 2024 河南省尉氏县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题完整版及答案 1 套

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1.（2019 年真题）在体内可与含羟基或羧基的毒物结合，形成低毒或无毒结合物排出体外，起到解毒和保护肝脏的作用，用于急、慢性肝炎治疗的药物是（）

- A: 硫普罗宁
- B: 葡醛内酯
- C: 异甘草酸镁
- D: 腺苷蛋氨酸

答案：B

2. 唯一与青霉素类没有交叉反应的  $\beta$ -内酰胺类，可用于青霉素和头孢菌素类过敏者的药物是

- A: 红霉素
- B: 克林霉素
- C: 氨曲南
- D: 克拉霉素

答案：C

3. 严重低钾血症、高钠血症、高血压、心力衰竭、肾功能衰竭者禁用的药物是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 甘草酸二铵
- C: 雷尼替丁

D: 甲氧氯普胺

**答案：B**

4. 伴有痛风的水肿患者，不宜选用下列哪种药物利尿()

A: 阿米洛利

B: 氨苯蝶啶

C: 乙酰唑胺

D: 氢氯噻嗪

**答案：D**

5. 下列哪种药物可使关闭的房角重新开放，从而降低眼内压

A: 拉坦前列素

B: 毛果芸香碱

C: 地匹福林

D: 噻吗洛尔

**答案：B**

6. 因是前药，需在肝内转化后生效，严重肝功能不全者不宜选用的糖皮质激素是

A: 甲泼尼龙

B: 氢化可的松

C: 泼尼松

D: 泼尼松龙

**答案：C**

7. 长期使用可使血钾水平升高的药品是

A: 氨苯蝶啶

B: 乙酰唑胺

C: 呋塞米

D: 吲达帕胺

**答案：A**

8. 地衣芽孢杆菌活菌以活菌形式进入肠道后，拮抗的致病菌是

A: 拟杆菌

B: 双歧杆菌

C: 葡萄球菌

D: 乳酸杆菌

**答案：C**

9. 可为患者提供一定的能量，对于长期昏迷的患者尤为适用的药物是

A: 甘油果糖

B: 螺内酯

C: 甘露醇

D: 阿米洛利

**答案：A**

10. 肥胖型 2 型糖尿病患者控制血糖的一线药物是()

A: 格列齐特

B: 二甲双胍

C: 格列吡嗪

D: 格列本脲

**答案：B**

11. 属于  $\alpha$

A: 普适泰

B: 度他雄胺

C: 酚妥拉明

D: 特拉唑嗪

**答案: D**

12. 红霉素的主要不良反应是

A: 胃肠道反应

B: 过敏反应

C: 肝损伤

D: 耳毒性

**答案: A**

13. 羟基脲选择性作用于肿瘤细胞

A: G1 期

B: S 期

C: M 期

D: G0 期

**答案: B**

14. 对氨基水杨酸抗结核菌作用原理是()

A: 抑制 DNA 回旋酶

B: 抑制蛋白质合成

C: 抑制分枝菌酸的生物合成

D: 干扰叶酸合成

**答案: D**

15. (2021 年真题) 由于氧吡格雷部分经 CYP2C19 转化为活性代谢物, 合用控制此酶活性的药物会降低氯吡格雷的疗效, 故不推荐与氯吡格雷合用的质子泵抑制剂是()

- A: 雷贝拉唑
- B: 兰索拉唑
- C: 奥美拉唑
- D: 泮托拉唑

**答案：C**

16. 对铜绿假单胞菌无效的氟喹诺酮类药是

- A: 甲氧苄啶
- B: 呋喃唑酮
- C: 磺胺嘧啶
- D: 氧氟沙星

**答案：D**

17. 伴随剂量增大，阿托品出现的症状以下排序正确的是

- A: 心率减慢、心率加快、显著口干、肠蠕动减少
- B: 瞳孔扩大、心率加快、胃液分泌抑制、胃肠道平滑肌兴奋性降低
- C: 心率加快、心率减慢、显著口干、肠蠕动减少
- D: 显著口干、心率减慢、心率加快、肠蠕动减少

**答案：A**

18. 属于芳基乙酸类的是

- A: 塞来昔布
- B: 阿司匹林
- C: 吲哚美辛
- D: 对乙酰氨基酚

**答案：C**

19. 氨基酸分类正确的是

- A: 肾病的氨基酸制剂: 复方氨基酸注射液 (9AA)、复方  $\alpha$ -酮酸片
- B: 肝病的氨基酸制剂: 复方氨基酸注射液 (20AA)、复方氨基酸注射液 (9AA)
- C: 肝病的氨基酸制剂: 复方氨基酸注射液 (9AA)、复方氨基酸注射液 (15AA)
- D: 肾病的氨基酸制剂: 复方氨基酸注射液 (15AA)、复方  $\alpha$ -酮酸片

**答案: A**

20. 下列关于眼部抗菌药物的描述, 错误的是

- A: 妥布霉素对铜绿假单胞菌引起的感染有效
- B: 多黏菌素 B 对铜绿假单胞菌引起的感染有效
- C: 夫西地酸不可用于治疗葡萄球菌感染
- D: 氟喹诺酮类及氨基糖苷类具有广谱抗菌活性

**答案: C**

21. 下述利尿药中, 可增加卡那霉素耳毒性的是

- A: 螺内酯
- B: 呋塞米
- C: 氨苯蝶啶
- D: 氢氯噻嗪

**答案: B**

22. 大剂量可导致 Q—T 间期延长的是

- A: 西沙必利
- B: 莫沙必利
- C: 多潘立酮
- D: 甲氧氯普胺

**答案: A**

23. 下列抗心律失常药中，属于  $\beta$  受体阻断剂的代表药是 ( )。

- A: 普萘洛尔
- B: 溴苄胺
- C: 索他洛尔
- D: 胺碘酮

**答案：A**

24. 关于下列抗酸剂的描述，不正确的是

- A: 不推荐用抗酸剂缓解非甾体抗炎药相关症状。预防溃疡发生
- B: 抗酸药直接中和胃酸
- C: 最佳服药时间是餐前
- D: 碳酸氢钠属于吸收性抗酸剂

**答案：C**

25. 两性霉素 B 属于 ( )

- A: 棘白菌素类抗真菌药
- B: 多烯类抗真菌药
- C: 丙烯胺类抗真菌药
- D: 唑类抗真菌药

**答案：B**

26. 与呋喃妥因特性不符的叙述是 ( )

- A: 主要用于泌尿系感染
- B: 有广谱抗菌活性
- C: 在小肠吸收迅速
- D: 碱性尿液中杀菌作用增强

**答案：D**

27. 严重肝功能不全、胆道阻塞患者禁用()

- A: 夫西地酸
- B: 四环素可的松
- C: 利福平
- D: 氯霉素

**答案: C**

28. 骨化三醇可引起高钙血症，在服药后应监测血钙和血肌酐浓度，首次监测的时间建议是

- A: 服药后第 3 个月
- B: 服药后第 4 周
- C: 服药后第 2 周
- D: 服药后第 6 个月

**答案: B**

29. 左炔诺孕酮为

- A: 促性腺激素
- B: 促性腺激素释放激素类似物
- C: 短效口服避孕药
- D: 雌激素类

**答案: C**

30. 氯沙坦的降压作用机制是

- A: 阻断  $\alpha$  受体
- B: 阻断 AT<sub>2</sub> 受体
- C: 阻断  $\beta$  受体
- D: 阻断 AT<sub>1</sub> 受体

**答案：D**

31. 可用于肝硬化腹水以及加速某些毒物排泄的药物是

- A: 乙酰唑胺
- B: 氨苯蝶啶
- C: 氢氯噻嗪
- D: 托拉塞米

**答案：D**

32. (2020 年真题) 为避免继发真菌感染，使用后应立即漱口的药物是

- A: 孟鲁司特片
- B: 羧甲司坦口服液
- C: 布地奈德福莫特罗吸入剂
- D: 沙丁胺醇气雾剂

**答案：C**

33. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药(具体不详)治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次 / 日。

- A: 不会导致催乳素增多
- B: 不会导致 Q~T 间期延长及室性心律失常
- C: 不会导致锥体外系反应
- D: 不会促进乙酰胆碱的释放

**答案：D**

34. 因全身应用可产生严重的肾毒性、故目前仅限于局部应用的是

- A: 杆菌肽
- B: 替考拉宁
- C: 去甲万古霉素
- D: 万古霉素

**答案：A**

35. 可使人体对维生素 B2 的需求增加的是

- A: 糖皮质激素
- B: 异烟肼
- C: 丙磺舒
- D: 雌激素

**答案：C**

36. 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是()。

- A: 氟他胺
- B: 乙烯雌酚
- C: 托瑞米芬
- D: 他莫昔芬

**答案：A**

37. 过量引起严重心脏毒性的药物是

- A: 地高辛
- B: 氨氯地平
- C: 哌唑嗪
- D: 卡托普利

**答案：A**

38. 患者已经使用利尿剂治疗高血压，医生欲开始使用福辛普利，应该

- A: 开始用福辛普利前停用利尿剂 2~3 日
- B: 开始用福辛普利前停用利尿剂 5~7 日
- C: 直接加用福辛普利即可
- D: 直接换用福辛普利即可

**答案：A**

39. 寻常痤疮、鱼鳞病及银屑病可选用 ( )

- A: 维 A 酸
- B: 林旦霜
- C: 阿达帕林
- D: 酮康唑

**答案：A**

40. (2021 年真题) 属于时间依赖型抗菌药物，抗菌谱窄，仅对需氧革兰阴性菌有 ( )

- A: 氨苄西林
- B: 氨曲南
- C: 头孢他啶
- D: 阿米卡星

**答案：B**

41. 糖皮质激素用于某些慢性病的长期疗法中，采用隔日 1 次给药法，将 48 小时用量一次服用，合适的时间是

- A: 下午 3 时
- B: 下午 6 时
- C: 上午 8 时
- D: 中午 12 时

**答案：C**

42. 下列说法中错误的是

- A: ER 阳性者，绝经前、后均可使用他莫昔芬
- B: 芳香氨酶抑制剂主要包括来曲唑和阿那曲唑
- C: 芳香氨酶抑制剂可用于绝经前乳腺癌患者
- D: 他莫昔芬是目前临床上最常用的乳腺癌内分泌治疗药

**答案：C**

43. 有机磷酸酯中毒的解救宜选用

- A: 纳洛酮
- B: 鱼精蛋白
- C: 多潘立酮
- D: 阿托品

**答案：D**

44. 下列可引起糖尿病患者血糖过低，而对非糖尿病患者无降血糖作用的抗心律失常药物是

- A: 胺碘酮
- B: 普萘洛尔
- C: 地尔硫革
- D: 美西律

**答案：B**

45. 奎尼丁对心肌细胞膜的作用主要是

- A: 促进  $\text{Ca}^{2+}$  内流
- B: 抑制  $\text{Ca}^{2+}$  外流
- C: 促进  $\text{K}^{+}$  外流
- D: 抑制  $\text{Na}^{+}$  内流

**答案：D**

46. 甲状腺功能亢进症的内科治疗宜选用()

- A: 甲巯咪唑
- B: 小剂量碘剂
- C: 甲状腺素
- D: 吡格列酮

**答案：A**

47. 属于延长动作电位时程类的广谱抗心律失常的药物是

- A: 奎尼丁
- B: 胺碘酮
- C: 普罗帕酮
- D: 普鲁卡因胺

**答案：B**

48. 洋地黄毒苷的半衰期是

- A: 48h
- B: 7 天以上
- C: 72h
- D: 5 天

**答案：B**

49. 磺胺类药物的抗菌机制是

- A: 改变细菌细胞膜通透性
- B: 抑制四氢叶酸还原酶
- C: 抑制二氢叶酸还原酶
- D: 抑制二氢叶酸合成酶

**答案：D**

50. 以下泻药中，半乳糖血症患者禁用的是

- A: 硫酸镁
- B: 酚酞
- C: 乳果糖
- D: 液状石蜡

**答案：C**

51. 与唑来膦酸合用可增加多发性骨髓瘤患者发生肾功能不全风险的谷氨酸衍生物是

- A: 抗血管生成药
- B: 沙利度胺
- C: 高钙食品
- D: 萘普生

**答案：B**

52. 属于二肽基肽酶-4 抑制剂的是

- A: 二甲双胍
- B: 阿卡波糖
- C: 西格列汀
- D: 罗格列酮

**答案：C**

53. 有类磺胺反应的 NSAID 是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 塞来昔布
- C: 吲哚美辛

D: 阿司匹林

**答案: B**

54. 不属于血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）类药物作用特点的是

A: ACEI 类禁用于双侧肾动脉狭窄者

B: ACEI 可改善左心室功能

C: ACEI 对肾脏有保护作用

D: ACEI 可引起反射性心率加快

**答案: D**

55. 用于预防单纯性甲状腺肿的是

A: None

B: 大剂量碘制剂

C: 小剂量碘制剂

D: 甲状腺素

**答案: C**

56. （2019 年真题） $\beta$ -内酰胺酶抑制剂的抑酶活性由强到弱的顺序是（）

A: 舒巴坦>克拉维酸>他唑巴坦

B: 他唑巴坦>舒巴坦>克拉维酸

C: 舒巴坦>他唑巴坦>克拉维酸

D: 他唑巴坦>克拉维酸>舒巴坦

**答案: D**

57. 患者，男，45 岁。以"间断巩膜黄染伴腹胀 2 年，加重 1 周"之主诉入院。患者 2 年前无明显诱因出现巩膜黄染，伴有腹胀，在当地医院诊断为酒精性肝硬化。1 周前患者上述症状加重，胃镜检查：胃溃疡(A

- A: 还原型谷胱甘肽
- B: 水飞蓟宾
- C: 氢化可的松琥珀酸钠
- D: 复方甘草酸苷

**答案：D**

58. 下列药物除哪项外都属于钙拮抗剂()

- A: 溴苄胺
- B: 地尔硫
- C: 维拉帕米
- D: 硝苯地平

**答案：A**

59. 阻断 M

- A: 雷尼替丁
- B: 氢氧化铝
- C: 奥美拉唑
- D: 哌仑西平

**答案：D**

60. 可抑制蛋白质合成全过程，具繁殖期和静止期杀菌作用的药物是

- A: 替加环素
- B: 多黏菌素
- C: 庆大霉素
- D: 环丙沙星

**答案：C**

61. 下列关于袪利尿药不良反应的描述，错误的是()

- A: 常见水、电解质紊乱
- B: 耳毒性与剂量无关
- C: 长期使用多数患者可出现高尿酸血症
- D: 当低血钾和低血镁同时存在时，如不纠正低血镁，即使补充钾也不易纠正低钾血症

**答案：B**

62.（2020 年真题）曲妥珠单抗的适应证是

- A: 转移性结直肠癌
- B: 晚期恶性黑色素瘤
- C: 表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性的转移性非小细胞肺癌
- D: 人表皮生长因子受体-2（HER-2）过度表达的乳腺癌

**答案：D**

63. 属于白三烯受体阻断剂的平喘药物是

- A: 茶碱
- B: 异丙托溴铵
- C: 沙丁胺醇
- D: 孟鲁司特

**答案：D**

64.（2015 年真题）可用于重度痤疮（尤其是结节囊肿型痤疮）的药品是（）。

- A: 阿达帕林
- B: 过氧苯甲酰
- C: 异维 A 酸
- D: 克林霉素

**答案：C**

65. 属于抗纤维蛋白溶解药的是

- A: 艾曲泊帕乙醇胺
- B: 甲苯氢醌
- C: 酚磺乙胺
- D: 氨甲环酸

**答案：D**

66. () 用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染

- A: 克林霉素
- B: 红霉素
- C: 万古霉素
- D: 克拉霉素

**答案：C**

67. 天然的雌激素是()

- A: 戊酸雌二醇
- B: 雌二醇
- C: 炔雌醚
- D: 黄体酮

**答案：B**

68. 可见头晕、耳鸣、视力减退、出汗等不良反应的是

- A: 甲苯氢醌
- B: 蛇毒血凝酶
- C: 卡巴克络
- D: 氨基己酸

**答案：C**

69. 易被胃酸破坏，口服吸收少，故临床一般服用其肠衣片或酯化物的是

- A: 氨曲南
- B: 阿奇霉素
- C: 克拉霉素
- D: 红霉素

**答案：D**

70. 支气管哮喘急性发作时宜使用的药物是（）

- A: 孟鲁司特钠咀嚼片
- B: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂
- C: 吸入用布地奈德混悬液
- D: 沙丁胺醇气雾剂

**答案：D**

71. 诱导肝微粒体酶、是皮质激素和雌激素药效降低的是（）

- A: 利福平
- B: 链霉素
- C: 异烟肼
- D: 乙胺丁醇

**答案：A**

72. 对于万古霉素，描述错误的是

- A: 快速静滴会出现红人综合征
- B: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成
- C: 可用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染
- D: 对革兰阴性杆菌和真菌有一定作用

**答案：D**

73. 治疗钙缺乏症可选用

- A: 阿伦膦酸钠
- B: 依降钙素
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 阿法骨化醇

**答案：C**

74. 以多酶或辅酶形式参与体内新陈代谢及重要的生化反应的是

- A: 维生素
- B: 果糖
- C: 脂肪乳
- D: 葡萄糖

**答案：A**

75. 长期大量服用维生素 B6 会出现

- A: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活
- B: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象
- C: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等
- D: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

**答案：A**

76. 铁剂用药期间需定期做下列检查，以观察治疗效果，不包括

- A: 血红蛋白
- B: 血清铁蛋白
- C: 网织红细胞计数

D: 巨核细胞计数

**答案: D**

77. 半合成青霉素类中，属于广谱青霉素类的是()

A: 氨苄西林

B: 甲氧西林

C: 替莫西林

D: 羧苄西林

**答案: A**

78. 属于短效胰岛素制剂的是

A: 甘精胰岛素

B: 地特胰岛素

C: 精蛋白锌胰岛素

D: 普通胰岛素

**答案: D**

79. 可能导致牙齿黄染的抗菌药物是

A: 多西环素

B: 庆大霉素

C: 加替沙星

D: 甲砒霉素

**答案: A**

80. 以下哪种心律失常禁用强心苷

A: 心房颤动

B: 室性心动过速

C: 室上性心动过速

D: 心房扑动

**答案：B**

81. 属于刺激性泻药的是()

A: 欧车前

B: 利那洛肽

C: 番泻叶

D: 多库酯钠

**答案：C**

82. 属于还原酶抑制剂的是()

A: 他达拉非

B: 度他雄胺

C: 坦洛新

D: 西地那非

**答案：B**

83. 双香豆素应用过量可选用的拮抗药是()

A: 维生素 K1

B: 氨甲苯酸

C: 葡萄糖酸钙

D: 鱼精蛋白

**答案：A**

84. 为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化，利尿的同时，还应给予的药物是（）

A: 美司钠

B: 二甲双肌

C: 氯化钾

D: 螺内酯

**答案: A**

85. 下列对甲状腺素应用的表述，错误的是

A: 可用于呆小病的治疗

B: 左甲状腺素是主要替代治疗药，一般需终身替代

C: 本类药起效迅速，24h 达血药浓度高峰

D: 成人初始剂量 25~50  $\mu\text{g}$ ，一日 1 次

**答案: C**

86. 局部外用于皮肤黏膜感染者的是()

A: 磺胺嘧啶

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 柳氮磺吡啶

D: 磺胺米隆

**答案: D**

87. 对耐氯喹的恶性疟虫株，首选

A: 乙胺嘧啶+磺胺药

B: 咯萘啶或甲氟喹

C: 氯喹+伯氨喹

D: 静脉滴注奎宁

**答案: B**

88. 可引起巨幼红细胞性贫血的药物是()

A: 氯喹

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

B: 甲氟喹

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/735241112114012033>