

2024 江苏省金湖县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库附解析答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 以下治疗荨麻疹的抗过敏药中，属于过敏活性物质阻释剂的药物是

- A: 异丙嗪
- B: 酮替芬
- C: 赛庚啶
- D: 苯海拉明

答案：B

2. 处方中开具"黄体酮用于排除输尿管结石"，应评判为

- A: 无正当理由超适应证用药
- B: 联合用药不适宜
- C: 有禁忌证用药
- D: 过度治疗用药

答案：A

3. 再感染

- A: 宜选用毒性小的抗菌药物
- B: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同
- C: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再出现菌尿，菌种与上次相同

D: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次，尿细菌数
>10scfu/ml

答案：B

4. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

- A: 氯霉素在新生儿体内蓄积可导致灰婴综合征
- B: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等
- C: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎
- D: 口服避孕药致阿米替林清除率下降

答案：D

5. 给予(透析患者)非甾体类抗炎药的依据是

- A: 透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛
- B: 有助于机体合成红细胞
- C: 腹膜透析容易丢失水溶性维生素
- D: 肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素 D

答案：A

6. 肥胖、某些疾病、中毒都可成为非酒精性脂肪肝的诱因。脂肪肝合并其他疾病时应采取相应的治疗措施

- A: 奥利司他
- B: 替米沙坦
- C: 别嘌醇
- D: 二甲双胍

答案：A

7. 在应用碘解磷定时的注意事项中哪一项是错误的

- A: 用量过大、注射过快或未经稀释直接注射均可引起中毒
- B: 在碱性溶液中易水解为氰化物，故忌与碱性药物配伍
- C: 对毒蕈碱样作用和防止呼吸中枢抑制的作用较差
- D: 对有机磷农药急、慢性中毒均有效

答案：D

8. 患儿，女，4 岁半。身高 110cm，体重 15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病 20h 左右出现腹泻，约 2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 小檗碱和鞣酸蛋白不宜同时服用？
- B: 首选口服补液，必要时静脉补液？
- C: 腹泻可致电解质丢失，故须特别注意补充？
- D: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与抗生素同时服用？

答案：D

9. （2019 年真题）患者，男，34 岁，既往有胃溃疡病史，现因反复关节疼痛、肿大就诊，诊断为骨关节炎，应选用的药物是

- A: 萘普生
- B: 布洛芬
- C: 塞来昔布
- D: 吲哚美辛

答案：C

10. 患者，男，58 岁，有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2 年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊，开具药品如下：

- A: 美托洛尔会影响阿司匹林的抗血小板活性，应停用
- B: 阿托伐他汀钙用于冠心病的治疗，需长期规律用药
- C: 如大便次数规律（如每日 1 次），聚乙二醇 4000 散可按需使用
- D: 同时使用双氯芬酸钠与阿司匹林会增加消化道出血风险，两药不宜合用

答案：A

11. 患者，女，5 岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

- A: 每天用药最多不应超过 4 次，用药不超过 3 天
- B: 每天用药最多不应超过 3 次，用药不超过 3 天
- C: 每天用药最多不应超过 6 次，用药不超过 3 天
- D: 每天用药最多不应超过 5 次，用药不超过 3 天

答案：A

12. 他汀类与贝特类药物联合使用时，最容易出现的毒性风险是

- A: 十二指肠溃疡
- B: 急性心肌梗死
- C: 横纹肌溶解
- D: 输尿管结石

答案：C

13. 与对氨基苯甲酸（PAPB）化学结构相似，可与 PAPB 竞争二氢叶酸合成酶的药物是

- A: 四环素
- B: 青霉素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 链霉素

答案：C

14. （2017 年真题）慢性阻塞性肺病稳定期患者（FEV₁<50%）宜选用的治疗方案是（）

- A: 长效 β_2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素
- B: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素
- C: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药
- D: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂

答案：A

15. 患者，男，32 岁，患有肠易激综合征（IBS），常排便较急，一般每日 3~5 次，可有黏液，但无脓血，近期服用吗氯贝胺控制抑郁症。针对该患者，不宜使用的 IBS 治疗药物是

- A: 蒙脱石散
- B: 利福昔明
- C: 地芬诺酯
- D: 山莨菪碱

答案：C

16. 患者，女，49 岁，近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊，临床诊断为下呼吸道细菌性感染，处方如下：

- A: 服药时避免与钙片同服，以免影响药物的作用

- B: 服药期间及停药一周内,避免饮用含酒精饮品
- C: 用牛奶服药,减少对胃肠道的刺激
- D: 服药期间,可能会发生便秘

答案: C

17. 伴发 OAB 的前列腺增生症治疗药物索利那新的不良反应是

- A: 体位性低血压
- B: 性功能障碍
- C: 加重闭角型青光眼
- D: 心动过缓

答案: C

18. 泡腾片的注意事项是

- A: 用后应漱口
- B: 不宜直接给患者服用,应溶解在水中服用,以免引起窒息
- C: 不宜在口中久含,以免影响其掩盖药物味道、控制药物在一定部位释放的目的
- D: 宜用温开水送服,直接服用会黏附在咽喉和食管壁上引起刺激、恶心等不适

答案: B

19. 瑞舒伐他汀钙的日剂量范围是()

- A: 40—200mg
- B: 5—20mg
- C: 10—20mg
- D: 10—80mg

答案: C

20. 双氯芬酸片的适宜服用时间是

- A: 餐前
- B: 餐后
- C: 餐中
- D: 早晨

答案：B

21. 血红蛋白检查结果低于正常值即提示贫血。下列检测值可提示“极重度贫血”的是

- A: $<30\text{g/L}$
- B: $>90\text{g/L}$
- C: $30\sim60\text{g/L}$
- D: $60\sim90\text{g/L}$

答案：A

22. 轻症、慢性疾病适宜选用的给药途径是

- A: 外用给药
- B: 口服给药
- C: 肌肉注射
- D: 腔道给药

答案：B

23. 患者，男，52 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：

- A: 左旋氨氯地平
- B: 氟伐他汀
- C: 雷米普利
- D: 比索洛尔

答案：C

24. 与两性霉素 B 合用在体外有拮抗作用

- A: 酮康唑
- B: 强心苷
- C: 链霉素
- D: 碳酸氢钠

答案：A

25. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 500mol/L；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 苯溴马隆
- B: 别嘌醇
- C: 丙磺舒
- D: 秋水仙碱

答案：D

26. 下列药品中，最容易吸湿的是

- A: 硫酸钠
- B: 甘油
- C: 维生素 D
- D: 乙醇

答案：B

27. 痛经伴有精神紧张者可口服

- A: 布洛芬
- B: 谷维素
- C: 阿司匹林

D: 对乙酰氨基酚

答案：B

28. 妊娠期尿路感染

A: 宜选用毒性小的抗菌药物

B: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次（同一菌株），尿细菌数 $>105\text{cfu/ml}$

C: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同

D: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再次出现菌尿，菌种与上次相同

答案：A

29. 简化治疗方案是提高患者依从性的有效方法，以下方案中最符合此原则的是

A: 注射给药方案

B: 短疗程的方案

C: 少用药的方案

D: 使用半衰期较长的药物或缓、控释制剂，每日 1 次给药

答案：D

30. 60 岁以上老年人用药剂量应酌减，一般给予成人剂量的

A: 45355

B: 45356

C: 45295

D: 45327

答案：A

31. 可提示完全梗阻性黄疸的是

- A: STB $34.2\ \mu\text{mol/L}$ ~ $171\ \mu\text{mol/L}$
- B: STB $17.1\ \mu\text{mol/L}$ ~ $34.2\ \mu\text{mol/L}$
- C: STB $>342\ \mu\text{mol/L}$
- D: STB $17.1\ \mu\text{mol/L}$ ~ $171\ \mu\text{mol/L}$

答案：C

32. 痛风急性发作期选用的抗痛风药物

- A: 呋塞米
- B: 阿司匹林
- C: 别嘌醇
- D: 秋水仙碱

答案：D

33. (2018 年真题) 射击运动员使用后, 可减慢心率, 减少心肌耗氧量, 消除比赛前紧张心理, 因此被列入兴奋剂管理的药物是 ()

- A: 硝苯地平
- B: 呋塞米
- C: 缬沙坦
- D: 普萘洛尔

答案：D

34. 患者, 男 50 岁, 血压 170/95mmHg, 伴有双侧肾动脉狭窄, 单药治疗控制血压效果不佳, 宜选用的联合用药方案是:

- A: A 受体阻滞剂+ACEI
- B: 利尿剂+AR
- C: β 受体阻滞剂+ARB
- D: 利尿剂+CCB

答案：D

35. 治疗乙型病毒性肝炎的核苷酸类药物在用法上正确的是

- A: 每天一次口服
- B: 每天两次口服
- C: 每天四次口服
- D: 每天三次口服

答案：A

36. 脑出血

- A: 2~3 周
- B: 2~4 周
- C: 1~2 周
- D: 4~5 周

答案：B

37. 审核发现用药失误的处方，药师应该

- A: 拒绝调配此处方，并依照有关规定报告
- B: 依照此处方调配药品、发出药品
- C: 修改、调配此处方并发出药品
- D: 拒绝调配此处方

答案：A

38. 粪外观所对应的疾病，阿米巴痢疾

- A: 柏油便，黑色有光泽
- B: 白陶土便
- C: 米泔水样
- D: 暗红果酱色

答案：D

39. 易经乳汁分泌药物的特性是

- A: 分子量大
- B: 弱酸性
- C: 蛋白结合率高
- D: 脂溶性高

答案：D

40. 清洁手术的预防用药时间不超过

- A: 12 小时
- B: 48 小时
- C: 6 小时
- D: 24 小时

答案：D

41. 脑出血急性期体位应注意的是（）

- A: 侧卧位
- B: 仰卧位
- C: 抬高床头 15-30°
- D: 俯卧位

答案：C

42. 常引起粪便白细胞增多的是

- A: 溶血性黄疸
- B: 细菌性痢疾
- C: 急性胰腺炎
- D: 阻塞性黄疸

答案：B

43. 钙制剂+维生素 D+双膦酸盐

- A: 原发性骨质疏松
- B: 抗癫痫药所致的骨质疏松
- C: 妇女绝经后骨质疏松
- D: 老年性骨质疏松

答案：D

44. 抗抑郁药司来吉兰用于伴前列腺增生症患者，应评判为

- A: 有禁忌证用药
- B: 无正当理由超适应证用药
- C: 联合用药不适宜
- D: 过度治疗用药

答案：A

45. 能增强华法林的抗凝作用的食物是

- A: 芒果
- B: 韭菜
- C: 地瓜
- D: 维生素 K

答案：A

46. 用 10%氯化钠注射液 9ml 加适量注射用水稀释成 90ml 的溶液，其氯化钠浓度是（）

- A: 0.009
- B: 0.1
- C: 0.01

D: 0.1

答案：C

47. 遭遇蛇类咬伤，最先采取的应急措施是

A: 用布带等在伤口的近心端 5cm 处捆住

B: 就地取材将伤口捆扎

C: 就地取材在伤口的远心端捆扎

D: 用绳索等在伤口的近心端捆扎

答案：A

48. 药师对药品不良事件、新药上市后被召回或撤市的案例应及时掌握，不能松懈

A: 替加色罗

B: 塞来昔布

C: 钆贝葡胺

D: 培高利特

答案：A

49. 重度中毒可发生中毒性肝炎，出现黄疸、出血及肝功能异常属于下列哪类药物中毒

A: 苯妥英钠

B: 氯米帕明

C: 巴比妥类

D: 阿米替林

答案：C

50. 口服补液盐(氯化钠 3.5g、碳酸氢钠 2.5g 和葡萄糖 20g，加水至 1000ml)用于中度脱水腹泻病人，成人给予 3400ml。问给予体重 10kg 的患儿口服补液盐多少克，应配制成多少毫升

A: 20.89, 800ml

B: 24.79, 950ml

C: 12.69, 485ml

D: 22.19, 850ml

答案：C

51. 注射氟马西尼，用于

A: 解救硝西泮中毒

B: 解救乙醇中毒

C: 解救丙咪嗪中毒

D: 解救可待因中毒

答案：A

52. (2015 年真题) 阿卡波糖片的适宜服药时间是 ()。

A: 餐前

B: 清晨

C: 餐中

D: 餐后

答案：C

53. 过敏性结膜炎和春季卡他性结膜炎可选用 ()

A: 氧氟沙星滴眼液

B: 七叶洋地黄双苷滴眼液

C: 色甘酸钠滴眼液

D: 玻璃酸钠滴眼液

答案：C

54. 一 2 型糖尿病患者，伴高血压、高胆固醇血症，如有胃部不适或感冒即需联合用药。对该患者的用药教育应该是适宜餐后服用的药品是

- A: 普伐他汀
- B: 呋塞米
- C: 格列美脲
- D: 阿司匹林

答案：D

55. (2018 年真题) 患者，男，72 岁，患有阿尔茨海默病，给予卡巴拉汀每日 3mg 治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是 ()

- A: 每日清晨空腹口服
- B: 每日早晚与食物同服
- C: 每日早晚空腹口服
- D: 每晚睡前口服

答案：B

56. 可作为急性胰腺炎的症状指标是

- A: 磷酸激酶降低
- B: 淀粉酶降低
- C: 磷酸激酶升高
- D: 淀粉酶升高

答案：D

57. 患者，女，37 岁，因小腹胀痛 2 月余、加重 5 天就诊。主诉就诊前无明显诱因出现小腹胀痛，阴道不规则流液，流出物呈黄色脓状，量时多时少，下腹及腰骶部间歇性坠痛。间断性院外治疗（口服金刚藤胶囊、阿莫西林胶囊，具体用量不详）。5 天前月经来潮，下腹部坠痛与腰骶部胀痛难忍，遂来院就诊。B 超提示右侧卵巢囊肿、盆腔积液。妇科检查提示外阴发育正常，阴道黏膜充血，有黄色脓性鱼腥臭味白带，宫颈肥大充血并有举痛，子宫大小正常。门诊以“急性盆腔炎、卵巢囊肿、阴道炎”收治入院。

- A: 应联合给药
- B: 应局部给药
- C: 不宜静脉给药
- D: 应单一用药

答案：A

58. 患者，男，38 岁，身高 175cm，体重 70kg。3 日前自觉全身肌肉酸痛、头疼，轻微咳嗽，自服抗感冒药物效果不佳，近 1 日觉畏寒，发热，体温 37.7℃，遂来本院就诊。检查结果：患者神清，查咽喉部红肿，扁桃腺（-），双肺呼吸音清，心脏听诊无异常，腹检无异常。血常规 WBC 正常，其他正常。诊断为：上呼吸道感染（感冒）。

- A: 葡萄糖酸辛含片
- B: 醋酸锌
- C: 布洛芬
- D: 阿昔洛韦

答案：C

59. 美金刚的作用机制为（）

- A: 抑制 N-甲基天冬氨酸受体
- B: 抑制胆碱酯酶

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 钙通道阻滞剂

D: 脑循环改善剂

答案：A

60. 某患者，女性，57 岁，高血压病史 20 年，伴慢性心功能不全，给予地高辛每日维持剂量治疗，突然出现窦性心动过缓，宜选用的治疗药物是

- A: 肾上腺素
- B: 阿托品
- C: 利多卡因
- D: 苯妥英钠

答案：B

61. 能抑制性腺，造成男性不育和女性闭经的抗风湿药物是

- A: 青藤碱
- B: 雷公藤多苷
- C: 白芍总苷
- D: 肿瘤坏死因子(TNF- α)拮抗剂

答案：B

62. 处方中“溶液”的规范书写是

- A: Liq
- B: Dos
- C: Mist
- D: Dil

答案：A

63. (2019 年真题) 患者，男，25 岁，有癫痫病史 2 年，一直服用丙戊酸钠和左乙拉西坦，癫痫控制良好，近期因社区获得性肺炎入院。

下列药物中最可能影响患者基础疾病控制的是

- A: 阿莫西林

- B: 莫西沙星
- C: 阿奇霉素
- D: 头孢曲松

答案：B

64. 主要检查均匀度、细腻度、有无异臭酸败的是

- A: 片剂
- B: 糖浆剂
- C: 胶囊剂
- D: 软膏剂

答案：D

65. 万络（罗非昔布）撤市是发现大剂量服用万络者患心肌梗死和心脏猝死的危险增加了 3 倍；此例体现了药物警戒的作用包括

- A: 发现与规避假、劣药流入市场
- B: 发现药品说明书问题
- C: 药品上市前风险评估
- D: 药品上市后风险评估

答案：D

66. （2019 年真题）患者，男，72 岁。诊断：高血压，心力衰竭，肋软骨炎。

- A: 地高辛不宜选用
- B: 地高辛剂量偏小
- C: 比索洛尔给药频次不合理
- D: 不应使用红霉素缓释胶囊

答案：D

67. 解救中毒的肾衰竭者（）

- A: 不能催吐
- B: 不能导泻
- C: 不能用强利尿剂
- D: 禁止洗胃

答案：C

68. 中成药血脂康中含有的化学药物成分是

- A: 依折麦布
- B: 洛伐他汀
- C: 阿托伐他汀钙
- D: 辛伐他汀

答案：B

69. 适用于阿司匹林哮喘伴过敏性鼻炎的预防和维持治疗的药物是

- A: 孟鲁司特钠咀嚼片
- B: 沙丁胺醇气雾剂
- C: 异丙托溴铵气雾剂
- D: 茶碱片

答案：A

70. 关于乙型肝炎病毒表面抗体的描述错误的是

- A: 大多数 HBsAg 的消失和 HBsAb 的出现，意味着 HBV 感染的恢复期和人体产生了免疫力
- B: 乙型肝炎恢复期可出现 HBsAb 阳性
- C: HBsAb 是一种保护性抗体
- D: HBsAb 是 HBsAg 的对应抗体，但非中和抗体

答案：D

71. 关于新型抗凝药物，下列说法不正确的是

- A: 达比加群酯直接作用于凝血酶(主要是 IIa 因子)
- B: 需监测 INR
- C: 可特异性阻断凝血瀑布中的某关键环节
- D: 与食物和药物相互作用小

答案：B

72. 患者，女，62 岁，医师处方如下：患者：××X，性别：女，年龄：62 岁。临床诊断：2 型糖尿病高血压 2 级高脂血症 PCI 术后。

- A: 阿卡波糖
- B: 氯吡格雷
- C: 氨氯地平
- D: 二甲双胍

答案：B

73. 因能引起畸胎或胚胎致死效应，故治疗期间和治疗 6 个月内，所有育龄期妇女和男性均须采取避孕措施的药物是

- A: 哌替啶
- B: 普萘洛尔
- C: 奥美拉唑
- D: 利巴韦林

答案：D

74. 患者，女，8 岁，体重 22kg，因出现咳嗽、呼吸困难急诊就诊，症状在 2 天内逐步加重。出现这些症状前，先出现病毒性上呼吸道感染的症状（咽喉痛、流涕和咳嗽）3 天。在过去的 2 年，患者有过几次急性支气管炎发作，并在 3 个月前因肺炎住院。患者目前未接受任何药物治疗。查体：中度呼吸窘迫伴呼气喘鸣音，偶尔咳嗽，呼气相延长，胸部过度膨胀，胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙凹陷。听诊时可闻及双侧吸气和呼气喘鸣声，左侧呼吸音减弱。呼吸 30 次 / 分、血压 110 / 83mmHg、心率 130 次 / 分、体温 37.8℃，动脉血气分析血氧饱和度（SaO₂）90%。

- A: 雾化沙丁胺醇
- B: 茶碱片
- C: 沙丁胺醇静脉注射
- D: 孟鲁司特咀嚼片

答案：A

75. 治疗时需长期口服维生素 D

- A: 抗癫痫药所致的骨质疏松
- B: 妇女绝经后骨质疏松
- C: 老年性骨质疏松
- D: 原发性骨质疏松

答案：A

76. 氟乙酰胺中毒的特效解毒剂是（）

- A: 纳洛酮
- B: 维生素 K₁
- C: 乙酰胺
- D: 青霉胺

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

77. 再生障碍性贫血、巨幼细胞性贫血可导致

A: 血红蛋白生成减少

B: 红细胞生成过多

C: 红细胞生成减少

D: 红细胞丢失过多

答案：C

78. 容易氧化的药物是

A: 牛痘菌苗

B: 胃蛋白酶

C: 阿朴吗啡、水杨酸钠

D: 青霉素类、头孢菌素类

答案：C

79. (2018 年真题) 某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮 3mg 和炔雌醇 0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A: 在取出最后一个周期包中的透皮贴剂的当天开始服用本品

B: 在取出最后一个阴道环的当天开始服用本品

C: 在服用以前所用的另种复方激素避孕药的停药期末开始服用本品

D: 在服用前一种复方激素避孕药最后一片的当天开始服用本品

答案：D

80. 某女性，19 岁，2 年前因上呼吸道感染后逐渐出现甲状腺肿大，伴多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁，根据血 T

A: 亚急性甲状腺炎

B: 甲状腺功能亢进

C: 单纯性甲状腺肿

D: 甲状腺功能减退

答案：B

81. (2018 年真题) 患者,男,65 岁,临床诊断:2 型糖尿病、周围神经病变、冠心病。

- A: 选用美托洛尔缓释片不合理
- B: 瑞格列奈片用量不合理
- C: 单硝酸异山梨酯缓释片用量不合理
- D: 选用阿卡波糖片不合理

答案: C

82. 药师发现严重滥用药品的处方, 应该

- A: 调配处方并发药
- B: 拒绝调配处方, 并依照有关规定报告
- C: 拒绝调配处方, 联系处方医师并进行干预
- D: 拒绝调配处方

答案: B

83. 对强心苷类中毒引起的快速型心律失常疗效最佳的药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 苯妥英钠
- C: 普鲁卡因胺
- D: 阿托品

答案: B

84. 以下所列腹泻类别中, 最适宜应用酶制剂的是()。

- A: 激惹性腹泻
- B: 肠道菌群失调所致的腹泻
- C: 病毒性腹泻
- D: 消化性腹泻

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/735341012114012033>