

2023-24 年甘肃省礼县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题王牌题库 附答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 主要用于抗真菌的药物是

- A: 阿糖腺苷
- B: 氟尿嘧啶
- C: 阿糖胞苷
- D: 氟胞嘧啶

答案：D

2. 患者，男，54 岁，以“咳嗽、不适、呼吸困难和喘息、咳痰逾 3 日”就诊，患者无基础疾病，近 1 周内未服用药物，诊断为支气管炎。

对该患者的经验治疗应选择

- A: 美托洛尔片
- B: 头孢克洛颗粒剂
- C: 阿奇霉素分散片
- D: 复方甲氧那明胶囊

答案：D

3. 对刺激性干咳或阵咳者宜首选

- A: 羧甲司坦
- B: 氨溴索
- C: 苯丙哌林
- D: 盐酸吗啡

答案：C

4. 以下对"发热的指标"的叙述中，不正确的是

- A: 直肠温度超过 37.6℃
- B: 腋下温度超过 36.6℃
- C: 口腔温度超过 37.3℃
- D: 腋下温度超过 37.0℃

答案：B

5. 与地西泮合用会影响其代谢导致镇静催眠作用增强的药物是()

- A: 维生素 B
- B: 铝碳酸镁
- C: 伏立康唑
- D: 阿司匹林

答案：C

6. 菌群失调性腹泻常见的病因是

- A: 外界的各种刺激，如受寒、过食辛辣食物等
- B: 直肠或结肠溃疡、肿瘤或炎症
- C: 肠道正常细菌的数量或比例失去平衡
- D: 细菌、真菌、病毒、寄生虫感染

答案：C

7. 属于脂溶性维生素的是

- A: 维生素
- B: 维生素 B1
- C: 维生素 B12
- D: 维生素

答案：D

8. 抽烟可降低呋塞米的利尿作用，其主要原因是烟草中含有

- A: 咖啡因
- B: 焦油
- C: 醛类成分
- D: 烟碱

答案：D

9. 服用药物对粪外观的影响,保泰松

- A: 黄色
- B: 红至黑色
- C: 变红或黑色
- D: 橘红至红色

答案：C

10. 根据循证医学证据分级，同质 RCT 的系统评价结果属于

- A: II a 类证据
- B: I b 类证据
- C: I a 类证据
- D: II b 类证据

答案：C

11. 患者，女，65 岁，诊断为房性心律失常，给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。

- A: 西咪替丁抑制 CYP1A2, 升高胺碘酮血浆药物浓度
- B: 胺碘酮与西咪替丁竞争 CYP2D6, 减慢胺碘酮的代谢
- C: 西咪替丁抑制 CYP3A4, 升高胺碘酮血浆药物浓度

D: 西咪替丁诱导 CYP2C9, 升高胺碘酮血浆药物浓度

答案: C

12. 导致妊娠期妇女口服药物吸收减慢，达峰时间滞后，生物利用度下降的主要原因是

A: 妊娠时雌激素分泌减少，孕激素分泌增多

B: 妊娠时体液总量和细胞外液都有所增加

C: 妊娠时胃酸分泌减少，胃肠活动减弱

D: 妊娠时胃酸分泌增多，胃肠活动增强

答案: C

13. “主要对成本进行量化分析，也同时考虑效果，用于两种或多种药物治疗方案的选择”是指

A: 成本一效益分析方法

B: 最大效果分析方法

C: 最小成本分析方法

D: 成本一效用分析方法

答案: C

14. 患者手术后，给予肠外营养液 10%GS500ml，50%GS250ml，20%脂肪乳 250ml，8.5%复方氨基酸 750ml，水溶性维生素 10ml，脂溶性维生素 10ml，微量元素 10ml，10%氯化钠注射液 40ml，10%氯化钾注射液 30ml。营养液中葡萄糖提供的能量是()

A: 700kcal

B: 450kcal

C: 200kcal

D: 1150kcal

答案: A

15. 不宜与小活络丹、香连片、贝母枇杷糖浆合用的药品是

- A: 地高辛
- B: 氯苯那敏
- C: 可待因
- D: 氨茶碱

答案：D

16. 一级信息资料的最突出优点是

- A: 内容广泛、使用方便
- B: 提供的信息丰富、详实
- C: 查阅时需要利用所提供的参考文献去验证
- D: 读者可以自己 对文献进行评价，免受他人观点的影响

答案：D

17. 1 日 1 次用药的外文规范缩写是

- A: qd
- B: qod
- C: qh
- D: qn

答案：A

18. 帕金森病患者跌倒的最常见原因为（）

- A: 神经精神障碍
- B: 体位性低血压
- C: 不安腿综合征
- D: 姿势反射障碍

答案：D

19. 患者，男，46 岁。胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝、肾功能正常，化疗方案为奥沙利铂+氟尿嘧啶+亚叶酸钙。

- A: 遇冷可加重其神经毒性
- B: 在葡萄糖溶液中稳定
- C: 其神经毒性与剂量大小无关
- D: 与氯化钠存在配伍禁忌

答案：C

20. 可能导致因心力衰竭和呼吸衰竭而死亡的是

- A: 易制毒药品
- B: 蛋白同化制剂
- C: 精神刺激剂
- D: 肽激素类

答案：A

21. 杨某，男性，25 岁，间断上腹痛 2 年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

- A: 克拉霉素？
- B: 氯化氢？
- C: 奥美拉唑？
- D: 碳酸氢钠？

答案：B

22. 给幼儿患者选用糖浆、水剂、冲剂等较合适，体现儿童用药原则中的

- A: 严格掌握用药剂量
- B: 密切监护

C: 避免食物的影响

D: 根据儿童特点选择适宜的给药方案

答案: D

23. 血小板计数正常值范围是 (/ L)

A: $(200 \sim 250) \times 10^{12}$

B: $(100 \sim 300) \times 10^9$

C: $(50 \sim 100) \times 10^9$

D: $(150 \sim 200) \times 10^{12}$

答案: B

24. 用于铜中毒的解毒剂是

A: 硫酸阿托品

B: 维生素 K₁

C: 青霉胺

D: 乙酰胺

答案: C

25. 用后不宜马上进食的剂型是 ()

A: 软膏剂

B: 含漱剂

C: 滴眼剂

D: 直肠栓剂

答案: B

26. 使用前应用原药进行皮试的药物是

A: 注射用头孢曲松钠

B: 左氧氟沙星片

C: 注射用阿莫西林

D: 阿奇霉素片

答案：A

27. (在乳汁中排泄的药物)地西泮可分布在乳汁中的机制是地西泮

A: 在脂肪与水中都有一定的溶解度

B: 呈弱酸性

C: 脂溶性高

D: 呈弱碱性

答案：C

28. 药品不良反应(ADR)的机制和影响因素错综复杂，遇到可疑 ADR 时，需要进行因果关系评价患者，男，32 岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒，立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再服用阿莫西林。该 ADR 的因果关系评价结果是

A: 很可能

B: 可能无关

C: 肯定

D: 可能

答案：A

29. 需要适当增加苯妥英、苯巴比妥的给药剂量，是由于

A: 激素分泌改变，药物代谢也受影响

B: 胃肠活动减弱，使吸收减慢

C: 血容量增加使血浆白蛋白浓度降低

D: 妊娠晚期血流动力学发生改变

答案：A

30. 磺胺类药用于抗感染不宜食用的是

- A: 脂肪
- B: 食醋
- C: 蛋白质
- D: 食盐

答案：B

31. 分析以下用药错误的事例，属于"认知缺失"的是

- A: 患者自行选购药品、误用假药、劣药
- B: 调剂工作过于繁忙
- C: 医师非主观意愿的诊断错误、造成误诊误治
- D: 新手值班以及计算机医嘱系统缺陷

答案：C

32. 治疗药物选择的基本原则及方法叙述错误的是

- A: 给药方便性可能影响患者对治疗的依从性
- B: 用药安全是药物治疗的前提
- C: 有效性是选择药物的首要标准
- D: 经济性方面主要考虑药费，排除其他治疗成本

答案：D

33. 容易在乳汁中排泄的药物的理化特性主要是

- A: 在脂肪中极易溶解
- B: 在水中容易溶解
- C: 弱酸性
- D: 分子量<200

答案：D

34. 医学检查发现柏油样黑便并有光泽，通常见于

- A: 痔疮
- B: 肛裂
- C: 胃溃疡
- D: 直肠息肉

答案：C

35. 具体写明稀释比例和使用时间，是倡导开处方环节的

- A: 医嘱清楚准确
- B: 修订医嘱及时沟通
- C: 实现个体化治疗
- D: 医嘱完整不漏项

答案：D

36. 有助于提高医、护、药专业人员对 ADR 的警惕性和识别能力；说明 ADR 监测的意义是

- A: 促进临床合理用药
- B: 促进新药的研制开发
- C: 减少 ADR 的危害
- D: 为“药品召回”提供依据

答案：A

37. 临床上将酚妥拉明 20mg、多巴胺 20mg、呋塞米 20mg 加入到 5%葡萄糖注射液 250ml 后，出现黑色沉淀。出现沉淀的原因是()

- A: 多巴胺和呋塞米发生反应
- B: 酚妥拉明和呋塞米发生反应
- C: 酚妥拉明和多巴胺发生反应
- D: 酚妥拉明在葡萄糖溶液中分解

答案：A

38. 患者，男，65 岁，诊断为持续性心房纤颤，医生处方胺碘酮和华法林治疗。患者既往有高血压、糖尿病、冠心病和高脂血症，目前正在服用贝那普利、美托洛尔、二甲双胍、阿卡波糖、辛伐他汀等药物治疗。根据患者用药情况，药师提出的合理化药物治疗建议，不包括()

- A: 胺碘酮能增加华法林的抗凝活性，在逐渐降低胺碘酮剂量的时候，注意随时根据 INR 值调整华法林的剂量
- B: 患者在复律成功后，尽可能以最小的胺碘酮剂量维持治疗
- C: 因为胺碘酮和贝那普利存在临床意义的相互作用，建议换成氨氯地平 CCB 降压药
- D: 胺碘酮可以显著抑制 CYP2D6，减慢美托洛尔的代谢，应该根据患者心率和血压调整美托洛尔剂量

答案：C

39. 主要检查均匀度、细腻度、有无异臭酸败的是

- A: 片剂
- B: 软膏剂
- C: 胶囊剂
- D: 糖浆剂

答案：B

40. 对混合型血脂异常，必须联合应用他汀类和贝丁酸类，最佳的给药方法是

- A: 早晨服用他汀类，晚上服用贝丁酸类
- B: 早晨服用贝丁酸类，晚上服用他汀类
- C: 早、晚联合服用他汀和贝丁酸类
- D: 晚上联合服用他汀类和贝丁酸类

答案：B

41. 脂溶性维生素吸收减少，是由于

- A: 肝药酶活性的个体化差异影响大于年龄的增长
- B: 肾功能随年龄增长而减退
- C: 脂肪组织随年龄增长而增加，血浆白蛋白浓度降低
- D: 胆汁分泌缺乏

答案：D

42. 下列病痛中，不适宜应用解热镇痛药治疗的是

- A: 牙痛
- B: 肌肉痛
- C: 关节痛
- D: 肠绞痛

答案：D

43. 鼻腔黏膜上有丰富的血管、黏液腺的纤毛，鼻中隔前下部也有纤密的毛细血管网，当受到刺激、过敏、感染时，鼻黏膜血管迅速扩张和肿胀，出现鼻塞。其常见病因有：感冒、慢性单纯性鼻炎、慢性鼻窦炎、过敏性鼻炎等。

- A: 双氯芬酸
- B: 伪麻黄碱
- C: 金刚烷胺
- D: 天麻素

答案：B

44. 关于匹维溴铵，下列说法不正确的为

- A: 为钙离子拮抗剂

- B: 有抗胆碱能作用
- C: 降低食管下括约肌压力
- D: 松弛胆道口括约肌

答案：C

45. 胃食管反流的患者应避免使用的药物是：

- A: 美托洛尔
- B: 他拉唑嗪
- C: 阿司匹林
- D: 阿仑膦酸钠

答案：D

46. 急性阿片类及急性乙醇中毒的特殊解毒剂

- A: 谷胱甘肽
- B: 二巯丁二钠
- C: 纳洛酮
- D: 乙酰半胱氨酸

答案：C

47. 用于香豆素类杀鼠药中毒的解毒剂是

- A: 乙酰胺
- B: 维生素 K1
- C: 青霉胺
- D: 硫酸阿托品

答案：B

48. （2015 年真题）治疗药物评价的内容，一般不包括的项目是（ ）。

- A: 依从性

- B: 安全性
- C: 经济性
- D: 有效性

答案：A

49. 对药检机构检查证明有质量问题的药品及时召回或调换即

- A: 对可疑药品进行封存
- B: 查找供货方
- C: 药品召回
- D: 反向追踪

答案：C

50. 患者，女，45 岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应首选的 NSAID 是

- A: 布洛芬
- B: 吲哚美辛
- C: 双氯芬酸
- D: 塞来昔布

答案：D

51. 检查栓剂 / 软膏剂的异嗅和散剂的气味属于

- A: 视觉试验
- B: 触觉试验
- C: 嗅觉试验
- D: 听觉试验

答案：C

52. 含右美沙芬制剂的禁用人群是

- A: 呼吸衰竭患者
- B: 孕妇
- C: 银屑病患者
- D: 青光眼患者

答案：B

53. 药物不良反应报告的描述项目

- A: 药品不良反应动态变化的相关症状体征、检查及干预措施结果
- B: 患者疾病发病时间
- C: 采取措施干预不良反应的时间
- D: 患者用药记录

答案：A

54. 医师咨询"培氟沙星合用糖皮质激素抗感染"，属于

- A: 药物相互作用
- B: 新药信息
- C: 禁忌证
- D: 给药途径

答案：A

55. 喝茶可降低多价金属离子、生物碱、苷类、胃蛋白酶、四环素类等药物的疗效，其机制主要是它们结合茶叶中的

- A: 蛋白质
- B: 茶碱
- C: 鞣酸
- D: 咖啡因

答案：C

56. 患者，女，21 岁，未婚，患有甲状腺功能亢进症，应用丙硫氧嘧啶 150mg tid 治疗 4 个月后，出现体重增加，乏力，怕冷，突眼加重，治疗方案应该调整为 ()

- A: 丙硫氧嘧啶减量并加甲状腺素片
- B: 放射性 I
- C: 加大丙硫氧嘧啶用量
- D: 换用另一种抗甲状腺药物

答案：A

57. 对痛风急性发作者不宜服用，以防发生转移性痛风的是

- A: 秋水仙碱
- B: 别嘌醇
- C: 泼尼松
- D: 苯溴马隆

答案：D

58. 治疗中度痤疮宜选用 ()

- A: 维 A 酸乳膏
- B: 阿昔洛韦软膏
- C: 氢化可的松软膏
- D: 复方苯甲酸酊

答案：A

59. 患者，女，66 岁，身高 156cm，体重 61kg。空腹血糖 7.8mmol / L，餐后血糖 11.2mmol / L，糖化血红蛋白 8.7%。

- A: 瑞格列奈片
- B: 格列美脲片
- C: 阿卡波糖片

D: 二甲双胍片

答案: C

60. 李女士，40 多岁，来药店咨询皮肤瘙痒用药。经询问和查看后得知：李女士手心皮肤干燥、脱皮，没有破裂，没有水疱和渗出（无感染征象），瘙痒严重，尤其是夜间。自述症状在逐渐加重，之前有过类似症状，但都很轻微。进一步询问得知，她最近开始在餐厅厨房工作，每天需要清洗大量碗筷。

A: 氢化可的松软膏

B: 异维 A 酸软膏

C: 复方樟脑软膏

D: 复方片仔癀软膏

答案: A

61. 抗类风湿关节炎药物中,服用 4~8 周后起效的是

A: 青霉胺

B: 柳氮磺吡啶

C: 来氟米特

D: 氯喹

答案: B

62. 可迅速崩解和释放药物的制剂

A: 泡腾片剂

B: 透皮贴剂

C: 滴丸剂

D: 膜剂

答案: A

63. 用 10%氯化钠注射液 9ml 加适量注射用水稀释成 90ml 的溶液，其氯化钠浓度是（ ）

- A: 0.1
- B: 0.1
- C: 0.009
- D: 0.01

答案：D

64. 感冒初出现卡他症状，如鼻黏膜充血、打喷嚏、流眼泪、流鼻涕，宜选服

- A: 含氢溴酸右美沙芬制剂
- B: 含伪麻黄碱及氯苯那敏制剂
- C: 含非甾体抗炎药制剂
- D: 含中枢兴奋剂咖啡因制剂

答案：B

65. 药师应对“患者投诉”，下列说法不正确的是

- A: 保存有形证据
- B: 尽快将投诉人带离现场
- C: 接待者应举止大方，行为端庄
- D: 当事人需要亲自接待

答案：D

66. 乙型肝炎病毒感染后在血清里最早出现的是

- A: HBcAb
- B: HBsAg
- C: HBsAb
- D: HBeAb

答案：D

67. 下列药物中，能解救香豆素类灭鼠药中毒的是

- A: 维生素 B
- B: 乙酰胺
- C: 维生素 K
- D: 阿托品

答案：C

68. 下列治疗良性前列腺增生症的药物中，可以引起性功能减退的是

- A: 索利那新
- B: 奥昔布宁
- C: 托特罗定
- D: 非那雄胺

答案：D

69. （2018 年真题）干眼症可选用（）

- A: 氧氟沙星滴眼液
- B: 色甘酸钠滴眼液
- C: 玻璃酸钠滴眼液
- D: 七叶洋地黄双苷滴眼液

答案：C

70. 急诊处方印刷用纸为

- A: 淡黄色
- B: 淡绿色
- C: 白色
- D: 淡红色

答案：A

71. 主要对成本进行量化分析、也同时考虑效果，用于两种或多种药物治疗方案的选择是指

- A: 成本-效益分析
- B: 最小成本分析
- C: 最大效果分析
- D: 成本-效用分析

答案：B

72. 根据病原体、传播和症状的不同分为上呼吸道感染(上感)和流行性感冒(流感)。上感和流感在一年四季均可发病，尤以冬、春季较为多见。

- A: 严重高血压
- B: 牙龈肿胀
- C: 膀胱颈梗阻
- D: 血糖升高

答案：A

73. 患者，女，60 岁，现病史：近日因摔倒而致左腕骨骨折。骨科处理；因背痛加重接受口服止痛治疗。骨密度已 L1~L4 椎体 T 值-2.7SD，BMD749(mg / cm²)；股骨颈 T 值-2.2SD，BMD602(mg / cm²)。医生诊断为：绝经后骨质疏松症。

- A: 甲状旁腺素
- B: 双膦酸盐
- C: 氟制剂
- D: 钙制剂

答案：B

74. 人体健康参数：肥胖的腰围标准是

- A: 男性>95cm，女性>85cm
- B: 男性>90cm，女性>85cm
- C: 男性>90cm，女性>80cm
- D: 男性>85cm，女性>80cm

答案：B

75. 某女孩，6 岁，2 个月来反复出现突发突止的意识障碍，表现为突然动作中断，呆立凝视、呼之不应，手中物体掉落。但从不跌倒，持续数秒钟可缓解。

- A: 肝功能
- B: 血尿酸
- C: 血糖
- D: 肾功能

答案：A

76. 以下有关肌酸激酶检查值升高的临床意义中，最正确的是

- A: 诊断痛风
- B: 诊断心肌梗死
- C: 诊断恶性贫血
- D: 诊断急慢性白血病

答案：B

77. 6 个月～2 岁儿童的白细胞计数的正常范围值

- A: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$
- B: $(10.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$
- C: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$

D: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9/L$

答案：D

78. 应用 α -葡萄糖苷酶抑制药时注意事项错误的是

- A: 餐后服用可减少胃肠道刺激
- B: 服用后常致胀气，可缓慢增加剂量和控制饮食减轻
- C: 与胰岛素或磺脲类药联合应用，可增加发生低血糖的危险
- D: 非磺酰脲类胰岛素促泌剂与 α -葡萄糖苷酶抑制药合用易出现低血糖现象

答案：A

79. 三叉神经痛，应选的药物是

- A: 对乙酰氨基酚片
- B: 卡马西平片
- C: 芬太尼透皮贴剂
- D: 羟考酮缓释片

答案：B

80. 非药物治疗慢性阻塞性肺病的主要措施是

- A: 戒烟
- B: 减少体重
- C: 户外锻炼
- D: 咳嗽

答案：A

81. 沿静脉出现迂回线状色素沉着

- A: 氟尿嘧啶
- B: 白消安

C: 博来霉素

D: 柔红霉素

答案: A

82. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mg tidpo，阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 停用阿托伐他汀钙片

B: 停用二甲双胍肠溶片

C: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片

D: 停用瑞格列奈片

答案: A

83. 妊娠早期妇女使用可能引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的药物是

A: 辛伐他汀

B: 苯妥英钠

C: 沙利度胺

D: 甲氨蝶呤

答案: C

84. 关于丁螺环酮治疗焦虑症的优点，下列说法不正确的为

A: 较少引起运动障碍

B: 起效快

C: 镇静作用轻

D: 无呼吸抑制

答案: B

85. 对于绝经综合征患者，可根据患者的病情或用药需求，采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗（MHT）

- A: 戊酸雌二醇 / 雌二醇-醋酸环丙孕酮片
- B: 17 β -雌二醇
- C: 雌二醇-屈螺酮片
- D: 雌二醇 / 雌二醇-地屈孕酮片

答案：B

86. 二甲双胍片的适宜服药时间是

- A: 餐后
- B: 餐前
- C: 餐中
- D: 清晨

答案：C

87. 药物相互作用是双向的，既可能产生对患者有益的结果，使疗效协同或毒性降低；也可能产生对患者有害的结果，使疗效降低和毒性增强，有时会带来严重后果，甚至危及生命。

- A: 铁剂联用维生素
- B: 阿托品联用普萘洛尔
- C: 阿托品联用吗啡
- D: 山莨菪碱联用哌替啶

答案：D

88. 阿托品联用氯解磷定解救有机磷重度中毒的机制是

- A: 作用于不同的靶点
- B: 竞争性拮抗作用

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 延缓或降低抗药性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/736042225105011030>