北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科试题》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：男性患者，因外伤致股骨内外踝骨折，关节面不平，相差 0.8cm，虽经治疗，骨折移位未见改变，最可能出现的晚期并发症是（　）。A.骨化性肌炎

B.压疮

C.膝关节创伤性关节炎

D.膝关节僵硬

E.膝关节外翻

2、单项选择题：肌电图或诱发电位，主要是检查（　）。A.肌肉损伤

B.肌腱损伤

C.骨关节损伤

D.炎症

E.周围神经损伤

3、单项选择题：病人膝关节轻度屈曲时胫骨前方受到外力，伤后膝关节疼痛、肿胀，X 线片发现胫骨平台前方有游离骨块，前抽屉试验阳性，常用的手术内固定方法是（　）。A.螺钉固定

B.钢丝固定

C.克氏针固定

D.摘除游离骨块

E.以上都不是

4、单项选择题：对开放性骨折正确的处理是（　）。A.清除所有的污物

B.清除所有坏死组织

C.最好不用止血带

D.去除所有游离骨块

E.不宜使用毛刷刷洗骨端

5、单项选择题：一少年无意间发现左膝内下有一硬性肿物Ⅰ　　B.肾挫伤

C.脂肪栓塞

D.出血性休克

E.损伤性骨化

8、单项选择题：人工髋关节置换时，髋臼外展角应为（　）。A.40～50

B.大于 60

C.小于 40

D.40～60

E.30～40

9、单项选择题：石膏或夹板固定后，最应注意的是（　）。A.松脱

B.骨折再移位

C.压迫性溃疡

D.血循环受阻

E.石膏变形

10、单项选择题：青年男性病人，腰痛、僵硬，逐渐出现驼背，X线片见骶髂关节模糊，间隙消失，可能诊断是（　）。A.慢性腰扭伤

B.腰肌劳损

C.腰椎结核

D.腰椎间盘突出症

E.强直性脊柱炎

11、单项选择题：在臂丛神经损伤的临床表现中，以下叙述错误的是（　）。A.臂丛上干损伤多见

B.霍纳综合征为可有可无的体征

C.臂丛完全性损伤运动障碍表现为手、前臂、上臂肌肉全瘫

D.臂丛神经完全性损伤感觉障碍为手、前臂、上臂感觉完全丧失

E.臂丛下部损伤，多因上肢过度上抬外展造成

12、单项选择题：下述有关颈髓脊髓休克的论述错误的是（　）。A.脊髓突然失去高位中枢的调节，进入暂时的无反应状态

B.脊髓休克期内损伤平面以下呈弛缓性瘫

C.反射恢复后屈肌反射往往增强

D.反射恢复的顺序是由近及远，由高至低

E.脊髓休克期的长短与年龄有关，小儿较成人短

13、单项选择题：一矿工因矿山倒塌，右上肢被压于矿石下2小时，出现右手垂腕垂指，虎口处感觉减退，电生理检查正常，诊断为桡神经损伤，其损伤类型为（　）。A.神经断裂

B.神经失用

C.神经刺激

D.神经挫伤

E.轴突断裂

14、单项选择题：有关骨折功能复位的标准应除外（　）。A.旋转及分离移位必须完全矫正

B.向侧方成角与关节活动方向一致可自行矫正

C.前臂双骨折要求对位对线都好

D.长骨干要求对位至少1/3，干骺端对位要求达3/4左右

E.成人下肢短缩大于1cm，前后成角大于15

15、单项选择题：化脓性关节炎后期关节已有破坏与增生，强直已不可避免时，最恰当的治疗方法是（　）。A.避免负重

B.加强活动

C.固定于功能位

D.行关节融合术

E.物理疗法

16、单项选择题：右前臂尺桡骨开放性骨折，清创复位，石膏外固定后36小时，患者高热，脉快，白细胞计数明显增高，伤口有大量恶臭渗出液，X线片显示皮下有气体，触诊有握雪感，应首先考虑（

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/736104010021010123