

## 望谟县人民医院神经外科试题

### 第一篇：望谟县人民医院神经外科试题

县人民医院

2014 年临床医师“三基三严”考试试题（神外）

科室姓名得分

一、本试卷为单项选择题（共 50 题，每题 2 分，共 100 分，请把答案填进以下表格）

1. 处理头部创伤时，必须遵循的外科原则是()

A. 头皮下出血点必须一一结扎 B. 尽量切除可能污染的头皮创缘组织

C. 伤口一律全层缝合 D. 大块的头皮缺损只能留作二期处理

E. 清创术应争取 8 小时内进行，一般不得超过 24 小时

2. 治疗大型帽状腱膜下血肿的最好方法是()

A. 待其自行吸收 B. 用止血药，加压包扎

C. 穿刺抽血，防止感染 D. 切开引流，防止

E. 穿刺抽血后加压包扎，防止感染

3. 头部外伤后昏迷半小时，患者醒后即发现右侧肢体轻瘫，腰穿呈血性脑脊液，以后逐渐好转。最可能的诊断是()

A. 脑震荡 B. 脑挫伤 C. 急性硬脑膜外血肿

D. 急性硬脑膜下血肿 E. 脑内血肿

4. 一青年工人右侧颞枕部被石块击伤后昏迷 10 分钟，摄片时有右颞骨骨折，清醒 3 小时后又转入昏迷，逐渐伴右侧瞳孔散大，左侧肢体瘫痪。此时最好的处理是()

A. 开颅探查，右侧额部入路 B. 开颅探查，右侧颞部入路

C. 开颅探查，右侧枕顶部入路 D. 开颅探查，左侧额颞入路

E. 继续脱水利尿，应用激素治疗

5. 一学生上学途中被自行车撞倒，右颞部着地，当时不省人事达 20 分钟，醒后轻微头痛，四肢活动自如，次日感头痛加重，呕吐数次，嗜睡而来就诊。下列哪种处理最好()

A . 给予镇痛处理，休息 1 周 B . 给予止呕处理，休息 1 周 C . 口服镇痛、激素药物，休息 1 周 D . 给予口服脱水、利尿药

E . 给予脱水利尿治疗，同时进一步检查

6 . 颅脑外伤后伴意识障碍加深，逐渐出现一侧瞳孔散大，光反射消失，眼球活动受限，其损伤机理最可能是()

A . 视神经管骨折损伤视神经 B . 颅底骨折损伤动眼神经

C . 颞叶钩回疝使动眼神经受压 D . 脑干挫伤出血损伤动眼神经核

E . 视放射或枕叶黄斑部损伤

7 . 急性硬脑膜外血肿患者中间清醒期的长短主要取决于()

A . 原发性脑损伤的轻重 B . 出血的来源

C . 血肿的部位 D . 血肿形成的速度

E . 血肿量的大小

8 . 急性硬脑膜外血肿 CT 扫描的典型表现是()

A . 楔形低密度区 B . 梭形高密度区

C . 片状混杂密度区 D . 环形低密度区

E . 半月形高密度区

9 . 外伤性颈内动脉海绵窦瘘的典型临床特征中，下列哪项是错误的()共 5 页 第页 1

A . 患侧搏动性突眼 B . 患侧有颅底骨折，触诊有眼球震颤

C . 眼球活动受限，眼睑结膜充血水肿 D . 压迫患侧颈总动脉可使血管杂音增强

E . 伤后颅内血管杂音节律与心跳相一致

10 . 治疗颅顶骨折的原则应除外()

A . 粉碎凹陷性骨折刺破硬脑膜需及时清创手术

B . 线形骨折本身无需手术治疗，但应注意并发颅内血肿

C . 婴儿凹陷性骨折必须早期复位

D . 静脉窦区凹陷骨折复位时应警惕大出血

E . 颞骨骨折并发硬膜外血肿常需手术治疗

11 . 下列哪种情况不宜作腰椎穿刺()

A . 脑震荡后头痛加重 B . 脑挫伤后头痛加重

C . 颅底骨折并发脑脊液漏 D . 外伤性蛛网膜下腔出血  
E . 外伤后颅内感染 , 脑脓肿形成 12 . 颞顶部急性硬脑膜外血肿  
的临床表现应除外()

- A . 意识变化常在瞳孔变化之前
- B . 血压升高、脉搏变慢可随意识障碍同时出现
- C . 血压下降、脉搏细数常在患侧瞳孔散大之后出现
- D . 呼吸不规则、骤停常在意识障碍和瞳孔散大之后出现
- E . 瞳孔首先散大的一侧常与血肿同侧

13.抢救枕骨大孔疝(脑室系统扩大者)最有效的急救措施首选( )

- A.20%甘露醇 250mL
- B.尽快行去骨瓣减压术
- C.快速椎颅钻孔穿刺脑室额角行脑脊液外引流术
- D.快速静脉滴注地塞米松 20mg
- E.气管切开,保持呼吸道通畅

14.对颅高压的处理中下列哪项最危险( )

- A.不限制出入水量
- B.不规则使用利尿脱水剂
- C.未服用镇静止痛药
- D.侧脑室穿刺行脑脊液外引流
- E.腰穿放出脑脊液减压

15.下列颅内占位性病变中最易早期出现颅压增高症状的是( )

- A.第三脑室后部肿瘤
- B.枕叶肿瘤
- C.颅前窝底部肿瘤
- D.矢状窦旁肿瘤
- E.听神经瘤

16.颅高压增高的三主征是( )

A.头痛、呕吐、眩晕 B.头痛、呕吐、癫痫 C.头痛、呕吐、视乳头  
水肿

- D.头痛、呕吐、复视
- E.头痛、呕吐、精神症状

17.急性枕骨大孔疝与小脑幕裂孔疝最主要的区别是( )

- A.意识障碍发生较早
- B.呼吸骤停发生较早
- C.剧烈头痛
- D.频繁呕吐
- E.Cushing 反应

18.左侧小脑幕裂孔疝的典型临床表现是( )

A.昏迷、左侧瞳孔散大、右侧肢体偏瘫 B.昏迷、右侧瞳孔散大、  
左侧肢体偏瘫

- C.嗜睡、左侧瞳孔散大、左侧肢体偏瘫
- D.嗜睡、右侧瞳孔散大、

右侧肢体偏瘫

E.昏迷、双侧瞳孔散大、去脑强直发作

19.急性外伤性颞顶部硬膜外血肿最常见的出血来源于( )

A.颅骨板障静脉出血 B.静脉窦破裂出血 C.颅骨导静脉出血

D.硬脑膜中动脉破裂出血 E.脑表面血管出血

20.从高空坠落左枕部着地伤后进行性意识障碍、右侧瞳孔逐渐散大。诊断上应

首先考虑为( )

A.右侧顶枕部急性硬脑膜下血肿 B.左侧顶枕部急性硬脑膜下血肿

C.右侧额颞极挫伤伴急性硬膜下血肿 D.左侧额颞极挫伤伴急性硬膜下血肿

E.右侧额后窝小脑血肿

21.头部外伤后昏迷 1 小时即发现右侧肢体轻瘫，腰穿呈血性脑脊液，以后逐渐

好转恢复。应考虑为( )

A.脑震荡 B.脑挫伤 C.脑内血肿 D.急性硬膜外血肿 E.急性硬膜下血肿

22.诊断颅底骨折的确切依据是伤后出现( )

A.鼻腔或外耳道有血性脑脊液 B.皮下淤血斑(眼睑或结合膜下或耳后)外流

C.鼻腔或外耳道流血 D.颅神经损伤的症状与体征

E.颅骨 X 线照片有颅顶骨折线向颅底部延伸

23.女，7 岁，头痛、呕吐、走路不稳 20 天。体查嗜睡，双侧视神经乳头水肿明

显，Romberg 征(+)。最可能的诊断是()

A.恶性淋巴瘤 B.室管膜瘤 C.髓母细胞瘤

D.脑膜瘤 E.血管网状细胞瘤

24.老年患者临床及 CT 诊断为脑转移瘤，其最常见的原发癌来源于哪个部位

()

A . 皮肤 B . 结肠 C . 前列腺 D . 肺脏 E . 肾脏

25 . 以下哪项不是动眼神经所支配()

A.内直肌 B.外直肌 C.上直肌 D.下直肌 E.瞳孔括约肌

26.临床神经外科最常见的病理综合征是()

A.颅内肿瘤 B.脑积水 C.颅内炎症 D.颅脑损伤 E.颅内压增高

27.正常脑血流量维持主要决定于()

A.保持颅内静脉回流畅通 B.颅内压不超过 4kPa C.血压在正常水平

D.保持适当的脑灌注压,最低不小于 5.3kPa

E.动脉血中二氧化碳分压维持在 5.3kPa

28.交叉性感觉障碍和(或)交叉性瘫痪是哪一部位占位性病变所致()

A.额叶 B.颞叶 C.顶叶 D.脑干 E.蝶鞍区

29.闭合性颅脑损伤早期治疗要点是()

A.防止休克 B.防止癫痫 C.气管切开 D.控制水入量

E.防止脑水肿和颅内血肿

30.颅底骨折通常的诊断依据是()

A.头颅 X 线片 B.头痛伴呕吐 C.临床表现 D.头颅 CT E. 意识障碍

31.下列哪项不符合原发性脑干损伤的临床特点()

A 受伤后立即出现深昏迷 B.瞳孔不等大

C.意识障碍一般不超过 30 分钟 D.生命体征的紊乱

E.四肢肌力的异常

32.治疗颅底骨折引起的脑脊液漏时,错误的方法为()

A.保持鼻腔和外耳道清洁 B.用醋氨酰胺 C.使用棉球填塞鼻腔或外耳道

D.限制液体入量 E.头抬高 30°卧向患侧

33.发生小脑幕切迹疝时,引起患者昏迷的直接原因是()

A.脑缺氧 B.脑缺血 C.呼吸循环障碍 D.脑干受压

E.脑脊液循环受阻

34.与语言有关的中枢是()

A.额中回后部 B.颞上回中部 C.钩回附近 D.扣带回 E.舌回

35.颅内最常见的恶性和良性肿瘤是()

- A.神经胶质瘤和颅咽管瘤 B.转移瘤和脑膜瘤
- C.神经胶质瘤和血管瘤 D.转移瘤和神经纤维瘤
- E.神经胶质瘤和脑膜瘤

36.既往高血压,突发昏迷,呕吐出咖啡样胃内容物。检查:一侧肢瘫痪。最可能的诊断是()

- A.多发性脑栓塞 B.脑血栓形成 C.脑出血 D.短暂脑缺血发作 E.癫痫持续状态

37.在脑中心疝的治疗中,哪一期为抢救治疗的关键时期()

- A.间脑期 B.中脑期 C.中脑—脑桥上上部期 D.脑桥下部—延髓期
- E.延髓期

38.男性,挤压上面部疖肿后出现发热 5d,伴头痛,复视,神志清,眼周软组织红肿,球结膜水肿,右眼球突出.眼眶部压痛和眼球固定,左眼球外展轻度受限,右侧额部针刺觉减退。最可能的诊断是()

- A.大脑静脉血栓形成 B.海绵窦血栓形成 C.上矢状窦血栓形成 D.直窦血栓形成 E.乙状窦血栓形成
- 39.患者,男性,66岁,高血压病史13年,突感眩晕.呕吐.言语不清。查体:声音嘶哑.饮水呛咳.言语含糊,左眼裂小.瞳孔小.有水平眼震.左面部及右半身痛觉减退,左侧指鼻试验不准。最可能的诊断是()

- A.左侧小脑上动脉血栓形成 B.右侧小脑后下动脉血栓形成 C.右侧小脑上动脉血栓形成 D.左侧小脑后下动脉血栓形成 E.左侧大脑前动脉血栓形成
- 40.下列哪项不是凹陷性骨折的手术指征()

- A、有颅高压症状 B、开放性骨折 C、引起偏瘫
- D、静脉窦处凹陷性骨折,无明显颅高压症状

41.根据颅内血肿引起颅高压或早期脑疝症状所需的时间,急性期血肿是指

()

- A.<3 h B.<3 日 C.3 日至 3 周 D.>3 周

42.发生小脑幕切迹疝时,下列哪项通过小脑幕切迹被推移至幕下()

- A.额叶直回 B.颞叶钩回 C.中央前回 D.扣带回

43.正常成人颅内压为()

A.7 ~ 20 mmHg B.5 ~ 20 mmH<sub>2</sub>O C.0.5 ~ 1.0 kPa D.0.7 ~ 2.0 kPa

44.自发性 SAH 病人，其最常见的病因是()

A.颅内动脉瘤 B.脑血管畸形 C.脑动脉硬化 D.烟雾病

45.60 岁女性患者，头部棍击伤，无昏迷及意识障碍，无颅骨骨折。

1 个月后出现颅高压症状。最可能的诊断是()

A.慢性硬膜外血肿 B.多发颅内血肿 C.慢性硬膜下血肿 D.脑外伤后遗症

46.50 岁男性患者，2 h 前被木棒击伤左颞部，伤后头痛.呕吐，1 h 前意识不清。PE 中度昏迷，左瞳散大，右侧肢体病理征 (+)。诊断考虑为() ( )

A.颅骨凹陷性骨折伴脑疝 B.急性硬膜外血肿伴脑疝

C.急性硬膜下血肿伴脑疝 D.脑挫裂伤伴脑疝

女，28 岁，月经不规则 2 年，闭经 8 个月，发现溢乳 4 个月，头痛 1 个月，曾按“子宫发育不全”治疗无效，经妇科检查子宫附件未见异常，而来神经外科门

诊。体查()肥胖体型，神清，眼底视神经乳头未见异常，其他神经系统检查也未见异常，双乳房发育中等，乳晕色浅，触压有稀薄乳溢出。

47.该患者进一步确诊的辅助性检查项目是()

A.颅脑超声波探测 B.脑电图

C.颅骨侧位片及蝶鞍断层片 D.腰椎穿刺测压行脑脊液常规.生化检查 E.促卵泡刺激素.促黄体生成素含量测定

入院后行血清内分泌素含量测定，T<sub>2</sub>.T<sub>4</sub> 检查及 24 小时尿 17-羟.17-酮测定未回报结果。行 CT 扫描见鞍内有 19.6×14.8mm 稍低密度区，增强扫描有轻度强化，鞍隔膨隆。

48.该患者最可能的诊断是()

A.颅咽管瘤 B.GH 腺瘤 C.PRL 腺瘤 D.ACTH 腺瘤 E.FSH 腺瘤 患者行鞍区肿瘤切除术后第 2 天，出现意识障碍。

49.除哪项外下列原因均有可能()

A.垂体前叶功能减退 B.尿崩症 C.颅内血肿 D.脑水肿 E.脑

积水经 CT 复查，未发现颅内血肿及脑积水。

50.考虑下一步治疗措施时，下列哪项是错误的()

- A . 脑水肿采用脱水剂 B . 注意纠正水和电解质酸碱平衡紊乱
- C . 注意保持呼吸道通畅
- D . 发现术前术后未用肾上腺皮质激素应及时静脉给予补充
- E . 考虑糖代谢障碍，用 10%葡萄糖溶液加以补充

## **第二篇：资中县人民医院神经外科**

资中县人民医院 外四科—神经外科简介

资中县人民医院外四科（神经外科）现有神经外科专科医生 4 名。其中副主任医师 1 名，主治医师 1 名，住院医师 2 名。对各类神经外科疾病具有丰富的临床经验，尤其是对高血压脑出血的微创治疗在内江地区具有领先水平。

我科拥有先进的仪器设备。现有德国蛇牌双极电凝两台，西山开颅动力系统一台，天津希翼开颅动力系统一台，德国莱卡手术显微镜一台及德国 DORO 多功能头架一套。

我科开展各类神经系统疾病的诊治，并取得了丰硕的成果。一是各种类型颅脑损伤的救治：包括轻中重型脑挫裂伤、弥漫性轴索损伤、脑内血肿、急慢性硬膜外/下血肿、颅骨骨折复位及颅骨缺损修补成形、脑积水分流等。二是脑血管病的诊治：主要开展高血压脑出血、脑血管畸形的开颅手术及微创软通道治疗。三是颅脑及椎管肿瘤的诊治：主要包括脑膜瘤、胶质瘤、颅骨肿瘤、头皮肿瘤、椎管内肿瘤。同时开展了脑积水、颅底畸形等疾病的手术治疗等。

外四科 2016 年 4 月

## **第三篇：神经外科出科试题**

住院医师规范化培训轮转考核（理论考试）

基地名称：

住培医师姓名：

轮转科室：

轮转时间：

得分：

考试时间：

专科教学秘书签名：

专科教学主任签名：

一．选择题（共 60 分）

1.患者男性，60 岁，突发头痛、恶心、呕吐 2 周，伴左侧肢体活动欠灵活。患者 1 年前行右肺上叶恶性肿瘤切除术，无发热，无抽搐。根据此病史首先考虑诊断的疾病是

A.缺血性脑血管病 B.肺癌脑转移 C.高血压危象 D.慢性硬膜下血肿  
E.胶质细胞瘤

2.患者男性，65 岁。突发昏迷 3 小时。查体：深昏迷，双瞳孔散大，频繁出现去脑强直。CT 示脑池及脑室内高密度影。按 Hunt&Hess 分级应为

A. I 级 B. II 级 C. III 级 D. IV 级 E. V 级

3.患者女性，60 岁。癫痫发作 3 周，近 1 周头疼、恶心、呕吐，一过性右侧肢体无力，无发热，二便正常。6 年前右乳腺癌切除术。CT 显示左额大片低密度，有明显占位效应。根据所提供病历进行鉴别诊断，首先考虑诊断的疾病是

A.脑转移瘤 B.V 脑胶质瘤 C.脑梗死 D.脑膜瘤 E.脑炎

4.患者男性，19 岁，高空坠落伤。查体：BP70/50mmHg，HR100 次/分，躁动，双瞳孔等大，对光反应阳性，腹腔穿刺抽出未凝血液，头部 CT 检查示左额硬脑膜下血肿，血肿量约 25ml，中线无明显移位。该病例的最佳处理方案是

A.立即开颅清除血肿 B.抗休克治疗的同时行开颅血肿清除术 C.抗休克治疗的同时先行开腹探查 D.抗休克治疗至血压正常后再行手术 E.开颅及开腹探查同时进行

5.患者女性，63 岁。突发头痛 3 天，经脑血管造影发现右侧颈内动脉后交通动脉动脉瘤。经脱水止血治疗病情好转。发病第 8 天意识障碍加重。查体：右侧瞳孔扩大，光反射迟钝，左侧肢体肌力 II 级，肌张力低下，巴氏征阳性。最可能的诊断是

A.动脉瘤再破裂出血 B.脑血管痉挛 C.脑血栓形成 D.小脑幕切迹疝

E.高血压脑出血 6.患者女性，13岁。自幼发育差。突发头痛、呕吐1周，查体：体温39℃，神清，颈强直，右侧肢体肌力4级，肌张力高，心前区可闻杂音。初步考虑诊断为

A.脑膜炎 B.偏头痛 C.脑肿瘤 D.脑脓肿 E.脑出血

7.患者女性，65岁。头痛、恶心、呕吐3周。4年前行左乳腺癌切除术。神清，精神差，双视乳头边缘不清，右巴氏征(+)。诊断首先考虑

A.脑胶质瘤 B.脑膜瘤 C.颅内继发性肿瘤 D.脑脓肿 E.脑膜脑炎

8.患者男性，65岁。反复发作性右侧肢体偏瘫，伴言语不能，6~13小时后恢复正常。头颅CT(-)。应诊断为

A.进展性卒中 B.脑血管痉挛 C.TIA D.可逆性缺血性神经功能缺失 E.完全性卒中

9.患者男性，40岁，肢端肥大症，经蝶垂体瘤切除后3个月，临床症状无明显缓解，MRI复查肿瘤残留甚少，但血中GH值12ng/ml，此时应采取

A.经蝶再次手术 B.开颅再次手术 C.放射治疗 D.药物治疗 E.继续观察

10.患者女性，40岁，双下肢麻木乏力1年，体检：双下肢肌力Ⅲ级，胸8以下痛、温觉减退确诊的首选检查是

A.颈椎MRI B.胸椎MRI C.头颅CT D.头颅MRI E.胸椎X线

11.如双下肢麻木乏力是从下向上发展的，病变定位应考虑在

A.旁中央小叶 B.脊髓髓内 C.脊髓髓外 D.顶叶运动区 E.以上都不是

12.患者男性，56岁，头部摔伤1月，头痛、呕吐3天，CT示右颞顶新月形等密度病灶，中线轻度移位。最可能的诊断是

A.慢性硬膜外血肿 B.慢性硬膜下血肿 C.亚急性硬膜外血肿 D.亚急性硬膜下血肿 E.硬膜下水瘤

13.治疗首选

A.开颅血肿清除术 B.去骨瓣减压术 C.钻孔引流术 D.保守治疗 E.以上都不对

14.患者男性，42岁，间断头痛一年以晨起时重，近一个月病情加重伴呕吐。查体：双眼底视乳头水肿，左眼外展不全，右侧肢体肌力Ⅳ级，右侧Babinskis征阳性，最可能的诊断是

A.脑出血 B.脑肿瘤 C.脑脓肿 D.脑梗死 E.脑膜炎

15.此时应选择辅助检查为

A.头颅平片 B.腰穿检查 C.头颅 CT D.脑血管造影 E.脑电图

16.患者因头痛、头晕 20 天，加重伴烦躁、频繁呕吐 1 天入院。入院体检：生命体征不平稳。头部 MRI 显示第四脑室肿瘤伴幕上脑室扩大.患者可能发生的脑疝是

A.脑中心疝 B.小脑幕切迹疝 C.小脑幕切迹上疝 D.枕骨大孔疝 E.大脑镰疝 17.如术前突发脑疝，最有效的措施是

A.高压灌肠 B.使用脱水药 C.腰穿放脑脊液 D.给予镇静、止痛药 E.脑室穿刺引流 18.脑脊液快速流出后病人突然昏迷，双瞳散大，光反应迟钝。首先考虑的原因可能为 A.肿瘤卒中 B.穿刺损伤 C.小脑幕切迹上疝 D.休克 E.低颅压

19.患者男性，64 岁，头痛、呕吐三个月，1 天前癫痫发作一次，发作后左侧肢体瘫痪，12 小时后肌力恢复。既往体健。查体：神清，记忆力减退，双眼底视乳头水肿，左侧偏身感觉障碍，左下肢病理征阳性。MRI：见右颞顶一形态不规则混杂信号境界不清病灶，周围脑组织水肿明显。增强扫描：肿瘤呈不均匀强化.据上述临床资料，该病人的诊断应首先考虑为

A.转移瘤 B.低级别胶质瘤 C.高级别胶质瘤 D.脑脓肿 E.恶性淋巴瘤 20.下述哪项影像学表现与判断决策的关系不大

A.肿瘤中有坏死与囊变 B.边界不规则但强化明显 C.病灶整体强化不均匀 D.瘤周水肿明显 E.病灶累及皮层下

21.患者病程中出现癫痫发作后，出现肢体偏瘫，这一现象称为 A.Jackson 发作 B.Todd 麻痹 C.Gerstmann 综合征 D.Brun 征 E.精神运动性发作 22.如果治疗方案中首先准备切除右颞顶强化病灶、术后辅以放疗及化疗，则可达到的目的中不包括 A.明确病理诊断 B.减少肿瘤体积 C.改善症状，缓解颅内压 D.延长生命，为综合治疗创造时机 E.防止肿瘤进一步播散

23.如要检查手术切除效果及肿瘤残留情况，MRI 强化检查应选择时机最好为

A.术后 48 小时内 B.术后 72 小时内 C.术后一周内 D.术后二周内 E.术后三周内 24.患者女性，40 岁。车祸伤后 1 小时，伤后昏迷入院。

查体：GCS7分，瞳孔左：右=4mm：2mm，左侧光反应消失，右侧肢体偏瘫。BP170/100mmHg，HR60次/分，R12次/分。对诊断最有价值的检查是 A.头颅平片 B.脑血管造影 C.腰穿 D.脑超声多普勒 E.头CT 25.检查显示：左额、颞底面广泛脑挫裂伤伴左额、颞叶脑内血肿，量约60ml，同侧脑室受压，中线向右移位1.5cm，考虑受伤出血的机制为

A.左额、颞部位的冲击伤所致 B.左额、颞部位的加速性损伤所致 C.左枕部的加速性损伤所致 D.右枕部的减速性损伤所致 E.以上均正确 26.针对该病人，最适宜采取的治疗措施为

A.绝对卧床休息 B.对照CT观察 C.腰穿放液减压 D.大量应用激素 E.急症开颅手术 27.患者男性，40岁。因言语不利、颈肩痛并双手肌肉萎缩4年入院。体检：神清，吟诗样语言，面部不对称，后发际低，双侧C4-T3节段性分离性感觉障碍，双手鱼际肌萎缩。本病例首先考虑诊断为 A.颈段髓外硬膜下占位性病变 B.颈胸段脊髓空洞症 C.颈椎管狭窄 D.小脑扁桃体下疝畸形 E.颈胸段脊髓髓内肿瘤 28.确诊的首选检查是

A.头颅平片 B.脊髓碘水造影 C.腰穿+动力试验 D.头、颈部MRI E.颈椎平片 29.一经明确诊断，应选择的治疗是

A.颈椎管减压术 B.脊髓肿瘤切除术 C.后颅凹减压术 D.脊髓空洞分流术 E.后颅凹减压+脊髓空洞分流术

30.患者女性，52岁，左眼视力减退，合并突眼半年，查体左眼IV、VI神经麻痹，角膜反射消失，CT及MRI检查，考虑为蝶骨嵴内侧型脑膜瘤，直径约3cm为了明确诊断还应进行的检查是 A.头颅平片正侧位 B.蝶鞍断层X线摄影 C.脑血管造影 D.视觉诱发电位 E.磁共振血管成像检查(MRA) 二.名词解释(共20分) 1.颅内压增高：

2.小脑幕切迹疝：

三.病例分析题

患者男性，56岁，头部摔伤1月，头痛、呕吐3天，CT示右颞顶新月形等密度病灶，中线轻度移位。1.最可能的诊断是： 2.诊断分析：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/737052132063006036>