专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024湖南省湘阴县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷200题通关秘籍题库带答案（完整版）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.原发性蛛网膜下腔出血的最常见的病因是

A：颅内动脉瘤

B：脑血管畸形

C：动脉硬化

D：高血压

答案：A

2.应用华法林抗凝过程中，出现严重出血时，可应用急救的药物是

A：维生素B1

B：维生素K3

C：维生素K4

D：维生素K1

答案：D

3.（2017年真题）服用后可致嗜睡,驾驶员应慎用的药物是（）

A：阿司匹林

B：胰酶

C：吲达帕胺

D：氯苯那敏

答案：D

4.患者，男，50岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片10mgpoqd；美托洛尔缓释片47．5mgpoqd；贝那普利片20mgpoqd；阿司匹林肠溶片100mgpoqd；辛伐他汀片40mgpoqd。

A：对乙酰氨基酚片

B：双嘧达膜片

C：华法林片

D：氯吡格雷片

答案：D

5.药品说明书中提及“两种药物在吸收过程中,会发生相互影响,不能同时服药",但没有明示服药间隔时间,通常建议的间隔时间是（）

A：2小时

B：3小时

C：0.5小时

D：1小时

答案：A

6.苯二氮

A：艾司唑仑

B：阿米替林

C：丁螺环酮

D：舍曲林

答案：A

7.（2019年真题）某批次青霉素钠原料1mg相当于1670单位效价，生产规格为80万U/支的青霉素钠产品，每支所需的装量是

A：2.088mg

B：1.33g

C: 0.48g

D: 1.33mg

答案：C

8.药物相互作用是双向的，既可能产生对患者有益的结果，使疗效协同或毒性降低；也可能产生对患者有害的结果，使疗效降低和毒性增强，有时会带来严重后果，甚至危及生命。

A: 敏感化作用

B: 减少不良反应

C: 竞争性拮抗作用

D: 非竞争性拮抗作用

答案：A

9.我国CAP的常见病原体不包括

A: 流感嗜血杆菌

B: 肺炎衣原体

C: 金黄色葡萄球菌

D: 铜绿假单胞菌

答案：D

10.拉氧头孢

A: 与多种药物存在配伍禁忌，一般应单独给药

B: 与呋塞米合用可加重肾功能损害

C: 与氯霉素合用因竞争药物的结合位点而产生拮抗作用

D: 与丙戊酸钠合用可导致血药浓度过低而引发癫痫

答案：B

11.新生儿血红蛋白(Hb)正常参考区间是

A: 180～220g / L

B: (15.0～20.0)X109 / L

C: 170～200g / L

D: (5.0～12.0)X109 / L

答案：C

12.患者，男，38岁，身高175cm，体重70kg。3日前自觉全身肌肉酸痛、头疼，轻微咳嗽，自服抗感冒药物效果不佳，近1日觉畏寒，发热，体温37.7℃，遂来本院就诊。检查结果：患者神清，查咽喉部红肿，扁桃腺（-），双肺呼吸音清，心脏听诊无异常，腹检无异常。血象WBC正常，其他正常。诊断为：上呼吸道感染（感冒）。

A: 3岁以下儿童不应使用非处方抗感冒药

B: 感冒药连续服用不得超过7天

C: 治疗成人感冒症状有效的药物仅限于非处方解热镇痛药和减轻鼻充血药

D: 抗生素对导致感冒和流感的病毒都有作用

答案：D

13.患者入院诊断为肺部感染，病原学检查为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，使用万古霉素1000mg/次，静脉滴注，每12h1次。为使血栓性静脉炎的发生风险最小化，临床需要将万古霉素溶液的浓度稀释为4mg/ml。在配置时，需要5%葡萄糖注射液的容量是（）

A: 100ml

B: 480ml

C: 250ml

D: 48ml

答案：C

14.治疗指数低者静脉滴注给药；治疗指数高者分次给药，以保证血药浓度始终高于最低有效浓度针对

A：半衰期小于30分钟

B：半衰期大于24小时

C：半衰期8～24小时

D：半衰期大于30小时

答案：A

15.属于5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂的是

A：阿米替林

B：文拉法辛

C：吗氯贝胺

D：氟西汀

答案：B

16.属于中枢和外周多巴胺D2受体阻断剂，具有镇吐、刺激泌乳素释放的促胃肠动力药是

A：昂丹司琼

B：莫沙必利

C：多潘立酮

D：甲氧氯普胺

答案：D

17.关于药物经济学研究方法，下列说法误的是

A：成本效果分析不能对医疗与非医疗项目进行比较

B：最小成本法不能对不同疾病间进行比较

C：成本效益方法能对医疗与非医疗项目进行比较

D：成本效用方法不能对不同疾病间进行比较

答案：D

18.患者，男，50岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方，氨氯地平片10mgpoqd；美托洛尔缓释片47.5mgpoqd；贝那普利片20mgpoqd；阿司匹林肠溶片100mgpoqd；辛伐他丁片40mgpoqd。

A: 氨氯地平片

B: 美托洛尔缓释片

C: 贝那普利片

D: 阿司匹林肠溶片

答案：C

19.核苷酸类逆转录酶抑制剂

A: 利巴韦林

B: 齐多夫定

C: 依非韦伦

D: 利托那韦

答案：B

20.对巨幼细胞贫血者应选用（）

A: 维生素K1

B: 叶酸+维生素B12

C: 甲磺酸去铁胺

D: 富马酸亚铁

答案：B

21.患者，男，28岁，近期感觉低热、干咳并带有少量痰液，偶有咯血。经检查确诊为肺结核。治疗前身体检查肝、肾功能正常，无任何眼部疾病。患者在服药治疗期间，发现自己视物逐渐变得模糊，对交通信号灯辨别能力下降，目视前方物体时视野范围比平时减少。导致这一问题的药物应该是

A：利福平

B：对氨基水杨酸

C：异烟肼

D：乙胺丁醇

答案：D

22.不能解除病因，不宜长期服用的；但对慢性钝痛如牙痛、头痛、关节痛等有较好的镇痛效果饿药物是

A：阿司匹林

B：谷维素

C：罗通定

D：地西泮

答案：A

23.服用帕罗西汀等选择性5-羟色胺再摄取抑制剂的患者，如果要更换用单胺氧化酶抑制剂，必须先停药

A：5天

B：14天

C：7天

D：10天

答案：B

24.下列情况的首选药物是高TC血症（）

A：胆酸螯合剂+贝特类

B：弹性酶

C：他汀类

D: 贝特类

答案：C

25.归属于药历“用药记录”项下的是

A: 主要实验室检查数据

B: 医保和费用支付情况

C: 临床诊断

D: 联合用药

答案：D

26.病例对照研究试验结果属于循证医学证据级别

A: 2级证据

B: 1级证据

C: 3级证据

D: 4级证据

答案：C

27.稳定型心绞痛的临床表现不包括

A: 持续3～5分钟

B: 针刺或刀扎样锐性痛

C: 压迫、发闷

D: 胸痛

答案：B

28.使血液黏度增加、血容量增多，引起高血压的药物是

A: 重组人促红细胞生成素

B: 伪麻黄碱

C: 咖啡因

D: 糖皮质激素

答案：A

29.男性，68岁，发热伴咳嗽1周，表情淡漠，气急，近2天全身散在出血点及瘀斑，血压60/40mmHg，血红蛋白120g/L，白细胞12×109/L，血小板30×109/L，血涂片可见少量红细胞碎片，凝血酶原时间18秒（正常值13秒），骨髓穿刺示增生活跃，巨核细胞多，诊断为弥散性血管内凝血。

A: 鱼精蛋白

B: 低分子肝素

C: 维生素K1

D: 维生素C

答案：A

30.重量比重量百分浓度系指100g溶液中所含溶质的克数，以符号

A: %(ml/ml)表示

B: %(g/ml)表示

C: %(ml/g)表示

D: %(g/g)表示

答案：D

31.某男性，27岁，间断上腹痛3年，表现为餐后痛，约1～2h后缓解，以冬春季多发。

A: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁

B: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂

C: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂

D: 法莫替丁+克拉霉素+阿莫西林+铋剂

答案：C

32.白细胞分类中，嗜酸性粒细胞参考范围为

A：20%～40%

B：1%～5%

C：50%～70%

D：3%～8%

答案：B

33.常引起粪便白细胞增多的是

A：急性胰腺炎

B：阻塞性黄疸

C：溶血性黄疸

D：细菌性痢疾

答案：D

34.为使铁剂更好的被人体吸收，宜同时应用

A：叶酸+维生素B12

B：亚叶酸钙

C：维生素C

D：硫酸亚铁

答案：C

35.患者，男性，58岁，患有膀胱肿瘤，经常出现不能控制的尿频、尿急、夜尿增多。确诊为急迫性尿失禁，给予托特罗定治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

A：卧位和坐位时高血压

B：口干、便秘、尿潴留

C：鼻咽炎和尿路感染

D: 直立性低血压

答案：B

36.对于轻度（IPSS＜8分）至中度（IPSS为8～19分）前列腺增生症患者，建议初始治疗药物是

A: 坦索罗辛

B: 米多君

C: 奥昔布宁

D: 非那雄胺

答案：A

37.（2019年真题）患者，男，56岁，因出现面色苍白、乏力、肢体麻木、共济失调等症状就诊，查体:舌面光滑，呈“牛肉样舌”。化验结果提示血清叶酸和维生素B12水平下降，下列药物中不会影响维生素B12吸收的是

A: 对氨基水杨酸

B: 氨氯地平

C: 二甲双胍

D: 奥美拉唑

答案：B

38.饮食对粪外观的影响,食绿叶菜

A: 暗绿色

B: 酱色

C: 黑褐色

D: 红色

答案：A

39.吸烟后易出现头晕、嗜睡、疲乏等不良反应的药物是

A：呋塞米

B：西咪替丁

C：氯丙嗪

D：胰岛素

答案：C

40.某女孩，6岁，2个月来反复出现突发突止的意识障碍，表现为突然动作中断，呆立凝视、呼之不应，手中物体掉落．但从不跌倒，持续数秒钟可缓解。

A：苯妥英钠

B：丙戊酸钠

C：卡马西平

D：地西泮

答案：B

41.血常规是最常用的医学检查指标，血常规异常可提示人们罹患某些疾患贫血患者常出现的血常规检查异常是

A：血小板计数增多

B：血红蛋白减少

C：中性粒细胞增多

D：嗜酸性粒细胞增多

答案：B

42.引起心悸、心绞痛发作的药物是

A：碘和碘化物

B：丙硫氧嘧啶

C：胰岛素

D: 左甲状腺素

答案：D

43.癫痫持续状态的首选治疗方法为

A: 乙琥胺口服

B: 苯妥英钠静脉注射

C: 苯巴比妥肌内注射

D: 地西泮静脉注射’

答案：D

44.缺血性脑卒中的二级预防用药中不包括（）

A: 阿托伐他汀

B: 依达拉奉

C: 阿司匹林

D: 缬沙坦

答案：B

45.下列关于烫伤救治措施的说送正确的是()

A: Ⅰ度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏

B: 可用清洁塑料薄膜覆盖创面,以防创面感染

C: 烫伤患者的镇痛镇静药物首选氯丙嗪

D: 创面及时外涂甲紫溶液预防感染

答案：A

46.依照药品不良反应程度分级标准，以下属于“中度药品不良反应”的是

A: 症状不发展

B: 重要器官有严重损害

C：不良反应症状明显

D：一般无需治疗

答案：C

47.2型肥胖型糖尿病患者首选

A：格列喹酮

B：阿卡波糖

C：二甲双胍

D：比格列酮

答案：C

48.下列复方制剂中，不具有联合增效意义的是

A：头孢哌酮一舒巴坦

B：左旋多巴一苄丝肼

C：口服左氧氟沙星和硫酸亚铁

D：磺胺甲噁唑一甲氧苄啶

答案：C

49.牙痛等轻度疼痛宜选用的药物是

A：吗啡

B：可待因

C：阿司匹林

D：多奈哌齐

答案：C

50.增加患者出现高血糖或低血糖症隐患的药品是

A：拉氧头孢

B：利巴韦林

C：加替沙星

D：头孢哌酮

答案：C

51.属于浓度依赖性抗生素的是

A：林可霉素

B：青霉素

C：多黏菌素

D：美沙拉秦肠溶片

答案：C

52.血浆半衰期最长的强心苷类药物是

A：洋地黄毒苷

B：卡维地洛

C：地高辛

D：米力农

答案：A

53.病例系列研究试验结果属于循证医学证据级别的

A：4级证据

B：2级证据

C：3级证据

D：1级证据

答案：A

54.（2019年真题）患者，女，27岁，孕32周，因尿急、尿痛就诊，诊断为尿路感染，应选用的药物是

A：阿莫西林胶囊

B: 莫西沙星片
C: 阿奇霉素片
D: 复方磺胺甲噁唑片
答案：A

55.老年人服用可能出现认知功能受损、谵妄、跌倒的药物是
A: 苯二氮䓬类药
B: 双嘧达莫
C: 甲氧氯普胺
D: 哌替啶
答案：A

56.患者,女,58岁，诊断为骨性关节炎，经洛索洛芬单药治疗疼痛缓解不理想可联合使用的药物是（）
A: 美洛昔康
B: 阿司匹林
C: 曲马多
D: 双氯芬酸
答案：C

57.阿尔兹海默病患者应该避免使用的药物是（）
A: 颠茄
B: 多奈哌齐
C: 美金刚
D: 卡巴拉汀
答案：A

58.流行性结膜炎者宜选用的滴眼液是

A: 维生素B2

B: 碘苷

C: 色甘酸钠

D: 磺胺醋酰钠

答案：B

59.治疗发热，成人服对乙酰氨基酚，每隔4～6小时重复用药1次；1日用量不得超过

A: 4.0g

B: 4.5g

C: 2.5g

D: 3.0g

答案：A

60.使用硫酸亚铁片预防缺铁性贫血，元素铁的预防量是

A: 100mg/次

B: 60mgbid

C: 60mgtid

D: 60mgqd

答案：D

61.敌百虫中毒应

A: 不宜用碳酸氢钠溶液洗胃

B: 静脉注射毒毛花苷K或毛花苷丙

C: 禁止使用肟类复能剂

D: 静脉滴注烟酰胺

答案：A

62.与阿莫西林配伍，可提高治疗的是()
A：克拉维酸钾
B：叶酸
C：奥美拉唑
D：苄丝肼
答案：A

63.归属公共网络资源的是
A：www.googl
B：www.merck.com
C：www.cmt.com.cn
D：www.ashp.org
答案：A

64.药历是开展个体化药物治疗的重要依据。药历书写的基本要求是
A：科学、易懂
B：完整、真实
C：客观、完整
D：客观、真实
答案：D

65.Ⅱ期临床试验
A：以特殊人群为给药对象
B：以患者为给药对象
C：以健康志愿者为给药对象
D：以目标适应证患者为给药对象
答案：D

66.已知1%(g/mL)枸橼酸钠溶液的冰点降低值为0.185℃，计算其等渗溶液的浓度是()。

A: 2.91(%,g/mL)

B: 2.81(%,g/mL)

C: 3.11(%,g/mL)

D: 2.61(%,g/mL)

答案：B

67.患儿，男，6个月，体重9．0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有乒乓球感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

A: 智障

B: 佝偻病

C: 脑瘫

D: 坏血病

答案：B

68.使用后不能饮酒或含酒精饮料，以免发生“双硫仑样反应”的药物是

A: 甲硝唑含漱液

B: 西地碘含片

C: 地塞米松粘贴片

D: 氯己定含漱液

答案：A

69.归属于用药评价的是

A: 主要实验室检查数据

B: 对药物治疗的建设性意见

C: 主治医师签名

D: 同时合并应用的药品

答案：B

70.患者，男，59岁，哮喘病史8年，近日因急性脑梗死就诊住院治疗2周后出院。对于该患者脑血管病的二级预防,宜选用的抗血小板药物是()

A: 对乙酰氨基酚

B: 氯吡格雷

C: 华法林

D: 阿司匹林

答案：B

71.用于治疗铅中毒的特殊解毒剂是

A: 青霉胺

B: 氟马西尼

C: 乙酰胺

D: 纳洛酮

答案：A

72.III期临床试验

A: 以目标适应证患者为给药对象

B: 以患者为给药对象

C: 以健康志愿者为给药对象

D: 以特殊人群为给药对象

答案：A

73.患者,男,56岁,体检发现血尿酸530μmol/L(参考值<420μmol/L),患者向药师咨询维生素使用问题,药师应告知患者可引起尿酸升高的维生素是()

A: 维生素

B: 维生素B2

C: 维生素B12

D: 维生素B6

答案：A

74.下列药品中，归属妊娠毒性药物A级的是

A: 环丙沙星

B: 美托洛尔

C: 氯化钾

D: 青霉素

答案：C

75.二巯丙醇用于解救的是（）

A: 三唑仑中毒

B: 汞中毒

C: 氰化物中毒

D: 有机磷中毒

答案：B

76.患者,77岁,因感冒发热咳嗽,自服酚麻美敏片、维C银翘片,三天后出现急性尿潴留。可引起该患者出现尿潴留的药物成分是()

A: 维生素

B: 氯苯那敏

C: 银翘

D：对乙酰氨基酚

答案：B

77.（2018年真题）使用肝素静脉滴注期间需监测的指标是（）

A：INR

B：RBC

C：APTT

D：ALT

答案：C

78.具有强大的抗凝血因子Xa功能及微弱的抗凝血酶作用，可用于预防深静脉血栓形成的药物是

A：阿替普酶

B：阿加曲班

C：那屈肝素钙

D：氯吡格雷

答案：C

79.（2019年真题）患者，男，25岁，有癫痫病史2年，一直服用丙戊酸钠和左乙拉西坦，癫痫控制良好，近期因社区获得性肺炎入院。下列药物中最可能影响患者基础疾病控制的是

A：阿莫西林

B：莫西沙星

C：阿奇霉素

D：头孢曲松

答案：B

80.（2016年真题）治疗过敏性结膜炎可选用的药物是（）。

A：氧氟沙星滴眼液

B：羟甲基纤维素钠滴眼液

C：色甘酸钠滴眼液

D：酞丁安滴眼液

答案：C

81.乳酸性酸中毒患者宜选用()。

A：瑞格美脲

B：格列喹酮

C：二甲双胍

D：胰岛素

答案：D

82.（2021年真题）头孢曲松钠与乳酸钠林格注射液直接混合,可导致（）

A：产生气体

B：产生胶状不溶物

C：溶液变色

D：微浑浊或沉淀

答案：D

83.由护士双人核对监测

A：药师调配处方差错

B：患者执行医嘱差错

C：医师处方差错

D：护士执行医嘱差错

答案：D

84.帕金森病患者跌倒的最常见原因为（）
A：不安腿综合征
B：神经精神障碍
C：体位性低血压
D：姿势反射障碍
答案：D

85.现有一新生儿确诊感染乙型肝炎，以下可提示其生母妊娠期间血清学检查结果的是
A：HBsAg为阳性
B：HBsAb，HBeAg均为阳性
C：HBsAg，HBeAg均为阳性
D：HBeAg为阳性
答案：C

86.下列白细胞计数检查结果中，属于不正常的是
A：成人8.0X109/L
B：成人3.0X109/L
C：成人4.3X109/L
D：新生儿16.0X109/L
答案：B

87.对于尿液的描述正确的是
A：正常人的尿量变化幅度不大
B：正常人的新鲜尿液呈弱碱性
C：正常人每日排出尿液1～2L，其中50%为水分
D：尿量的多少主要取决于肾小球滤过率和肾小管的重吸收

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/737103055046010024