

2024年西师新版选修2地理下册阶段测试试卷含答案

考试试卷

考试范围：全部知识点；考试时间：120分钟

学校：_____ 姓名：_____ 班级：_____ 考号：_____

总分栏

题号	一	二	总分
得分			

评卷人	得分

一、选择题(共8题，共16分)

- 1、在地质上，钓鱼岛地处我国东海（ ）
A. 大陆架
B. 大陆坡
C. 洋中脊
D. 海槽
- 2、波斯湾沿岸的石油运往西欧地区最近的海上航线经过（ ）
A. 地中海—苏伊士运河—红海—阿拉伯海—波斯湾
B. 波斯湾—阿拉伯海—红海—苏伊士运河—地中海—大西洋
C. 波斯湾—阿拉伯海—印度洋—马六甲海峡—太平洋
D. 波斯湾—阿拉伯海—红海—苏伊士运河—黑海
- 3、山东省是我国海洋大省；山东半岛蓝色经济区是我国第一个以海洋经济为主题的区域发展战略经济区。下图为山东半岛蓝色经济区位置。我国在山东半岛所临海域维护的海洋权益主要有（ ）



- ①内水权益 ②领海权益 ③毗连区权益 ④专属经济区权益 ⑤公海权益

- A. ①②③④⑤
B. ①②④⑤
C. ②③④⑤
D. ①②③④


4、下图为海底地形剖面图。下列地点与海洋资源分布组合正确的有（ ）



①——渔业资源 ②——锰结核 ③——海底热液矿 ④——石油

- A. ①②
B. ②③
C. ①③
D. ②④


5、伞式洋流发电是通过“伞”带动工作索周而复始地运动；进而带动发电机运转发电。读图（美国本土南部附近海域的伞式洋流发电站示意图），洋流G的性质和地理位置可能是（ ）



①暖流 ②寒流 ③大西洋 ④太平洋

- A. ①③
B. ①④
C. ②③
D. ②④

6、下图是南美洲等温线分布图；判读正确的是（ ）



- A. 该图是南美洲7月份等温线分布图
B. ①处等温线密集主要是受寒流的影响
C. ②处等温线向南凸出是因为冬季大陆冷却快
D. ③处等温线向南凸出是受暖流的影响

7、下列海洋空间和开发利用搭配正确的是（ ）

- A. 交通运输——海港码头、海底隧道、海底货场

- B. 海上生产空间——海上电站、工业人工岛、海上油库
- C. 海上通信与电力输送空间——海底电缆、海底光纤
- D. 海上文化娱乐设施空间——海滨浴场、海上运动区、海洋牧场


- 8、波斯湾沿岸的石油运往西欧地区最近的海上航线经过（ ）
- A. 地中海—苏伊士运河—红海—阿拉伯海—波斯湾
 - B. 波斯湾—阿拉伯海—红海—苏伊士运河—地中海—大西洋
 - C. 波斯湾—阿拉伯海—印度洋—马六甲海峡—太平洋
 - D. 波斯湾—阿拉伯海—红海—苏伊士运河—黑海

评卷人	得分

二、综合题(共9题，共18分)

9、阅读图文资料；回答下列问题。

河流的侵蚀、沉积及沼泽的吸收(附)影响河流泥沙和营养物质含量。水体中营养物质含量影响浮游生物数量，与水温共同制约鱼类资源数量。如图所示的西西伯利亚平原地势低平，冻土发育，河流众多，沼泽广布。



- (1) 分析西西伯利亚平原沼泽广布的原因。
- (2) 通常，大河河口的鱼类资源丰富，但鄂毕河河口鱼类资源相对较少。说明鄂毕河河口鱼类资源较少的原因。

10、阅读图文材料；完成下列要求。

天津贝壳堤是世界三大古贝壳堤之一；也是天津地区特有的地貌，它是几千年来由海生贝类动物在海潮推动下，逐渐堆积而成的古渤海海岸线的标志。贝壳堤的形成一般需要具备三个条件，即粉沙淤泥海岸；丰富的贝壳物源和海岸侵蚀环境。历史上，黄河曾在天津地区入海，以“善淤、善决、善徙”著称，黄河改道后，海水变得清澈，各类繁多的海洋软体动物在此繁衍生息。


贝壳堤对于研究古地理、古气候、海洋生态、海陆变迁等具有重要价值；同时也是重要的旅游资源。因为没有意识到古贝壳堤的珍贵，天津古贝壳堤现已被严重破坏。



- (1) 指出图中三道贝壳堤的形成顺序并说明理由。
- (2) 说明贝壳堤的形成与海岸冲淤环境的关系。
- (3) 推测天津贝壳堤遭到破坏的人为原因。

11、 [海洋地理]


海洋牧场是指通过人工鱼礁、增殖放流等生态工程建设,构建或修复海洋生物繁殖、生长、索饵或避敌所需的场所,增殖养护渔业资源,改善海域生态环境,实现渔业资源可持续利用的渔业生产方式。它改变了以往以单纯捕捞设施养殖为主的渔业生产方式,基本解决了局部污染和过度捕捞带来的资源枯竭、近海养殖引起的病害加剧等问题,是海洋渔业生产方式的重大变革。烟台海域面积2. 6万平方千米,近1/10的海域适宜建设优质海洋牧场。20世纪70-80年代,烟台成为全国最早开展海洋牧场建设的城市之一,经过多年摸索和发展,打造出全国一流的海洋牧场示范区。其中部分海产品在福建育种生长后,再放置到烟台海城继续生长,以弥补区域自然环境缺陷对牧场的影响。下图示意烟台市地理位置。



- (1) 指出与传统近海养殖相比,发展海洋牧场的意义。
- (2) 简述烟台海洋牧场在福建育苗、育种的原因。

12、阅读图文材料；完成下列要求。

斯堪的纳维亚半岛受第四纪冰期的影响,半岛西部沿海形成了众多两岸崖壁陡峭直立、谷底宽阔幽深的峡湾,东部则形成了众多平行分布的河流和湖泊。波罗的海的海水含盐度约为7‰~8‰,远低于世界海水的平均含盐度。



C. [旅游地理]

读贵州省重点旅游景点分布示意图；回答下列问题。（10分）



- (1) 贵州重点旅游景点主要属于_____旅游资源。（1分）
- (2) 分析贵州发展旅游业的有利条件_____。（4分）
- (3) 欣赏黄果树瀑布这类景观应注意_____。（2分）
- (4) 近年来，贵州常对外地游客采取减免景点门票、减收过桥过路费等措施，这对贵州旅游业的发展有何积极影响？（3分）

D. [环境保护]


2019年7月1日起，被称为“史上最严”垃圾分类措施的《上海市生活垃圾管理条例》正式实施，不执行将被罚款。据悉，上海市生活垃圾按照可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾分四大类。读上海市垃圾分类表，回答下列各题。（10分）

上海市垃圾分类表

废纸张、废塑料、废玻璃制品、废金属、废织物等适宜回收、可循环利用的生活废弃物	废电池、废灯管、废药品、废油漆及其容器等对人体健康或者自然环境造成直接或者潜在危害的生活废弃物	易腐垃圾，即食材废料、剩菜剩饭、过期食品、瓜皮果核、花卉绿植、中药药渣等易腐的生物质生活废弃物	即其他垃圾，除可回收物、有害垃圾、湿垃圾以外的其他生活废弃物


- (1) 上海市的垃圾分类回收应用了环境管理的_____手段和_____手段。（2分）
- (2) 根据上海垃圾分类标准；学校日常活动最易产生四大类垃圾中的_____。你认为可以采取哪些措施来减少校园垃圾数量？（3分）
- (3) 说明实行垃圾分类回收的积极意义。（3分）
- (4) 请你为垃圾分类回收设计两条宣传语。（2分）

14、[海洋地理]帕劳是美丽的西太平洋岛国；位于太平洋板块与菲律宾板块交界处，由一个大堡礁和许多小岛礁构成。下图是帕劳的地理位置图。读图回答下列问题。



- (1)帕劳群岛地处太平洋岛弧链，东临深海沟，形成这种岛弧—海沟地形的原因是____，此处地壳运动相对活跃的表现形式是____。
- (2)帕劳的海岸类型主要是____。除热带雨林外，岛上还有少量红树林，红树林的生态功能主要有____；____。
- (3)从可持续发展角度看，帕劳可重点发展的产业是____和____。
- (4)为保护海洋资源和环境，帕劳在经济发展过程中应采取的措施有____。


15、波浪能是指海洋表面所具有的动能和势能。图18示意我国沿海局部海域波浪能密度的分布。读图回答下列问题。



- 1) 指出该海域波浪能密度大小的南北差异，并分析其原因。
- 2) 简述我国波浪能利用的前景。

16、阅读材料；完成下列问题。

材料一 世界海洋潮汐能富集岸段及著名潮汐电站的分布。



— 世界海洋潮汐能富集的岸段 ● 世界著名的潮汐发电站

材料二 世界著名潮汐电站比较表。

地点	平均潮差（m）	库区面积（km ² ）	装机容量（万kW）	年发电量（百万千瓦·时）	投入运行时间
朗斯（法国）	8.0	17	24.0	540	1966年
安娜波利斯（加拿大）	6.4	6	1.78	30	1984年
江夏（中国）	5.1	2	0.32	11	1980年
基斯洛湾（俄罗斯）	2.4	2	0.04	2.3	1968年

- （1）与煤炭发电相比：简述潮汐能发电的优点。
- （2）世界上适合建造大型潮汐电站的地点；主要集中在_____。
- （3）各种海洋能中；潮汐能相对密度_____（填“较大”或“较小”），离海岸_____（填“较远”或“较近”），周期性强，目前最具开发利用的可能性。
- （4）朗斯潮汐发电站建立的优势是（ ）
- A.朗斯河口处水位浅；潮差大 B.圣马洛湾开阔水深。
- C.朗斯河口处，河流水量大 D.位于多佛尔海峡窄浅处

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/737120155103010011>