

2024 年安徽省无为县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库大全（原创题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 急性或轻型肝炎时，肝功能检查结果可能显示的是

- A: ALT 下降
- B: AST 下降
- C: AST/ALT 比值 >1
- D: AST/ALT 比值 <1

答案：D

2. 用于缓解胆石症患者疼痛症状的药物是

- A: 复方阿嗝米特
- B: 匹维溴铵
- C: 脂肪乳
- D: 头孢曲松与甲硝唑联用

答案：B

3. （2016 年真题）患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mgtidpo，阿托伐他汀钙片 20mgqdpo 等药物治疗。

- A: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片
- B: 停用阿托伐他汀钙片
- C: 停用瑞格列奈片
- D: 停用二甲双胍肠溶片

答案：B

4. (抗高血压药物的不良反应)，服用维拉帕米可能引起

- A: 免疫失调
- B: 房室传导阻滞
- C: 直立性低血压
- D: 多毛症

答案：B

5. 痔疮的主要表现是

- A: 疼痛
- B: 坠胀感
- C: 便后鲜血
- D: 瘙痒

答案：C

6. 患者，男，35 岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

- A: 多潘立酮
- B: 胰酶片
- C: 复合消化酶胶囊
- D: 莫沙必利

答案：D

7. 羟甲戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂（他汀类）所致药源性损伤为

- A: 肝损害
- B: 肾损害

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 胃肠道系统损害

D: 肺损害

答案：A

8. 合并闭角型青光眼的前列腺增生患者不宜选用的药物是()

A: 非那雄胺

B: 坦索罗辛

C: 多沙唑嗪

D: 托特罗定

答案：D

9. (2018 年真题) 可以引起视物模糊、红绿色视野受限的药物是()

A: 乙胺丁醇

B: 异烟肼

C: 对氨基水杨酸钠

D: 链霉素

答案：A

10. 可用于慢性消耗性疾病的蛋白同化激素是

A: 依普黄酮

B: 他莫昔芬

C: 甲羟孕酮

D: 司坦唑醇

答案：D

11. 制定新药新知识培训制度，归属

A: 知识培训

B: 管理规范到位

C: 环境与流程的优化与持续改进

D: 科学发展

答案: A

12. 评价房颤患者抗凝出血风险的方法是

A: CTP 分级

B: FEV1 占预计值%

C: CHA₂DS₂-VASc 评分

D: HAS-BLED 评分

答案: D

13. 患者，女，50 岁，体重 60kg，因咳嗽、咳痰伴发热就诊，查体：

体温 38.5℃、双肺可闻及湿性啰音，查血常规提示：WBC $12.4 \times 10^9/L$

A: 70ml/min

B: 47ml/min

C: 55ml/min

D: 65ml/min

答案: B

14. 患者，男，48 岁。十二指肠溃疡病史 2 年，近感头痛、眩晕而就诊。查体：血压 160/100mmHg。经一段时间观察及定期检查后，医师诊断为高血压病。

A: 胍屈嗪

B: 可乐定

C: 利血平

D: 氢氯噻嗪

答案: C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

15. (2018 年真题) 患者, 女, 30 岁, 因感冒所致发热 (体温 38.5℃) 并伴有头痛、全身酸痛到药店购药, 药师应推荐的药品是 ()

- A: 氯苯那敏片
- B: 酚麻美敏片
- C: 萘甲唑啉滴鼻液
- D: 对乙酰氨基酚片

答案: D

16. 房颤合并支气管哮喘患者, 适用于控制心室率的药物为

- A: 胺碘酮
- B: 地尔硫卓
- C: 利伐沙班
- D: 硝苯地平

答案: B

17. 主要用于伴有血清 PSA 水平过高、前列腺体积增大的前列腺增生症患者的治疗药物是

- A: 奥昔布宁
- B: 坦索罗辛
- C: 米多君
- D: 非那雄胺

答案: D

18. 根据英国 Cochrane 中心联合循证医学和临床流行病学专家共同制定的循证医学证据分级标准, 同质病例对照研究的系统评价在循证医学评价中的证据级别属于

- A: IIa 级
- B: V 级

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: IIIa 级

D: I a 级

答案: C

19. 6 个月~2 岁婴幼儿白细胞计数正常参考区间是

A: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9 / L$

B: $(100 \sim 300) \times 10^9 / L$

C: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9 / L$

D: $(200 \sim 300) \times 10^9 / L$

答案: C

20. 患者,女,27 岁,孕 32 周,因尿急尿痛就诊,诊断为尿路感染,应选用的药物是 ()

A: 阿莫西林胶囊

B: 复方磺胺甲噁唑片

C: 莫西沙星片

D: 阿奇霉素片

答案: A

21. 以下抗菌药物中,适宜用于儿童患者的是

A: 氟喹诺酮类

B: 四环素

C: 万古霉素

D: 青霉素

答案: D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

22. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第一跖趾关节剧痛。3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 秋水仙碱
- B: 别嘌醇
- C: 丙磺舒
- D: 苯溴马隆

答案：A

23. (2016 年真题) 患者，女，21 岁，未婚，患有甲状腺功能亢进症，应用丙硫氧嘧啶 150mg tid 治疗 4 个月后，出现体重增加，乏力，怕冷，突眼加重，治疗方案应该调整为 ()。

- A: 放射性 ^{131}I 治疗
- B: 加大丙硫氧嘧啶用量
- C: 丙硫氧嘧啶减量并加甲状腺素片
- D: 换用另一种抗甲状腺药物

答案：C

24. 下列哪个不是慢性咽炎的临床表现

- A: 咽喉部不适、干燥、发痒、疼痛或有异物感
- B: 有刺激性咳嗽
- C: 常伴有发热
- D: 清晨起床后常会吐出微量的稀痰，伴有声嘶

答案：C

25. 阿昔洛韦的适应证是

- A: 带状疱疹
- B: 流感

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 足癣

D: 乙型病毒性肝炎

答案: A

26. 下列药物中，患胸膜炎伴胸痛的咳嗽患者宜选用的药物是

A: 羧甲司坦

B: 可待因

C: 苯丙哌林

D: 喷托维林

答案: B

27. 可引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的是

A: 甲巯咪唑

B: 氮芥类

C: 沙立度胺

D: 雌孕激素

答案: C

28. 对两种或多种药物治疗方案比较成本，为总体医疗费用的控制和医疗资源优化配置提供基本信息，采用货币为单位。该药物经济学评价方法是

A: 成本-效益分析

B: 成本-效用分析

C: 成本-效果分析

D: 最小成本分析

答案: D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

29. (2018 年真题) 患者, 男, 58 岁, 体重 68kg, 高血压病史 5 年。5 天前出现咳嗽、咳痰, 伴发热, 入院查体 BP: 120/80mmHg, T38.9°C。化验结果: 白细胞计数 $14.6 \times 10^9/L$, 中性粒细胞百分比 86%。胸片示: 右下肺纹理增粗, 诊断为社区获得性肺炎, 青霉素皮试阳性。

- A: 哌拉西林
- B: 头孢他啶
- C: 头孢曲松
- D: 阿奇霉素

答案: B

30. 为解热或镇痛, 有心功能不全史的患者应慎用布洛芬。因为用药后可能发生

- A: 重度肝损伤
- B: 过敏反应
- C: 尿潴留和水肿
- D: 急性肾衰竭

答案: C

31. 以"保证贮存和发出的药品质量合格"为职责的技能是

- A: 沟通技能
- B: 调剂技能
- C: 药品管理技能
- D: 自主学习能力

答案: C

32. 患者, 男, 68 岁, 肺癌晚期, 平日清晨、晚间 8 点使用吗啡缓释片控制疼痛。目前出现暴发性疼痛, 应采取的治疗措施是

- A: 即刻加用吗啡片一次

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 即刻加用可待因片一次
- C: 即刻加用吗啡缓释片一次
- D: 即刻加用芬太尼透皮贴剂

答案：A

33. 沿静脉出现迂回线状色素沉着的是（）

- A: 博来霉素
- B: 吉非替尼
- C: 阿霉素
- D: 氟尿嘧啶

答案：D

34. 以下所列药物中，有腹泻的 2 岁以下儿童不宜使用的是

- A: 洛哌丁胺
- B: 双歧三联活菌制剂
- C: 盐酸小檗碱
- D: 鞣酸蛋白

答案：A

35. 对严重药品滥用和用药失误的处方，处置的方式是

- A: 拒绝调配
- B: 应拒绝调配，并按有关规定报告
- C: 经改正并签字确认后，方可调配
- D: 准予调配

答案：B

36. 抗胆碱药或抗过敏药用于伴有青光眼患者，应评判为

- A: 联合用药不适宜

- B: 过度治疗用药
- C: 无适应证用药
- D: 有禁忌证用药

答案：D

37. (2017 年真题) 目前推荐的绝经期激素补充治疗的窗口期是 ()

- A: 大于 60 岁
- B: 绝经后 5 年之内或大于 60 岁
- C: 绝经后 5 年之内
- D: 绝经后 10 年之内或 60 岁以前

答案：D

38. 下列疾病中，WHO 视为艾滋病最常见机会性感染的是

- A: 结核病
- B: 卡波西肉瘤
- C: 肺炎
- D: 腹泻

答案：A

39. 据统计，全国高血压患者已经超过 2 亿，高血压患者中不足三成的人知道自己患病；而知道自己患有高血压的患者中，一半多没有应用药物治疗；而接受治疗的患者中，能达到治疗要求的仅占三成左右。高血压死亡率不断升高，因此熟悉高血压及其相关治疗用药，对更有效地防治高血压非常重要。

- A: 美托洛尔
- B: 依那普利
- C: 氢氯噻嗪
- D: 哌唑嗪

答案：A

40. 可引起眩晕或幻觉的药物是

- A: 氯苯那敏
- B: 右美沙芬
- C: 东莨菪碱
- D: 阿米洛利

答案：B

41. 代谢性或呼吸性碱中毒

- A: 尿酸碱度降低
- B: 尿酸碱度增高
- C: 尿胆红素检测阳性
- D: 尿蛋白检测阳性

答案：B

42. 患者，男，65岁，患有骨质疏松症，根据患者饮食习惯，每日需补充元素钙 600mg，药师为其推荐碳酸钙(0.5g/片)，该患者适宜的用法用量是()

- A: 1片 tid
- B: 2片 tid
- C: 6片 qd
- D: 4片 qd

答案：A

43. 某女性，45岁，肥胖多年，自觉口渴、消瘦 5个月，尿糖阳性，空腹血糖 8.9mmol/L，餐后两小时血糖 15.1mmol/L

- A: 甲状腺功能亢进症

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 1 型糖尿病

C: 肥胖症

D: 2 型糖尿病

答案: D

44. 从疗效和费用等因素考虑，应首选的 DMARDs 是

A: 青霉胺

B: 柳氮磺吡啶

C: 来氟米特

D: 甲氨蝶呤

答案: D

45. 医师咨询"加替沙星用于糖尿病患者抗感染"，属于

A: 新药信息

B: 禁忌证

C: 给药途径

D: 药物相互作用

答案: B

46. 常见老年人 ADR 的药物类别，大量应用可导致肠道菌群失调或真菌感染等严重并发症

A: 抗胆碱药

B: 抗生素

C: 钙通道阻滞剂

D: β 受体阻断剂

答案: B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

47. 患者，女，85 岁，既往有高血压病史，慢性心力衰竭，给予地高辛每日维持量治疗，近 Et 频发室性心动过速，检测血钾值在正常范围。如果患者出现严重的室性心动过速、室颤，需采用

- A: 电复律
- B: 阿托品
- C: 胺碘酮
- D: 苯海拉明

答案：C

48. (2018 年真题) 患者，女，21 岁，近半年来食欲亢进，多汗体重明显减轻，伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤，心率 104 次/分，化验结果：血清促甲状腺素 (TSH) $<0.1\text{mU/L}$ ，FT3、FT4 明显升高，肝肾功能基本正常，白细胞计数正常，诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是 ()

- A: 甲状腺次全切除手术
- B: 注意休息补充营养，使用甲巯咪唑治疗
- C: 碘化钾治疗，定期复查
- D: 选用 ^{131}I 治疗

答案：B

49. 患者，男，48 岁，因“肺结核”入院治疗。医师处方异烟肼片 0.3gqd、利福平胶囊 0.6gqd、乙胺丁醇片 1.0gqd、吡嗪酰胺片 1.5gqd。药师对患者的正确用药指导是

- A: 患者治疗期间应避免服用维生素 B6
- B: 异烟肼加快乙胺丁醇代谢，增加球后视神经炎风险，须定期评估视神经功能
- C: 利福平可减慢异烟肼的代谢，增强肝毒性，须定期监测肝功能
- D: 利福平可加快异烟肼的代谢，增强肝毒性，须定期监测肝功能

答案：D

50. 在药学信息服务中，三级信息源资料的最突出的优势是

- A: 内容全面、细致
- B: 内容广泛、使用方便
- C: 能看到研究细节如试验设计、数据处理等
- D: 提供的信息丰富、详实

答案：B

51. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L、甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考区间 0.56~1.70mmol / L)、总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考区间 <5.2mmol / L)、低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol / L(正常参考区间 2.1~3.1mmol / L)、高密度脂蛋白胆固醇 1.2mmol / L(正常参考区间 1.2~1.65mmol / L)、血肌酐 50 μ mol / L(正常参考区间 45~84 μ mol / L)、尿蛋白(++)。临床诊断：高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 阿托伐他汀
- B: 依折麦布
- C: 普罗布考
- D: 非诺贝特

答案：A

52. 为使铁剂更好的被人体吸收，宜同时应用

- A: 亚叶酸钙
- B: 硫酸亚铁
- C: 叶酸+维生素 B12
- D: 维生素 C

答案：D

53. 可减弱华法林抗凝作用的药物为

- A: 头孢哌酮
- B: 布洛芬
- C: 阿司匹林
- D: 苯巴比妥

答案：D

54. (2015 年真题) 患者，女，44 岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断口服沙丁胺醇 4mg tid 治疗。没有规律用药治疗。近日，因秋冬季节交替，出现明显喘憋，话不成句，被紧急送往医院。

- A: 沙丁胺醇气雾剂
- B: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂
- C: 沙丁胺醇片
- D: 福莫特罗吸入剂

答案：B

55. 在氯化钠注射液中可形成胶状不溶物是

- A: 氯化钾
- B: 红霉素
- C: 苯妥英钠
- D: 青霉素

答案：B

56. 药物不良反应胶体果胶铋 ()

- A: 黑便
- B: 睡眠障碍

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 性功能障碍

D: 溢乳现象

答案: A

57. (2018 年真题) 患者, 男 58 岁, 高血压病史 5 年, 吸烟史 40 年, 日均 40 支, 6 小时前出现左侧肢体无力, 并逐渐加重, 不能站立, 家属发现其说话迟钝含混, 右侧嘴唇变浅, 意识清楚, 到某院急诊 BP190/120mmHg, 血常规基本正常, 行头部 MRI 检查后, 诊断为急性脑梗死。

A: 尼莫地平注射液 20mgqdiv

B: 胞二磷胆碱注射液 200mgqdiv

C: 呋塞米片 200mgqdp0

D: 甘露醇注射液 250mlq6hiv

答案: D

58. 药品不良反应(ADR)的机制和影响因素错综复杂, 遇到可疑 ADR 时, 需要进行因果关系评价患者, 男, 32 岁, 因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊, 出现全身瘙痒, 立即停药, 无特殊治疗, 患者症状逐渐好转, 未再服用阿莫西林。该 ADR 的因果关系评价结果是

A: 肯定

B: 可能无关

C: 很可能

D: 可能

答案: C

59. 贫血的临床表现与下列哪项有关

A: 铁元素缺乏

B: 缺乏叶酸

C: 红细胞减少

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 血红蛋白下降的速度

答案：D

60. 患者，女，66 岁，身高 156cm，体重 61kg。空腹血糖 7.8mmol / L，餐后血糖 11.2mmol / L，糖化血红蛋白 8.7%。

A: 换用其他作用机制的口服降糖药

B: 增加一种口服降糖药

C: 启用胰岛素治疗

D: 增加现用口服降糖药的剂量

答案：C

61. 能特异性抑制半胱氨酰白三烯受体，阻断白三烯引起的鼻部炎症

A: 泼尼松片

B: 氯雷他定片

C: 萘甲唑林滴鼻液

D: 孟鲁司特钠片

答案：D

62. 餐前 1 小时及睡前服用的药物是 ()

A: 吉法酯

B: 雷贝拉唑

C: 瑞巴派特

D: 枸橼酸铋钾

答案：D

63. 喝茶可降低多价金属离子、生物碱、苷类、胃蛋白酶、四环素类等药物的疗效，其机制主要是它们结合茶中的

A: 鞣酸

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 咖啡因

C: 蛋白质

D: 茶碱

答案：A

64. 下列药物中，有效治疗浓度范围与中毒浓度范围相接近的是

A: 氯噻嗪

B: 地高辛

C: 阿托品

D: 四环素

答案：B

65. 提供的药物信息和建议是否均来自受过专门药学培训的人员

A: 合理性

B: 权威性

C: 新颖性

D: 归因性

答案：B

66. 抑制胃酸分泌作用的药物是

A: 奥美拉唑

B: 碳酸氢钠

C: 莫沙必利

D: 西沙必利

答案：A

67. 缺铁性贫血最早和最常见的症状是

A: 记忆力减退

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 食欲不振

C: 乏力、困倦、活动耐力减退

D: 头晕

答案：C

68. (2019 年真题) 用后不宜马上进食的剂型是

A: 软膏剂

B: 含漱剂

C: 直肠栓剂

D: 滴眼剂

答案：B

69. 患者,男,58 岁,体重 68kg,高血压病史 5 年。5 天前出现咳嗽、咳痰,伴发热,入院查体 BP: 120/80mmHg, T38.9℃。化验结果:白细胞计数 $14.6 \times 10^9/L$,中性粒细胞百分比 86%。胸片示:右下肺纹理增粗,诊断为社区获得性肺炎,青霉素皮试阳性。

A: 头孢吡肟

B: 阿莫西林

C: 莫西沙星

D: 氨苄西林

答案：C

70. (消化性溃疡病的治疗),除中和胃酸外,尚具有黏膜保护作用

A: 硫酸镁

B: 硫糖铝

C: 奥美拉唑

D: 溴丙胺太林

答案：B

71. 若空腹服药，则胃排空较快，药物在短时间内可进入十二指肠与小肠。餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃黏膜的刺激。因此，许多药品适宜餐后服用。

- A: 餐中服用
- B: 餐后服用
- C: 清晨服用
- D: 餐前服用

答案：D

72. 根据《中华人民共和国药典临床用药须知》，使用前必须做皮试的药物是

- A: 克林霉素
- B: 氨苄西林
- C: 维生素 K1
- D: 红霉素

答案：B

73. (2018 年真题) 患者, 男, 58 岁, 体重 68kg, 高血压病史 5 年。5 天前出现咳嗽、咳痰, 伴发热, 入院查体 BP: 120/80mmHg, T38.9℃。化验结果: 白细胞计数 $14.6 \times 10^9/L$, 中性粒细胞百分比 86%。胸片示: 右下肺纹理增粗, 诊断为社区获得性肺炎, 青霉素皮试阳性。

- A: 头孢吡肟
- B: 氨苄西林
- C: 莫西沙星
- D: 阿莫西林

答案：C

74. 异环磷酰胺的主要毒副作用是 ()

- A: 溶血性尿毒症
- B: 肺纤维化
- C: 出血性膀胱炎
- D: 心脏毒性

答案：C

75. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L(正常参考范围 < 7.8mmol / L)，甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考范围 0.56~1.70mmol / L)，总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考范围 < 5.2mmol / L)，低密度脂蛋白胆固醇 4185mmol / L(正常参考范围 2.1~3.1mmol / L)，高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol / L(正常参考范围 1.2~1.65mmol / L)，血肌酐 50 μmol / L(正常参考范围 45~84 μmol / L)，尿蛋白(++)。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 减少脂肪摄入
- B: 控制体重
- C: 不必限盐
- D: 适当运动

答案：C

76. 容易氧化的药物是

- A: 阿扑吗啡
- B: 青霉素类
- C: 牛痘菌苗
- D: 胃蛋白酶

答案：A

77. 黏液水肿性昏迷的治疗，首选药物为

- A: T
- B: T
- C: L-T
- D: L-T

答案：B

78. 氯喹与链霉素合用

- A: 诱发癫痫
- B: 引起心脏房室传导阻滞
- C: 加重神经肌肉接头抑制作用
- D: 根治间日疟

答案：C

79. 患者,女,76岁,慢性阻塞性肺病病史10年来多次因急性加重入院,予以抗感染等治疗。近日因咳嗽咳痰加重再次入院,经验性抗感染治疗时适宜选用的药物是()

- A: 头孢他啶
- B: 阿米卡星
- C: 头孢唑林
- D: 阿奇霉素

答案：A

80. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者,必须迅速做出准确判断,及时果断地采取有效的救治措施,以挽救生命、减轻损害程度。

- A: 二巯丙醇“驱汞”治疗

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 毛果芸香碱拮抗颠茄碱类中毒
- C: 药用炭吸附中毒物质
- D: 弱碱中和强酸

答案：C

81. 结核病化学治疗成功的关键措施是

- A: 采用间歇疗法
- B: 采用大剂量
- C: 避免与克服细菌耐药
- D: 采用短程疗法

答案：C

82. 可发生抗惊厥药物过敏综合征等严重不良反应的抗癫痫药是

- A: 拉莫三嗪
- B: 卡马西平
- C: 苯妥英钠
- D: 丙戊酸钠

答案：B

83. 下列选项中，关于老年人患病的叙述，错误的是()。

- A: 患病时一般不容易出现意识障碍和精神症状
- B: 常常是多系统同时发病或同一脏器、同一系统发生多种疾病
- C: 自觉症状常较轻微，临床表现往往不典型
- D: 机体适应能力低下，一旦发病，病情常迅速恶化

答案：A

84. 下列影响老年人血药浓度的因素中，叙述错误的是

- A: 常规剂量连续给药就有可能引起蓄积性中毒

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 与血浆蛋白结合率增加，使游离型药物减少
- C: 心肝肾及胃肠等主要器官功能在不断下降
- D: 对药物的代谢、排泄减慢，血浆半衰期延长

答案：B

85. 由于上市后风险评估，发现其大剂量服用可使患者罹患心肌梗死和心脏猝死的危险增加，从而导致全球撤市的药物是

- A: 仙牛健骨颗粒
- B: 罗非昔布
- C: 西立伐他汀
- D: 阿糖胞苷儿科事件

答案：B

86. 患者，男，42 岁，近期出现烧心（胃灼热）、咳嗽、胸痛症状，疑似胃食管反流病。可作为胃食管反流病的初步诊断方法是给予 1~2 周、每日 2 次标准剂量的

- A: 西咪替丁
- B: 阿司匹林
- C: 艾司奥美拉唑
- D: 硝酸甘油

答案：C

87. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他汀片 40mgpoqd。

- A: 阿司匹林肠溶片
- B: 贝那普利片

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 美托洛尔缓释片

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/738013050046007022>